VI EDIÇÃO - 2022

Dicase Distribuidora

Semeando confiança, colhendo prosperidade

TABLÓIDE

VETERINÁRIO / RAÇÕES / ACESSÓRIOS

ÍNDICE

VETERINÁRIO

A Quimica Santa Marina.....03
Biofarm 06
Lavizoo 10
Lema.....14
Bimeda.....15
Ourofino.....16
Matacura.....20
Pearson.....21
Pinus.....22
Provets 23
Vansil.....25
VetBras.....29

RAÇÕES

Brasil Floresta/Malta/Multitec.....38
Biotron.....39
Dicase Bird Seeds.....44
Nutricon 45
Petiscão.....46
Rações Águia.....48

HIGIENE E BELEZA

Genial Pet.....54

ACESSÓRIOS

Christino.....57
Kotori.....63
M&S Pet 64
Pet Solution.....65
Plast Pet.....71
WS Correntes.....74

Representantes

(27) 3216-2460
(27) 99254-4133

Av. Alice Coutinho Santos, 2149 - Maracanã - Cariacica/ES - CEP: 29.142-887
vendas@dicase.com.br

PEQUENOS ANIMAIS

Anestron SM

Indicação:
ANESTRON SM anticoncepcional injetável para pequenos animais. Inibição do estro em cadelas e gatas nas quais a reprodução envolva risco de vida para o animal, riscos cirúrgicos mínimos para ovário-histerectomia, ninhadas não desejadas ou opcionais.

Composição:
Cada mL contém:
Acetato de Medroxprogesterona 50,00mL
Veículo aquoso q.s.p.....1,0mL

Modo de uso:
Agite antes do uso. Aplicar a dosagem indicada por via subcutânea durante o anestro.

Posologia:
Cadelas de pequeno porte (até 10kg) 1mL
Cadelas de médio porte (de 10 a 20kg) 2mL
Cadelas de grande porte (acima de 20kg) 3mL
Gatas.....1mL

Apresentação:
Embalagem contendo ampola de 1mL e seringa estéril.

Calciotrat SM

Indicação:
O Calciotrat SM Oral, pela sua composição é um produto indicado em todos os casos que se queira manter ou restituir os níveis normais de cálcio, fósforo e vitaminas A, D e B12, bem como estimulante do apetite e tônico energético.

Composição:
Cada 100mL contém:
Gluconato de cálcio.....2,50g
Fósforo tricálcico.....2,50g
Vitamina A.....25,000 U.I.
Vitamina B12.....500 mcg
Vitamina D3.....40,000 U.I.
Veículo q.s.p.....100,00mL

Modo de uso e Posologia:
Administrado por via oral (sabor morango), puro ou adicionado à água de beber, leite ou ração. Animal de pequeno porte: 1 a 2 colheres das de sobremesa ao dia (10 a 20mL); Animal de médio porte: 2 a 3 colheres das de sopa ao dia (30 a 45mL); Animal de grande porte: 300 a 400mL ao dia.

Apresentação: Frascos de 100, 500 e 1000mL.

Cort-Trat SM Comprimidos

Indicação:
Processos inflamatórios articulares: tendinites, bursites, luxações e miosites; reações alérgicas; doenças dermatológicas; tratamento das gonites, paresia posterior canina e condições de stress.

Composição:
Cada comprimido contém:
Acetato de Dexametasona.....0,5mg
Veículo q.s.p.....200,0mg

Modo de uso e Posologia:
É administrado por via oral nas seguintes doses:
Cães - 1/2 a 3 comprimidos numa única dose ou 2 vezes por dia, por 7 dias;
Gatos - 1/2 a 1 comprimido diariamente e por 7 dias.

Apresentação:
Cartuchos com 1 blister contendo 20 comprimidos.

Otodog SM

Indicação: Otodog SM é indicado para o tratamento de otite externa agúda e crônica dos cães, resultante de infecções por fungos e bactérias.

Composição: Cada 100 mL contém:
Sulfato de neomicina ..... 0,5 g
Clotrimazol ..... 1,0 g
Hidrocortisona ..... 0,5 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 mL

Modo de uso: Antes de iniciar o tratamento, recomenda-se tomar as seguintes medidas:
• Limpar e secar cuidadosamente o ouvido externo;
• Remover detritos, corpos estranhos e crostas de exsudatos com solução apropriada não irritante;
• Retirar o excesso de pêlos da superfície a ser tratada.
Dosagem: Menos de 15kg de massa corporal, instilar 4 gotas 2 vezes ao dia durante 7 dias consecutivos; 15kg ou mais de massa corporal, instilar 8 gotas 2 vezes ao dia durante 7 dias consecutivos.

Apresentação: Frasco plástico contendo 20mL, com aplicador acondicionados em cartuchos.

AVES

Antitóxico SM

Indicação: O Antitóxico SM é indicado nas intoxicações alimentares ou medicamentosas. Durante e após o tratamento com antibióticos, sulfas, carrapaticidas e vermífugos. Nas intoxicações acidentais provocadas pela ingestão de produtos químicos, usados na agricultura e pecuária, bem como ingestões de alimentos deteriorados. Utilizado também como tônico vitalizador.

Composição: Cada 100ml contém:
Acetil D-L Metionina.....7,00g
Cloreto de Colina.....4,00g
L-Lisina.....0,500g
Vitamina B2.....0,050g
Vitamina B6.....0,250g
Nicotinamida.....1,00g

Modo de uso: Via oral 2 a 3 vezes ao dia.
Animais de pequeno porte: 20 a 30 gotas.
Animais de médio porte: 1 colher das de chá (5ml).
Animais de grande porte: 2 colheres de chá (10ml).

Apresentação: Frasco contendo 20ml, 50ml e 100ml.

Vetococ SM

Indicação: Coccidiose aviária, Cólera aviária, Coriza infecciosa das aves, pulorose aviária.

Composição: Cada 100 mL contém:
Sulfametazina.....12,5g
Sulfaquinoxalina.....5,00g
Bacitracina de Zinco..... 2,5g
Veículo q.s.p..... 100,0mL

Modo de uso: Administração: Oral.
Curativo - 1 envelope de 4g diluido em 2 Litros de água diariamente, durante 3 dias, descansar 2 dias e repetir se necessário.

Preventivo - 1 envelope de 4g diluido em 4 Litros de água diariamente, durante 3 dias, descansar 2 dias e repetir se necessário

Apresentação: Contém 20 envelopes de 4g.

A QUÍMICA Santa Marina

Tylotrat SM

Indicação:
Tratamento das complicações respiratórias de origem bacterianas.

Composição:
Cada 100 mL contém:
Tilosina..... 2,5g
Veículo q.s.p..... 100,0mL

Modo de uso:
Administração: Oral.
20mL em 1 Litro de água, diariamente, de 3 a 5 dias.

Apresentação: Frascos de 20mL.

Ferro SM

Indicação:
Ferro SM é indicado nas anemias ferroprivas e macrocíticas. Nas convalescenças, anormalidades do crescimento, perdas de peso e apetite, perturbações do sistema nervoso, digestivo e circulatório, Oftalmias periódicas dos equídeos.

Composição: Cada 100mL contém:
Citrato de Ferro Amoniacal 2,00g
Vitamina B-2.....10,00mg
Vitamina B-6.....10,00mg
Nicotinamida.....100,00mg
Veículo aquoso q.s.p.....100,00mL

Modo de uso:
Somente para uso oral, puro ou misturado na água de beber ou alimentos.
Posologia:
PÁSSAROS: 5 a 10 gotas no bebedouro diariamente.
Administrar durante 10 dias e descansar 5 dias.

Apresentação: Frasco de 20, 100mL e 1L.

Neo Sulmetina SM

Indicação: O Neo Sulmetina SM atua com sucesso em todos os tipos de diarréias e enterites bacterianas.

Composição: Cada 100 mL contém:
Sulfaquinoxalina ..... 2,00 g
Sulfato de neomicina ..... 0,20 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 mL

Modo de uso: Produto de uso interno, por via oral misturado à água de beber, ração ou puro nas seguintes doses: Curativo: ANIMAIS DE PEQUENO PORTE - 1/2 colher de sopa (7,5mL), durante 3 dias; descansar 2 e repetir por mais 3 se necessário; ANIMAIS DE MÉDIO PORTE - 1/2 colher de sopa (7,5mL) para cada 10kg de peso vivo, diariamente, durante 3 dias, descansar 2 e repetir 3, sendo necessário; ANIMAIS DE GRANDE PORTE - 5 colheres de sobremesa (50mL) para cada 100g de peso vivo, durante 3 dias.
Tratamento da enterite bacteriana: 1/2 colher de café (1mL), diariamente, durante 2 dias;
AVES - 25mL por litro de água, diariamente, durante 3 dias. Descansar 2 e repetir por mais 3 dias sendo necessário;
PÁSSARO DE GAIOLA - 20 gotas (1mL) em 100mL de água, diariamente, durante 3 dias.
Descansar 2 e repetir por mais 3 dias, se necessário.

Apresentação: Frascos de 15, 100 e 1000mL.

GRANDES ANIMAIS

Antitóxico SM

Indicação:
Intoxicações causadas pela ingestão de alimentos deteriorados, plantas tóxicas e medicamentos. Durante e após administração de antibióticos, quimioterápicos, anti-infecciosos e nas degenerações das células hepáticas e infiltrações gordurosas.

Composição: Cada 100ml contém:
Acetil-DL - Metionina.....6,00g
Cloreto de Colina.....4,00g
Vitamina B2.....0,02g
Vitamina B6.....0,20g
Nicotinamida.....0,50g
Dextrose.....20,00g
Veículo aquoso q.s.p.....100,00mL

Modo de uso:
Por via injetável.
Através das vias intramuscular ou intravenosa.

Apresentação: Frasco de 20, 50 e 100mL.

Cort-Trat SM Injetável

Indicação:
Processos inflamatórios articulares: tendinites, bursites, luxações e miosites; reações alérgicas; doenças dermatológicas; tratamento das gonites, paresia posterior canina e condições de stress.

Composição:
Cada 100 ml contém:
Dexametasona.....200mg
Veículo q.s.p.....100mL

Modo de uso e Posologia:
Vias de administração: Intramuscular.
Dosagem:
Bovinos - 2,5 a 10mL
Equinos - 1,5 a 2,5mL
Cães - 0,25 a 1mL
Gatos - 0,125 a 0,5mL
Precauções:
Desaconselhavel o uso prolongado.
Não é recomendado interromper o tratamento abruptamente e sem usar um esquema regressivo de dosagens.

Apresentação: Frasco de 10 e 50mL.

Ferro SM

Indicação:
Ferro SM é indicado nas anemias ferroprivas e macrocíticas. Nas convalescenças, anormalidades do crescimento, perdas de peso e apetite, perturbações do sistema nervoso, digestivo e circulatório, Oftalmias periódicas dos equídeos.

Composição:
Cada 100mL contém:
Citrato de Ferro Amoniacal 2,00g
Vitamina B-2.....10,00mg
Vitamina B-6.....10,00mg
Nicotinamida.....100,00mg
Veículo aquoso q.s.p.....100,00mL

Modo de uso:
Somente para uso oral, puro ou misturado na água de beber ou alimentos.
Posologia: CÃO, GATO, COELHO, LEITÃO: 1 colher das de café (2mL) 2 vezes ao dia. BEZERROS, PORCOS, OVELHAS, POTROS: 2 a 3 colheres de sobremesa ao dia (10mL).
CAVALOS, BOIS, MUARES: 2 a 3 colheres de sopa ao dia (15mL).
AVES: para aumentar a postura. Durante a aplicação de vermífugos, coccidiostáticos e outros medicamentos.
PÁSSAROS: 5 a 10 gotas no bebedouro diariamente.
Administrar durante 10 dias e descansar 5 dias.

Apresentação: Frasco de 20, 100mL e 1L.

Ectomosol SM

Indicação: No tratamento das sarnas e outras ectoparasitoses. Preparação moderna, eficiente, cômoda e higiênica, para combater a Sarna Sarcóptica e Corióptica. Auxiliar na eliminação das pulgas, piolhos e outras ectoparasitos.

Composição:
Cada 100mL contém:
Sulfiran.....3,00g
Veículo q.s.p.....100,00mL

Modo de uso e Posologia: Unicamente por via externa, em pulverizações. Retirar a tampa, apertar o botão da válvula, dirigindo o jato para a lesão, mantendo o tubo a 20cm da pelo do animal. Fazer uma aplicação diária, repetindo nos dias seguintes.

Apresentação: Frasco de 30mL e Spray de120mL.

Neotopic Spray SM

Indicação:
Infecções bacterianas dos olhos e da pele; queratites, conjuntivites, feridas purulentas, abcessos, infecções em feridas superficiais e ferimentos acidentais e cirúrgicos.

Composição:
Cada 100mL contém:
Sulfato de Neomicina.....500,00mg
Bacitracina de Zinco.....1,00g
Hidrocortizona.....1,00g
Veículo aquoso q.s.p.....100,00mL
Propelente: Butano.

Modo de uso e Posologia:
Aplicar uma camada fina e uniforme de maneira a cobrir toda a lesão. Fazer uma aplicação diária. Repetir o tratamento o quanto necessário de acordo com orientação do Médico Veterinário.

Apresentação: Frasco de 125mL.

Neo Sulmetina SM

Indicação:
O Neo Sulmetina SM atua com sucesso em todos os tipos de diarréias e enterites bacterianas.

Composição:
Cada 100 mL contém:
Sulfaquinoxalina.....2,00g
Sulfato de neomicina.....0,20g
Veículo q.s.p..... 100,0mL

Modo de uso e Posologia:
Produto de uso interno, por via oral misturado à água de beber, ração ou puro nas seguintes doses:
Curativo:
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE - 1/2 colher de sopa (7,5mL), durante 3 dias; descansar 2 e repetir por mais 3 se necessário;
ANIMAIS DE MÉDIO PORTE - 1/2 colher de sopa (7,5mL) para cada 10kg de peso vivo, diariamente, durante 3 dias, descansar 2 e repetir 3, sendo necessário;
ANIMAIS DE GRANDE PORTE - 5 colheres de sobremesa (50mL) para cada 100kg de peso vivo, durante 3 dias.
Tratamento da enterite bacteriana: 1/2 colher de café (1mL), diariamente, durante 2 dias.

Apresentação: Frascos de 15, 100 e 1000mL.

Benzocreol

Indicação:
Desinfetante com ação sobre microorganismos dos gêneros Salmonella, Staphylococcus, Pseudomonas e Escherichia. Equipamentos e utensílios pecuários; nas afecções das mucosas e no tratamento do umbigo dos recém-nascidos.

Composição:
Cada 100mL contém:
Cresóis em fenol.....12g
Hidrocarbonetos saturados.....12g
Emulsificantes saponáceos.....12g
Veículo q.s.p.....100mL

Modo de uso e Posologia:
Como desinfetante de equipamentos e utensílios pecuários:
Utilizar solução a 3% (3 partes do produto em 100 partes de água) durante 5 a 10 minutos.
Nas afecções e no umbigo de recém-nascidos:
Utilizar Benzocreol puro ou em solução a 3% durante 3 a 5 dias seguidos.

Apresentação: Embalagem de 100mL, 500mL, 1L, 20L e 200L.

Vitaká SM

Indicação: Vitaka Sm é um anti-hemorrágico e diminuidor do tempo de coagulação. Prevenção pré-natal das diáteses hemorrágicas dos recém-nascidos. Nas fases pré e pós-operatórias, castrações, ferimentos graves e partos.

Composição: Cada 100ml de Vitaka Sm contém:
Vitamina K.....200,00mg
Véiculo aquoso q.s.p.....100,00mL

Modo de uso: Administrar o produto Vitaka Sm via intramuscular.
Animais de pequeno porte - 0,5 a 3ml de Vitaka Sm durante 3 a 5 dias.
Animais de médio porte - 5ml de Vitaka Sm durante 3 a 5 dias.
Animais de grande porte - 10ml de Vitaka Sm durante 3 a 5 dias.

Apresentação: Frasco de 20mL.

BIOFARM
Tecnologia em veterinária

PEQUENOS ANIMAIS

Biodex

Indicação:
No tratamento de poliartrites, reumatismos, artrites e dores articulares, musculares e nervosas. Também indicado nas afecções alérgicas, pruridos associados com dermatoses, eczemas não específicos e estados anafiláticos.

Composição: Cada 1mL contém:
Dexametasona (fosfato dissódico).....5,0mg*
Veículo q.s.p. 1,0mL
** Equivalente a 3,8mg de dexametasona base.*

Modo de uso:
Administrar por via intramuscular ou intravenosa.
Posologia: Cães e gatos: 0,1 a 0,5mL.

Apresentação: Frasco contendo 10mL.

Biodex Comprimidos

Indicação:
BIODEX Comprimido é um potente anti-inflamatório, indicado nos tratamentos que necessitem de respostas imediatas. Utilizado como antipruriginoso e antirreumático nas afecções tais como: dermatites inespecíficas, tendinites, artrites, reumatismos articulares e musculares, gonites, paresia posterior, complicações inflamatórias de afecções traumáticas.

Composição:
Cada comprimido de 120mg contém:
Dexametasona (acetato)_____0,5mg
Veículo q.s.p._____120,0mg

Modo de uso:
Administrar por via oral em dose única ou dividida em duas vezes ao dia.
Posologia: Cães de pequeno porte: 1/2 a 1 comprimido.

Apresentação:
Blister contendo 20 comprimidos.

Biotril

Indicação: É indicado e recomendado para cães na prevenção da dirofilariose: elimina os estágios tissulares da larva de Dirofilaria immitis *(verme do coração)* até 30 dias após a infecção. Tratamento e controle da ascaridiose *(Toxocara canis, Toxocara leonina)* e da ancilostomose *(Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense e Uncinaria stenocephala)*. Tratamento contra as formas adultas e larvárias dos cestoides *(Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoides spp, Taenia hydatigena, Taenia multiceps, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Taenia taeniaeformis)* e tricurídeos *(Trichuris vulpi)*.

Composição: Cada comprimido de 512mg contém:
Ivermectina 68µg
Pamoato de Pirantel.....144mg
Praziquantel 50mg
Veículo q.s.p. 512mg

Modo de uso:
Administrar por via oral. Dose mínima recomendada: 6,8µg de ivermectina, 14,4mg de pamoato de pirantel e 5mg de praziquantel por kg de peso corpóreo a intervalos mensais.
Posologia: Cães e gatos:
0 a 2kg - 1/4 comprimido; 2 a 5kg - 1/2 comprimidos; 5 a 10kg - 1 comprimido; acima de 10kg - 1 comprimido para cada 10kg.

Apresentação: Blister contendo 4 Comprimidos.

Biotox

Indicação: Indicado no combate de carrapatos, piolhos e sarnas dos tipos Sarcoptes scabei, inclusive a sarna demodécica (Demodex canis) e demais ectoparasitas em cães.

Composição: Cada 100mL contém:
Amitraz.....12,5g
Veículo q.s.p.....100,0mL

Modo de uso:
Uso extremo através de pulverização e banho.
Posologia:
Cães - No tratamento da sarna sarcóptica, diluir 10mL de BIOTOX em 5 litros de água, banhando uma vez e repetindo o banho com 7 a 10 dias de intervalo. No tratamento da sarna demodécica diluir 10mL em 2,5 litros de água, banhando o animal num total de 3 a 4 banhos, com intervalo semanal. No controle de carrapatos diluir 10mL em 5 litros de água banhando uma vez e repetindo após 3 semanas se necessário. Aplicar a mistura no cão, friccionando bem o pelo com uma esponja ou pano (todo o corpo do animal deve ser molhado pela mistura, principalmente entre as pernas, cauda e cabeça). O animal não deve ser enxaguado e deve ser seco à sombra para melhor eficácia do produto. Utilizar para a higienização do canil a sobra da solução utilizada no banho ou um nova solução deve ser preparada nas mesmas proporções, deixando secar sem enxaguar.

Apresentação: Frasco contendo 20, 40, 250ml e 1L.

Carrapatox

Indicação:
Carrapaticida e sarnicida a base de piretróide de ação prolongada para pulverização ou banho dos animais.

Composição:
Cada 100mL contém:
Cipermetrina 10,0g
Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de uso e Posologia:
Cães - diluir 1mL de CARRAPATOX para 1 litro de água ou 20mL do produto para 20 litros de água e efetuar o banho ou pulverização.
Instalações: Diluir 20mL de CARRAPATOX para 4 litros de água. Pulverizar estruturas como: pisos, paredes, teto e corredores. Utilizar 1 litro para cada 10 - 15m² de área.

Apresentação: Frascos contendo 20ml, 100mL

Colírio Biofarm

Indicação:
COLÍRIO BIOFARM é indicado nas infecções, lesões e irritações oculares que comumente afetam os animais domésticos. Pode ser utilizado em casos de lesões de córnea.

Composição:
Cada 10mL contém:
Sulfacetamida Sódica.....0,06g
Ácido Bórico 0,02g
Clorobutanol *(Álcool Triclorobutílico) 0,003g*
Cloridrato de Nafazolina.....0,01g
Veículo q.s.p. 10,0mL

Modo de uso e Posologia:
Instilar 3 gotas nos olhos afetados a cada 8 horas, durante 5 dias, ou a critério do Médico Veterinário.

Apresentação: Frasco conta-gotas contendo 20mL.

Sarniran

Indicação:SARNIRAN é eficaz na prevenção e controle das sarnas sarcópticas, otodécicas, corióptícas e micoses em cães. Auxilia no controle de pulgas, piolhos e carrapatos. Atua sobre dermatites, eczemas e pruridos.

Composição: Cada 100mL contém:

Monossulfiram.....2,5g

Veículo q.s.p.....100,0mL

Modo de uso: Aplicar uma vez ao dia durante 3 dias consecutivos, repetindo-se o tratamento, caso seja necessário, a cada 7 dias por duas semanas, ou a critério do Médico Veterinário. Nos casos de sarna otodécica, após a limpeza do ouvido externo afetado, instilar de 2 a 5 gotas conforme o porte do animal a ser tratado.

Apresentação: Frascos contendo 30ml e 100mL

Entero-Bio

Indicação:
Potente antidiarreico de efeito imediato, é indicado no tratamento das afecções gastrointestinais e diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas e micoplasmas sensíveis a sulfa e estreptomicina.

Composição:
Cada envelope de 15g contém:
Ftalilsulfatiazol.....1,0g
Sulfaguanidina.....1,5g
Sulfato de Estreptomicina.....0,45g
Hidróxido de Alumínio.....0,8g
Pectina.....0,6g
Caulim.....3,5g
Veículo q.s.p.....15,0g

Modo de uso:
Administrar por via oral, misturado à ração ou em líquidos.
Posologia:
Cães e gatos: 1/2 envelope a cada 12 horas. Os animais recém nascidos devem receber a metade da dose acima recomendada. O tratamento deverá ser mantido durante dois dias após o desaparecimento dos sintomas.

Apresentação: Envelope contendo 15g.

Tussedan Xarope

Indicação:
TUSSEDAN Xarope atua nas infecções das vias respiratórias e na asma brônquica dos animais domésticos. Em sua formulação possui princípios ativos que agem eficazmente , trazendo alívio imediato para o incômodo da tosse.

Composição:
Cada 100mL contém:
Bromolactobionato de Cálcio.....1,5g
Sulfoguaiacolato de Potássio.....1,5g
Cloreto de Amônio.....0,6g
Tintura de Lobélia.....2,0mL
Xarope de Poligala.....5,0mL
Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de uso:
Administrar por via oral.
Posologia: Cães de grande porte: 1 colher das de chá (5mL) de 3 em 3 horas; Cães de porte médio e pequeno: 1 colher das de chá (5mL) de 4 em 4 horas; Gatos adultos: 1 colher das de chá (5mL) de 4 em 4 horas.

Apresentação:
Frasco contendo 100mL (acompanha seringa dosadora).

Estrogin

Indicação: Cio: Regularização de cios, tratamento de cio silencioso e anestro. Produzir cios com copulação fértil. Retenção de Placenta: Na insuficiência contrátil primária e secundária da musculatura uterina durante o parto. Na atonia do útero e hemorragias pós-parto.
Prolapso Uterino: em casos recentes. Iminência de febre puerperal: em cadelas e gatas.
Contraceptivo em caso de coito indesejado.

Composição: Cada 5mL contém:
Benzoato de Estradiol..0,005g
Veículo q.s.p.....5,0mL

Modo de uso:
Cadelas e gatas: Administrar 1,5mL por via intramuscular
Posologia: Contraceptivo em cadelas (coito indesejado): recomenda-se administrar 0,2mL/kg entre o 2º e 7º dia pós-coito.
Contra-indicação: Estrogin não deve ser administrado em fêmeas durante o período de gestação por provocar aborto.

Apresentação:
Ampolas contendo 2mL (acompanhadas de seringa e agulha) e 5mL.

Mebendazol

Indicação:
É indicado no tratamento das infestações por vermes nematódeos dos gêneros Toxocara, Toxascaris, Ancylostoma, Trichuris, Uncinaria e Strongyloides; vermes cestódeos dos gêneros Taenia, Echinococcus e Dipylidium.

Composição:
Cada comprimido de 300mg contém:
Mebendazol.....100mg
Veículo q.s.p. 300mg

Modo de uso e Posologia:
Administrar por via oral.
Cães: Acima de 10kg de peso: administrar um comprimido a cada 12 horas, durante 3 dias consecutivos. Abaixo de 10kg de peso: administrar 1/2 comprimido a cada 12 horas, durante 3 dias consecutivos.
Gatos: Administrar 1/2 comprimido, a cada 12 horas, durante 3 dias consecutivos.

Apresentação: Strip contendo 6 comprimidos.

Otovet Limp

Indicação: OTOVET Limp é uma solução pronta para uso e é indicada para a higienização do conduto auditivo de cães e gatos, eliminando as sujidades, cerúmen, umidade e odores. É utilizada também antes da aplicação de produtos para o tratamento de otites. Indicada também para limpezas rotineiras. Sua formulação promove a remoção do excesso de cerúmen e oleosidade que acumulam-se no ouvido externo sem causar irritações, enquanto suaviza e hidrata a pele.

Composição: Cada 100mL contém:
Ácido lático.....2,9g
Ácido salicílico.....0,11g
Lauril éter sulfato de sódio....1,0g
Veículo q.s.p.....100,0mL

Modo de uso: Uso tópico. Limpar as áreas acessíveis do ouvido externo com algodão embebido em OTOVET Limp. Em seguida aplicar o produto pressionando o frasco em direção ao conduto auditivo e simultaneamente massagear a base da orelha, retirando com algodão ou material absorvente o excesso de solução. Recomenda-se a aplicação do produto de 1 a 2 vezes por semana nos casos de limpeza de rotina e após o banho para garantir o ouvido limpo e seco.

Apresentação: Frascos contendo 100mL

Otovet

Indicação: OTOVET é uma solução otológica antibacteriana, antimicótica, anti-inflamatória e analgésica. O enrofloxacino e o clotrimazol atuam no controle de otites causadas por bactérias e fungos. A dexametasona é um potente anti-inflamatório de ação local que proporciona maior conforto ao animal pela diminuição da dor provocada pela inflamação. O cloridrato de lidocaína é um anestésico local utilizado no tratamento da dor com baixa toxicidade, proporcionando alívio imediato e favorecendo o processo de cura.

Composição: Cada 100mL contém:
Enrofloxacino.....0,5g
Clotrimazol.....1,0g
Dexametasona (fosfato dissódico).....0,132g*
Cloridrato de Lidocaína.....2,0g
Veículo q.s.p.....100,0mL
**Equivale a 0,10g de Dexametasona base*

Modo de uso: Animais com menos de 15Kg - instilar 3 a 6 gotas 2 a 3 vezes ao dia. Animais acima de 15Kg - instilar 6 a 12 gotas 2 a 3 vezes ao dia. Manter o tratamento durante 10 dias ou a critério do Médico Veterinário.

Apresentação: Frascos contendo 20mL (acompanha bico aplicador)

SPOT Plus

Indicação: **SPOT Plus** é indicado no controle e prevenção das infestações por pulgas (*Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) nos cães. Auxilia no tratamento e controle da dermatite alérgica pela picada de pulgas (DAPP). Atua também como repelente de mosquitos pertencente à família dos flebotomídeos, o *Lutzomyia longipalpis*, vetores da Leishmaniose visceral (*Leishmania chagasi*).





Figura 2 - Região entre a nuca e as escápulas - início da aplicação (1)
Região dorsal - extensão da aplicação (2 e 3)

Composição: Cada 100mL contém:
Permetrina.....37,5g
Metopreno.....2,0g
Butóxido de piperonila.....1,3g
Veículo q.s.p.....100,0mL

Modo de uso: SPOT Plus é um produto de uso tópico, pronto para uso e de fácil aplicação.
1. Retire a ponta da pipeta na linha demarcada (Figura 1);
2. Posicione a pipeta na região entre a nuca e as escápulas e aplique todo o conteúdo da pipeta sobre a pele ao longo do dorso, evitando que o produto escorra, conforme seqüência demonstrada na ilustração (Figura 2).

Apresentação: Pipetas contendo 1,5mL, 3,0mL, 6,0mL e 9,0mL.

POSOLOGIA

A dose deve ser aplicada de acordo com o peso do animal, conforme descrito abaixo:

Cães até 10Kg	1 pipeta contendo 1,5mL
Cães de 10 a 20Kg	1 pipeta contendo 3,0mL
Cães de 20 a 40Kg	1 pipeta contendo 6,0mL
Cães acima de 40Kg	1 pipeta contendo 9,0mL

Recomenda-se que o tratamento seja repetido a cada 4 semanas para melhor controle e prevenção de pulgas, carrapatos e mosquitos.

Não repetir o tratamento com menos de 07 dias.

BIOFARM
Tecnologia em veterinária

Vetiolate

Indicação: Antisséptico indicado para lesões de pele, escoriações, assepsia pré-cirurgica, cortes e desinfecção do umbigo dos recém-nascidos.

Composição: Cada 100mL contém:

Timerosal.....100,0mg

Veículo q.s.p.....100,0mL

Modo de uso: Uso tópico, pronto para uso. Após limpeza do local, aplicar VERTIOLATE direcionando a válvula spray para o local a ser tratado.

Apresentação: Frascos contendo 30ml e 500mL

Floxiclin Comprimidos

Indicação: FLOXICLIN Comprimidos é um antibiótico que pertence ao grupo das quinolonas de terceira geração, de amplo espectro de ação. Está indicado para cães e gatos no tratamento de diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao enrofloxacino. É eficaz no tratamento das infecções do aparelho digestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestivo. Infecções dérmicas: piodermite. Infecções do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas).

Composição: Cada comprimido de 120mg contém:

Enrofloxacino 50,0mg

Veículo q.s.p. 120mg

Cada comprimido de 360mg contém:

Enrofloxacino 150,0mg

Veículo q.s.p. 360mg

Modo de uso: A dose recomendada para cães e gatos é de 5,0mg de Enrofloxacina por kg de peso, ou seja: 1 comprimido de FLOXICLIN 50mg para cada 10kg de peso corporal. Animais com peso até 5kg administrar 1/2 (meio) comprimido. Animais com 20kg de peso corporal, administrar 2 comprimidos. 1 comprimido de FLOXICLIN 150mg para cada 30kg de peso corporal. Animais com peso até 15kg administrar 1/2 (meio) comprimido. Animais com 60kg de peso corporal, administrar 2 comprimidos.

Apresentação: Blister contendo 10 comprimidos de 50mg e 150mg

GRANDES ANIMAIS

Biomast

Indicação:
Indicado nos tratamentos de mastites clínicas e subclínicas, causadas por uma ampla variedade de bactérias sensíveis ao cefoperazone, que pertence a família das cefalosporinas, porém de terceira geração. BIOMAST possui atividade antimicrobiana eficaz contra bactérias de difícil controle.

Composição:
Cada seringa com 10mL contém:
Cefoperazone.....250,0mg
Veículo q.s.p. 10,0mL

Modo de uso e Posologia:
Após esgotar o leite, lavar o teto com água e sabão e enxugá-lo com toalha limpa. Injetar o conteúdo de uma seringa e massagear suavemente o teto tratado de baixo para cima, para que o medicamento alcance as regiões mais altas.

Apresentação: Seringas aplicadoras contendo 10mL.

Biomast VS

Indicação:
BIOMAST VS foi especialmente desenvolvido para o tratamento e prevenção das mastites durante o período de secagem (vaca seca). Possui ação prolongada (5 semanas). Atua sobre uma variedade de agentes causadores das mastites em bovinos e caprinos.

Composição: Cada 10g contém:
Penicilina G Procainada.....100.000UI
Di-Hidroestreptomicina.....0,10g
Sulfato de Neomicina.....0,735g
Veículo q.s.p. 10,0g

Modo de uso e Posologia:
Após a última ordenha, proceder a higienização do úbere, desinfetando os tetos. Retire a tampa da seringa dosadora e aplique todo o conteúdo da seringa (10g) de BIOMAST VS no canal do teto. Após a aplicação, massagear o úbere suavemente de baixo para cima facilitando a dispersão e penetração.

Apresentação: Seringas aplicadoras contendo 10g.

Equitrat Gold

Indicação:
EQUITRAT Gold é um endectocida de amplo espectro, de uso exclusivamente oral. Indicado para tratamento e controle de verminoses gastrointestinais, controle de microfilárias e eficaz contra pequenos estrôngilos adultos e larvas de 4º estágio incluindo as espécies resistentes aos benzimidazóis. Dermatoses causadas por larvas cutâneas de Habromena spp. ("Feridas de Verão" ou "Esponjas").

Composição:
Cada 100g contém:
Ivermectina.....1,87g
Veículo q.s.p.....100g

Modo de uso e Posologia:
Calcular o peso do animal a ser tratado. Girar o anel de acordo com a graduação existente no êmbolo da seringa associando com o peso do animal.
Administrar por via oral, na dosagem de 1,07g para cada 100kg de peso ou 200μg de ivermectina por kg de peso corporal. Uma seringa é suficiente para tratar um animal de 600kg.

Apresentação: Seringa plástica auto-dosadora contendo 6,42g.

Floxiclin

Indicação:
FLOXICLIN é uma solução antimicrobiana, com amplo espectro de ação, indicada no tratamento de diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas e micoplasmas sensíveis ao enrofloxacino. É eficaz no tratamento das infecções do aparelho disgestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestivo.
Infecções dérmicas: piodermite. Infecções do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas). Infecções do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite. Infecções do aparelho auditivo: otites. Complexo MMA (metrite, mastite, agalaxia). Profilaxia nas infecções pós-operatórias: descornas, castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.

Composição: Cada 100mL contém:
Enrofloxacino.....10,0g
Veículo q.s.p.....100mL

Modo de uso:
Administrar por via subcutânea ou intramuscular.
Posologia: A dose recomendada é de 2,5mg de Enrofloxacino por kg de peso, para bovinos, suínos, ovinos e caprinos, o que corresponde a 1mL de FLOXICLIN para cada 40kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante 3 a 5 dias consecutivos.

Apresentação: Frasco contendo 10mL e 50mL.

Biofen 10%

Indicação: Por sua potente ação anti-inflamatória, antipirética e analgésica o BIOFEN 10% é muito eficaz no alívio das dores associadas às cólicas e principalmente nos tratamentos dos distúrbios músculo-esqueléticos (artrose, artrite, distensões, tendinites, laminites, entorses, luxações, edemas, claudicações), afecções respiratórias, mamites e cólicas. Por não ser corticóide é muito recomendado nas dores pós-traumáticas e pós-operatórias (castrações, descornas e caudectomia em ovinos). Tratamento sintomático da febre.

Composição:
Cada 100mL contém:
Cetoprofeno.....10,0g
Veículo q.s.p.....100,0mL

Modo de uso:
Administrar por via intramuscular ou intravenosa uma vez ao dia durante 3 a 5 dias consecutivos.
Posologia:
Equinos - 2,2mg de cetoprofeno por kg de peso corpóreo, ou seja, 1mL de BIOFEN 10% para cada 45kg de peso.
Bovinos, ovinos, caprinos e suínos - 3mg de cetoprofeno por kg de peso corpóreo, ou seja, 1,5mL de BIOFEN 10% para cada 50kg de peso.

Apresentação: Frasco contendo 10 e 50mL.

Biomectina

Indicação:
Endectocida de amplo espectro, indicado no tratamento e controle de parasitas internos e externos de bovinos. Controla os vermes gastrointestinais (adultos e larvas de 4º estágio): Ostertagia ostertagi (inclusive larvas em hipobiose), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophoroa, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus (adulto), Nematodirus spathiger (adulto) e Strongyloides papilosus. Outros vermes redondos: Parafilaria bovicola e Thelazia spp. (adulto).Bernes: larvas de Dermatobia hominis, Hypoderma bovis e H. lineatum. Piolhos: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capilatus e Damalinia bovis. Ácaros: Psoroptes ovis (sin. P. communis var bovis), Sarcoptes scabiei var bovis e Chorioptes bovis. Carrapatos: Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

Composição:
Cada 100mL contém:
Invermectina.....1,0g
Veículo q.s.p.....100,0mL

Modo de uso:
Administrar o produto por via subcutânea.
Posologia:
Aplicar BIOMECTINA na dosagem de 1mL para cada 50kg de peso.
Equivalente a 200μg de Ivermectina por kg de peso corporal.
Restrições de uso: Não administrar em vacas leiteiras lactantes.

Apresentação:
Ampola contendo 1mL e Frascos contendo 50mL.

Triazoclin

Indicação:
TRIAZOCLIN é indicado nos casos de enfermidades sensíveis à Sulfadiazina e ao Trimetoprim, tais como: pneumonia, rinite, bronquite infecciosa, infestações secundárias às pneumonias por vírus, garrotilho, diarreias, vaginite, metrite, agalaxia bacteriana, como preventivo de infecções pós-parto e pós-operatório, cistite, uretrite, nefrite, mastite, poliartrite infecciosa, pododermatite e septicemias.

Composição:
Cada 100mL contém:
Sulfadiazina.....40,0g
Trimetoprim.....8,0g
Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de uso:
Administrar por via intramuscular profunda.
Posologia:
A dose diária recomendada é de 1mL para cada 30kg de peso. Recomenda-se a continuação do tratamento por um período de até 48 horas após o desaparecimento dos sintomas, não excedendo 5 dias consecutivos.
** Em infecções graves, a dose diária poderá ser aumentada para 1,5mL para cada 30kg de peso.*

Apresentação: Frascos contendo 15, 50 e 100mL.

Zoovit B12

Indicação:
ZOOVIT B12 destina-se a animais acometidos de anemia megaloblástica, avitaminose do complexo B, insuficiência hepática e anorexia (falta de apetite). Medicação coadjuvante no tratamento de nevralgias, artrites e neuropatias. Animais de corrida, salto ou de tração, que trabalham sob condições de "stress", decorrentes da hiperatividade muscular, respondem bem ao tratamento com ZOOVIT B12.

Composição:
Cada 100mL contém:
Cianocobalamina (Vit B12) 200.000mcg.....0,2g
Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de uso:
Administrar diariamente, por via subcutânea ou intramuscular.
Posologia:
Equinos e bovinos - adultos 10mL - jovens 5mL;
Suínos, caprinos e ovinos - adultos 5mL - jovens 2mL

Apresentação: Frasco contendo 10mL

Óleo Canforado

Indicação:
Adjuvante no tratamento das pneumonias, pleuropneumonias, broncopneumonias, bronquites e traqueobronquites.

Composição:
Cada 10mL contém:
Guaiacol.....0,25g
Eucaliptol.....0,6g
Cânfora.....1,5g
Clorofila.....0,02g
Veículo q.s.p. 10,0mL

Modo de uso e Posologia:
Administrar diariamente durante todo o período da enfermidade, exclusivamente por via intramuscular, nas seguintes dosagens.
Equinos e bovinos: 10 a 20mL.
Suínos, caprinos e ovinos: 5 a 10mL.

Apresentação: Ampola contendo 10mL.

Biozol

Indicação:
Tratamento e prevenção de feridas contaminadas por miíases (bicheiras) e como repelente de moscas em geral. Também é indicado como antisséptico e cicatrizante no tratamento do umbigo dos recém-nascidos, frieiras e podridão dos cascos. Eficiente na cicatrização de feridas da pele ou cirúrgicas (castrações e descornas) e tratamento local de berne.

Composição:
Cada 100mL contém:
DDVP.....1,00g
Cipermetrina.....0,50g
Triclorfon 2,00g
Violeta Genciana.....0,15g
Colofônia (Breu).....10,00g
Alcatrão.....1,00g
Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de uso e Posologia:
Uso Tópico. Após limpeza do ferimento aplica-se o produto diretamente sobre o local a ser tratado. Repetir a aplicação a cada 24 horas até o desaparecimento dos sintomas. Usar luvas para a aplicação do produto.

Apresentação: Frasco plástico tipo spray contendo 250mL.

Revigoreide M.O.

Indicação: REVIGOREIDE M.O. é uma pasta palatável, pronta para uso. Indicada para equinos de todas as idades na suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos. Seu uso é importante para a manutenção da saúde, bem estar e o bom desempenho de equinos em diferentes fases da vida e para diferentes intensidades de exercícios. A sua fórmula foi desenvolvida para atender as necessidades diárias recomendadas por órgãos internacionais (National Research Council – Conselho Nacional de Pesquisas Americano e INRA), sem sobrecarregar o organismo do animal com quantidades exageradas de seus componentes, que seriam praticamente eliminadas sem utilidades.

Composição:
Possui na sua formulação mais de 50 nutrientes dentre eles; vitaminas, minerais quelatados, aminoácidos, destacando-se a Taurina, Creatina e Glutamina.

Modo de uso:
Equinos adultos: duas seringas (80g) a cada 15 dias.
Potros: uma seringa (40g) a cada 15 dias.

Apresentação: Cartucho contendo 2 seringas de 40g cada.

Ocitocina

Indicação: A OCITOCINA BIOFARM possui ação sobre a musculatura lisa do útero estimulando tanto a frequência quanto a força de contração muscular, auxiliando na liberação da placenta; controla a hemorragia, aumenta a contratilidade nos casos de atonia uterina e induz ao trabalho de parto. Atua também sobre a glândula mamária fazendo com que o leite desça para os canais galactóforos e cisternas, esgotando completamente a glândula mamária. Parto: encurtamento do período de expulsão ou em casos de insuficiência contrátil da musculatura. Retenção de placenta, hemorragia pós-parto e atonia uterina. Prolapso uterino em vacas e égua. Retenção de leite pós-parto. Auxiliar no tratamento de mastite por acúmulo de leite. Iminência de febre puerperal em vacas e éguas. Síndrome MMA: coadjuvante no tratamento da Metrite-Mastite-Agalaxia.

Advertências: A administração da OCITOCINA BIOFARM pela via endovenosa deve ser realizada de forma lenta, o efeito é imediato e dura cerca de 10 minutos. Por via intramuscular ou subcutânea, o efeito se manifesta dentro de 5 a 10 minutos após a aplicação. O uso concomitante com estrógenos ou cálcio aumenta o efeito da ocitocina.

Apresentação: Frascos contendo 10mL, 50mL e 100mL.

Composição: Cada 1mL contém:
Ocitocina sintética.....10,0UI
Veículo q.s.p. 1,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA

ESPÉCIE	VIAS DE ADMINISTRAÇÃO		
	Subcutânea ou Intramuscular	Endovenosa	Epidural
Vacas e éguas	2,0 - 5,0mL	1,0 - 2,5mL	1,5 - 3,0mL
Porcas até 200Kg	1,0 - 2,0mL	0,5 - 1,0mL	-
Porcas acima de 200Kg	3,0mL	1,0 - 2,0mL	-
Ovelhas e cabras	0,25 - 1,0mL	0,3 - 1,5mL	-

LAVIZOO®
A origem dos grandes campeões.

PEQUENOS ANIMAIS

Auricur Limp

Indicação: Auricur Limp é uma solução indicada para a limpeza das orelhas de cães e gatos.

Composição:
Ácido láctico, ácido salicílico, extrato camomila, essência glicerina, EDTA dissódico, metilparabeno, propilenaglicol, ácido cítrico e água.

Modo de Uso: Umedecer um algodão com o produto e limpar toda a orelha do animal. Utilizar um algodão seco para retirar as sujidades e secar o conduto auditivo. Repetir o procedimento conforme necessário até que o ouvido esteja limpo e seco.

Apresentação: Frasco contendo 100mL.

Limpa Lágrimas

Indicação:
PLimpa Lágrimas Lavizoo é uma solução de limpeza para a higienização da região periocular de cães e gatos. Remove secreções e crostas. Uso externo.

Composição:
glicerina bidestilada, metiparabeno, ácido bórico, DMDM, hidantoína(dimetilol dimetil hidantoina ou 1,3 - dimentiol,-5-5-dimetilhidantoina, extrato glicólico de camomila, veiculo q.s.p.

Modo de uso e Posologia:
Umedecer uma gaze ou algodão com o produto e passar na área afetada (região ao redor dos olhos). Aplicar uma a duas vezes ao dia. Produto de uso externo.

Apresentação:
Frasco contendo 100mL

Ectopar Ponta de Orelha

Indicação:
Repelente de moscas e carrapatos em cães, com alta eficácia, à base de permetrina. Atua com repelente de moscas e carrapatos e na prevenção da dermatite específica da ponta da orelha dos cães.

Composição:
Cada 100mL contém:
Permetrina (2,2 dimetil-3(2,2 diclorovinil)-1-1-ciclopronil carboxilato de (+-) cis trans-3 fenoxibenzil.....50,0 g
Veículo q.s.p.....100,0mL

Modo de uso:
Repelente de moscas: 2 gotas nas faces interna e externa da ponta de cada orelha a cada 10 dias.
Repelente de carrapatos: 3 a 6 gotas, conforme o tamanho do animal, na base das orelhas a cada 10 dias.

Apresentação: Cartucho com uma bisnaga contendo 5mL.

Fiproderm

Indicação:
Pomada hidratante para cães e gatos à base de óleo de linhaça, óleo de rícino, vitamina A e vitamina E.
Indicada para peles secas, ásperas, desidratadas e com descamações.

Composição:
À base de óleo de linhaça, óleo de rícino, vitamina A e vitamina E.

Modo de uso e Posologia:
Aplicar uma fina camada sobre a pele do animal e espalhar.

Apresentação:
Bisnaga contendo 50g.

Laviz M O Cat Dog

Indicação:
Suplemento para cães e gatos de uso oral na forma de gel palatável com aminoácidos, vitaminas e minerais. Indicado para as fases de gestação, lactação, crescimento e senil.

Modo de uso:
Cães e gatos: até 10kg de peso: 1g/dia; de 10 a 20kg de peso: 2g/dia; acima de 20kg: 3g/dia.

Apresentação:
Caixa com uma seringa dosadora contendo 30 g.

Omega 369

Indicação:
Suplemento alimentar de pronto uso indicado para cães e gatos em todas as fases de vida.

Composição:
Níveis de garantia por kilograma do produto

Garantia	Valor/Unidade
Ácido Linoléico (Mínimo)	119g
Ácido Linolênico (Mínimo)	364g
Ácido Oléico (Mínimo)	140g
Biotina (Mínimo)	2.000mg
Manganês (Mínimo)	496mg
Vitamina A (Mínimo)	2.600.000UI
Vitamina C (Mínimo)	6.100mg
Vitamina E (Mínimo)	26.565UI
Zinco (Mínimo)	3.396,75mg
Veículo q.s.p	1.000mL

Modo de uso e Posologia:
Administrar por via oral: cães e gatos: até 10kg de peso: 1 g/dia; de 11 a 20kg de peso: 2g/dia; de 21 e 30kg de peso: 3g/dia.

Apresentação: Seringa dosadora contendo 30g.

Vermican

Indicação:
Antiparasitário interno para cães e gatos. Efetivo contra formas maduras e imaturas e com atividade ovicida. Podendo ser utilizado a partir dos 15 dias de idade. Sua formulação contém fenbendazole, princípio ativo eficaz contra giárdia.

Composição:
Fenbendazole 10%
Veículo q.s.p..... 100%

Modo de uso e Posologia:
Cães e gatos: 1mL/2kg de peso, durante 3 dias consecutivos.

Apresentação:
Frasco contendo 20mL.

Vermicão

Indicação:
Vermífugo de amplo espectro de ação eficaz contra cestódeos e nematódeos. Não apresenta efeitos embriotóxicos ou teratogênicos, podendo ser utilizado com segurança em animais reprodutores e fêmeas gestantes.

Composição:
Praziquantel .....50m g
Febantel 150mg
Veículo q.s.p.....600mg

Modo de uso e Posologia:
Cães: filhotes (a partir de 4 semanas): 1/2 comprimido/5kg de peso vivo em dose única.
Cães: adultos: 1 comprimido/10kg de peso vivo em dose única.

Apresentação:
Display com 24 blisters, contendo 4 comprimidos cada.

LAVIZOO®
A origem dos grandes campeões.

Suprafer Cat Dog

Indicação:
Suprafer Cat Dog comprimidos é um suplemento nutricional indicado para cães e gatos principalmente nas fases de gestação, lactação, crescimento e animais atletas.

Composição:
Níveis de garantia por kilograma do produto

Garantia	Valor	Unidade
Ácido Fólico (Mínimo)	6.412	mg
Ácido Nicotínico (Mínimo)	1.550	mg
Açúcares totais (Mínimo)	204,90	g
Bacillus cereus (Mínimo)	9,6x10e9	ufc
Bacillus Subtilis (Mínimo)	9,6x10e9	ufc
Cobalto (Mínimo)	118,65	mg
Cobre (Mínimo)	915	mg
Ferro quelatado (Mínimo)	7.560	mg
Lactose (Mínimo)	340	g
Magnésio (Mínimo)	400	mg
Pantotenato de Cálcio (Mínimo)	2.744	mg
Sódio (Mínimo)	11,70	g
Vitamina B1 (Mínimo)	1.646,50	mg
Vitamina B12 (Mínimo)	20.000	mcg
Vitamina B2 (Mínimo)	2.400	mg
Vitamina B6 (Mínimo)	1.328	mg
Vitamina C (Mínimo)	4.000	mg
Vitamina K3 (Mínimo)	286,20	mg
Zinco (Mínimo)	8.400	mg
Excipiente q.s.p	1.000	g

Modo de uso e Posologia: Via oral: cães e gatos até 4kg administrar 1/2 comprimido/dia; Cães acima de 4kg: administrar 1 comprimido/dia.

Apresentação: Pote com 30g (30 comprimidos sulcados de 1 grama).

Suprafer Pet

Indicação:
Preparação líquida oral de pronto uso para cães e gatos, indicada para as fases de crescimento, gestação, lactação e animais em treinamento.

Composição:
Níveis de garantia por litro do produto

Garantia	Valor/Unidade
Ácido Fólico (Mínimo)	5.500mg
Ácido Nicotínico (Mínimo)	1.325mg
Açúcares totais (Mínimo)	200g
Cobalto (Mínimo)	110mg
Cobre (Mínimo)	550mg
Ferro quelatado (Mínimo)	7.425mg
Pantotenato de Cálcio (Mínimo)	1.325mg
Vitamina B1 (Mínimo)	1.646mg
Vitamina B12 (Mínimo)	16.000mcg
Vitamina B2 (Mínimo)	1.653mg
Vitamina B6 (Mínimo)	1.317mg
Vitamina K3 (Mínimo)	276mg
Zinco (Mínimo)	5.100mg
Veículo q.s.p	1.000mL

Modo de uso e Posologia:
Cães e gatos: administrar 1 gota por kg de peso vivo (ou 1 mL para cada 15kg de peso), diretamente na boca do animal.

Apresentação: Frasco contendo 50 mL com seringa dosadora.

Glicosol Pet

Indicação: Suplemento pronto uso, indicado paracães e gatos em todas as fases de vida, principalmente na lactação. Indicado também para cães atletas.

Modo de Uso: Cães: 0,5mL/kg de peso vivo. Cadelas prenhes ou lactantes: oferecer três vezes ao dia. Gatas prenhes ou lactantes: oferecer duas vezes ao dia (diretamente na boca).

Apresentação: Frasco contendo 50 mL e 200 mL, com seringa dosadora.

Composição: Níveis de garantia por litro do produto

Garantia	Valor	Unidade
Ácido Aspártico (Mínimo)	5.644,80	mg
Ácido Glutâmico (Mínimo)	7.524	mg
Açúcares totais (Mínimo)	200	g
Alanina (Mínimo)	10,97	g
Arginina (Mínimo)	8.316	mg
DL-Metionina (Mínimo)	14	g
Fenilalanina (Mínimo)	1.881,60	mg
Glicina (Mínimo)	17,42	g
Histidina (Mínimo)	633,60	mg
Isoleucina (Mínimo)	1.600	mg
L-Lisina (Mínimo)	10,29	g
Leucina (Mínimo)	2.722	mg
Prolina (Mínimo)	13,62	g
Serina (Mínimo)	1.724,80	mg
Tirosina (Mínimo)	431,20	mg
Treonina (Mínimo)	1.058,40	mg
Triptofano (Mínimo)	1.411,20	mg
Valina (Mínimo)	1.980	mg
Veículo q.s.p	1.000	mL

Anti Tártaro

Indicação: O Anti Tártaro Lavizoo foi desenvolvido para fornecer aos cães e gatos uma higiene bucal diária. Anti Tártaro Lavizoo proporciona gengivas saudáveis, além de auxiliar na eliminação do mau hálito, placa e cálculo dentário.

Composição:
Contém: extrato de chá verde, óleo de aloe vera e óleo essencial de menta

Modo de Uso: Aplique o anti tártaro diretamente nos dentes que possuam placa ou tártaro. Aplique diariamente à noite. Para obtenção do máximo efeito, retire a comida e a água do seu animal por 30 minutos, antes e após a aplicação do gel. A escovação dentária pode auxiliar a remoção da placa e cálculo dentário amolecidos.

Apresentação: Frasco contendo 100g

Shampoo Cetodine

Indicação:
Shampoo indicado como antisséptico e coadjuvante terapêutico no combate às dermatopatias de cães e gatos de etiologia bacteriana e fúngica.

Composição:
cada 100mL, contém:
Digluconato de clorexidine 20% 20g
Cetoconazol 4g
Veículo q.s.p 100mL

Modo de uso:
Molhar o animal e aplicar o shampoo Cetodine sobre todo o corpo, em quantidade suficiente , friccionando levemente. Deixar agir pelo menos por 5 minutos e enxaguar. Secar o animal e deixá-lo ao sol. O produto deve ser aplicado a cada 3 dias ou conforme a indicação do médico veterinário.

Apresentação:
Frasco contendo 240 mL e 500 mL.

Supressor de Cio

Indicação:
Progestágeno sintético de uso oral que suprime e retarda o cio de cadelas e gatas, facilitando o manejo e diminuindo o incômodo e preocupação dos proprietários.

Composição:
Acetato de megestrol 20mg
Veículo q.s.p 250mg

Modo de uso:
Retardar o cio: Cadelas: ¼ comprimido/10 kg durante 32 dias. Gatas: ¼ comprimido/por animal durante 60 dias. Suprimir o cio: Cadelas: 1 comprimido/10 kg durante 8 dias. Gatas: ½ comprimido/por animal durante 8 dias. Pseudociese: 1 comprimido/10 kg durante 8 dias.
Outras indicações: consultar a bula do produto.

Apresentação: Caixa contendo 1 blister com 12 comprimidos.

Lavi-Fen

Indicação:
Desinfetante de ação detergente, bactericida e fungicida à base de cloreto de benzalcônio na concentração de 20%, o que proporciona maior rendimento e eficácia contra os microorganismos sensíveis ao princípio ativo do produto. Não corrosivo, não mancha tecidos e é altamente seguro. *Desinfecção e desodorização de instalações, equipamentos, incubadoras, material cirúrgico, mãos de tratadores de animais, lâminas de banho e tosa, campo operatório, clínicas e hospitais veterinários, canis, gatis e outros materiais.*

Composição: cada 100mL, contém:
Cloreto de Benzalcônio 20g
Álcool Isopropílico.....18mL
Essência de Pinho.....0,10mL
Veículo q.s.p 100mL

Modo de uso:
Desinfecção de instalações, equipamentos, mãos dos tratadores: 1 mL/litro de água.
Desinfecção de campo operatório e material cirúrgico: 2 mL/litro de água.
Desinfecção de incubadoras: 5 mL/litro de água.
*Recomenda-se deixar o produto agir por tempo não inferior a 3 minutos.

Apresentação: Frasco dosador contendo 1 litro.

LAVIZOO®
A origem dos grandes campeões.

Carvox Pet

Indicação: Suplemento vitamínico mineral aminoácido para alimentação animal. Em pasta, para cães e gatos. Auxilia na remoção de impurezas do organismo dos animais, evitando intoxicações alimentares e metabólicas. USO EXCLUSIVO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL.

Modo de Uso: Dose por aplicação será 1g para cada 10 kg de peso. Aplicar duas vezes ao dia ou conforme orientação do médico veterinário. Utilizar de 3 a 7 dias ou conforme orientação do médico veterinário.

Apresentação: Cartucho com seringa dosadora com 14g.

Composição: Níveis de garantia por kilograma do produto

Garantia	Valor	Unidade
Ácido Linoleico (Mín.)	75	g
Ácido Linolenico (Mín.)	2.980	mg
Ácido oleico (Mín.)	2.950	mg
Carvão Vegetal (Mín.)	400	g
Colina (Mín.)	15	g
Metionina (Mín.)	19	g
Zeolita (Mín.)	70	g

Laviz Pro+Pre Pet

Indicação: Pasta para cães e gatos indicada para auxiliar nas necessidades orgânicas em vitaminas, aminoácidos e minerais. Enriquecida com probiótico e prebiótico, auxilia na recomposição da microbiota intestinal, mantendo-a equilibrada.

Modo de Uso: Filhotes, cães de raças pequenas e gatos: fornecer, por via oral, 2 g do produto no nascimento, desmame, mudanças na alimentação, vacinação e após o uso de antimicrobiano. Adultos: fornecer 4 g nas debilidades, na inapetência e na recomposição da microbiota intestinal. O fornecimento pode ser alterado de acordo com as recomendações do técnico responsável.

Composição: Níveis de garantia por kilograma do produto

Garantia	Valor	Unidade	Garantia	Valor	Unidade
Lactobacillus acidophilus	2,0 x 10e11	UFC	Arginina	2.500	mg
Enterococcus faecium	2,0 x 10e11	UFC	Niacina	1.100	mg
Bacillus subtilis	4,0 x 10e11	UFC	Triptofano	1.100	mg
Bacillus cereus	4,0 x 10e11	UFC	Metionina	3.350	mg
Saccharomyces cerevisiae	2,0 x 10e11	UFC	Taurina	12.000	mg
Mananoligossacarídeo (MOS)	90	g	Glutamina	6.400	mg
Vitamina B6	3.000	mg	Cobre	70	mg
Vitamina B12	650	mcg	Ferro	800	mg
Vitamina A	6.000.000	UI	Zinco	1.100	mg
Vitamina D3	60.000	UI	Cromo	35	mg
Vitamina E	1.000	UI	Selênio	50	mg
Vitamina C	10.000	mg	Cobalto	100	mg

Apresentação:
Seringa contendo 14 g

Aminopan Pet

Indicação: Aminopan Cat Dog comprimidos é um suplemento palatável, pronto uso,indicado para cães e gatos principalmente nas fases de gestação, lactação e animais idosos.

Modo de Uso: 1 comprimido/5kg de peso vivo. Animais acima de 20kg, fornecer 5 comprimidos/dia (10g). Filhotes e raças de pequeno porte: 1/4 da quantidade recomendada nas três primeiras semanas de uso.

Apresentação: Pote contendo 100g.

Composição:
Níveis de garantia por kilograma do produto

Garantia	Valor	Unidade
Ácido Aspártico (Mínimo)	6.350,40	mg
Ácido Fólico (Mínimo)	2.250	mg
Ácido Glutâmico (Mínimo)	9.028,80	mg
Ácido Nicotínico (Mínimo)	1.500	mg
Açúcares totais (Mínimo)	100	g
Alanina (Mínimo)	9.583	mg
Arginina (Mínimo)	6.613	mg
Bacillus cereus (Mínimo)	9,6x10e9	ufc
Bacillus Subtilis (Mínimo)	9,6x10e9	ufc
Biotina (Mínimo)	600	mg
Cálcio (Mín/Máx)	105/115	g
Cistina (Mínimo)	316,80	mg
Cobalto (Mínimo)	12,60	mg
Cobre (Mínimo)	5,75	mg
Colina (Mínimo)	3.000	mg
DL-Metionina (Mínimo)	8.712	mg
Fenilalanina (Mínimo)	2.195	mg
Ferro quelatado (Mínimo)	179,28	mg
Flúor (Máximo)	415	mg
Fósforo (Mínimo)	41	g
Glicina (Mínimo)	12,95	g
Hidroxiprolina (Mínimo)	744	mg
Histidina (Mínimo)	950,40	mg
Iodo (Mínimo) 12,35	mg	
Isoleucina (Mínimo)	2.021,60	mg
L-Carnitina (Mínimo)	624	mg
L-Lisina (Mínimo)	11,23	g
Lactose (mínimo)	119,60	g
Leucina (Mínimo)	3.564	mg
Magnésio (Mínimo)	209	mg
Manganês (Mínimo)	15,81	mg
Pantotenato de Cálcio (Mínimo)	3.040	mg
Prolina (Mínimo)	2.593	mg
Selênio (Mínimo)	4,95	mg
Serina (Mínimo)	2.532	mg
Sódio (Mínimo)	4.200	mg
Tirosina (Mínimo)	1.121	mg
Treonina (Mínimo)	2.007	mg
Triptofano (Mínimo)	1.309	mg
Valina (Mínimo)	2.558	mg
Vitamina A (Mínimo)	2.250.000	UI
Vitamina B1 (Mínimo)	890	mg
Vitamina B12 (Mínimo)	1.000	mcg
Vitamina B2 (Mínimo)	1.282	mg
Vitamina B6 (Mínimo)	1.245	mg
Vitamina C (Mínimo)	1.200	mg
Vitamina D3 (Mínimo)	80.000	UI
Vitamina E (Mínimo)	165	UI
Zinco (Mínimo)	31,85	mg
Excipiente q.s.p	1.000	g

AVES

Aminosol

Indicação: Suplemento composto por aminoácidos e vitaminas do complexo B, indicado para pássaros nas diversas fases de vida dos pássaros, como: crescimento, manutenção e pré acasalamento.

Modo de Uso: Administrar 3mL para cada litro de água limpa (9 gotas para cada 100mL de água) ou 6mL para cada kg de ração.

Apresentação: Frasco gotejador contendo 10mL e 50mL.

Composição:
Níveis de garantia por litro do produto

Garantia	Valor/Unidade		
		Leucina (Mínimo)	2.336,40mg
Ácido Glutâmico (Mínimo)	6.272mg	Magnésio (Mínimo)	96mg
Ácido Nicotínico (Mínimo)	2.532mg	Pantotenato de Cálcio (Mínimo)	1.116mg
Açúcares totais (Mínimo)	279,78g	Prolina (Mínimo)	11,48g
Alanina (Mínimo)	9.266,40g	Serina (Mínimo)	1.411mg
Arginina (Mínimo)	6.969,60mg	Sódio (Mínimo)	12,38g
Biotina (Mínimo)	3mg	Tirosina (Mínimo)	352,80mg
Colina (Mínimo)	20,05g	Treonina (Mínimo)	901mg
DL-Metionina (Mínimo)	3.302,64mg	Triptofano (Mínimo)	1.191mg
Fenilalanina (Mínimo)	1.607,20mg	Valina (Mínimo)	1.679mg
Glicina (Mínimo)	14,73g	Vitamina B1 (Mínimo)	551mg
Histidina (Mínimo)	530,64mg	Vitamina B2 (Mínimo)	500,05mg
Isoleucina (Mínimo)	1.328mg	Vitamina B6 (Mínimo)	499,66mg
L-Lisina (Mínimo)	8.736mg	Veículo q.s.p	1.000mL

Lavimed-SD

Indicação:
Quimioterápico, bacteriostático, solúvel em água à base de sulfaquinoxalina e diaveridina. A associação dos princípios ativos apresenta uma ação sinérgica, que potencializa a eficácia do produto sobre os microorganismos sensíveis, tornando-o seguro para utilização em aves. Tratamento e controle da cólera aviária, coccidiose (peito seco) e tifo aviário.

Composição:
Sulfaquinoxalina sódica e Diaveridina. Propriedades: Quimioterápico e coccidicida. Dosagens e Modo de Usar: Coccidiose crônica ou aguda de pouca gravidade: 1 g/litro de água de bebida. Coccidiose aguda e grave - Tifo aviário e Cólera aviária: 1,5 g/litro de água de bebida.

Modo de uso:
Coccidiose crônica ou aguda: 1g/litro de água de bebida; tifo aviário e cólera aviária: 1,5g/litro de água de bebida. Utilizar por 3 dias consecutivos, parar 2 dias e repetir por mais 3 dias.

Apresentação:
Frasco contendo 50g com espátula dosadora.

Lavizoo Reprodução e Canto

Indicação: Suplemento indicado para pássaros em fase de reprodução e para pássaros de canto.

Modo de Uso: Administrar 3 gotas do produto em 50mL de água e homogeneizar. Trocar a água do bebedouro diariamente. Agite antes de usar

Apresentação: Frasco gotejador contendo 15mL.

Composição: Níveis de garantia por litro do produto

Garantia	Valor	Unidade
Ácido Fólico (Mínimo)	300	mg
Ácido Nicotínico (Mínimo)	17	g
Beta Caroteno (Mínimo)	2.700	mg
Biotina (Mínimo)	33,50	mg
Cobre (Mínimo)	500	mg
Colina (Mínimo)	13,50	g
DL-Metionina (Mínimo)	30,50	g
Ferro quelatado (Mínimo)	2.500	mg
Iodo (Mínimo)	110	mg
L-Lisina (Mínimo)	20,10	g
Manganês (Mínimo)	5.100	mg
Pantotenato de Cálcio (Mínimo)	2.400	mg
Vitamina A (Mínimo)	2.900.000	UI
Vitamina B1 (Mínimo)	890	mg
Vitamina B12 (Mínimo)	6.000	mcg
Vitamina B2 (Mínimo)	3.500	mg
Vitamina B6 (Mínimo)	1.302	mg
Vitamina C (Mínimo)	13	g
Vitamina D3 (Mínimo)	222.000	UI
Vitamina E (Mínimo)	45.000	UI
Vitamina K3 (Mínimo)	600	mg
Zinco (Mínimo)	4.510	mg

Lavizoo Banho

Indicação:
Produto destinado à higiene e embelezamento dos pássaros.

Composição:
Óleo de citronela, água, oxametilciclotetracilossano, BHT, metilparabeno, propilparbeno e polisorbato 80.

Modo de uso:
Pingar 13 gotas (1ml) do produto em uma banheira com 100ml de água. Para pássaros que não entram na banheira, pingar 13 gotas (1ml) do produto em 100ml de água, colocar em um frasco borrifador e borrifar sobre a gaiola.

Apresentação: Frasco contendo 30ml

LAVIZOO®
A origem dos grandes campeões.

Amino 3R

Indicação:
Suplemento indicado para pássaros em período de muda, acasalamento e reprodução.

Modo de uso:
Administrar 2mL do produto para cada litro de água de bebida (equivalente a 3 gotas para cada 50mL de água).

Apresentação: Frasco gotejador contendo 10 mL.

Composição:
Níveis de garantia por litro do produto

Garantia	Valor/Unidade
Ácido aspártico (mínimo)	2.132,48mg
Ácido glutâmico (mínimo)	2.930,40mg
Ácido nicotínico (mínimo)	3.000mg
Açúcares totais (mínimo)	109g
Alanina (mínimo)	4.233,60mg
Arginina (mínimo)	3.168mg
Biotina (mínimo)	200mg
Colina (mínimo)	30g
DL metionina (mínimo)	4.356mg
Fenilalanina (mínimo)	784mg
Glicina (mínimo)	6.692,40mg
Histidina	245,52mg
Isoleucina (mínimo)	640mg
L lisina (mínimo)	4.368mg
Magnésio (mínimo)	96,24mg
Pantotenato de cálcio(mínimo)	814,38mg
Prolina (mínimo)	5.227,20mg
Serina (mínimo)	642,88mg
Sódio (mínimo)	7.626mg
Tirosina (mínimo)	164,64mg
Treonina (mínimo)	407,68mg
Triptofano (mínimo)	540,96mg
Valina (mínimo)	792mg
Vitamina A (mínimo)	6.031.000UI
Vitamina B1 (mínimo)	378,25mg
Vitamina B12 (mínimo)	1.000mcg
Vitamina B2 (mínimo)	451,44mg
Vitamina B6 (mínimo)	150,23mg
Vitamina C (mínimo)	12g
Vitamina D3 (mínimo)	40.000UI
Vitamina E (mínimo)	1.430UI
Vitamina K3 (mínimo)	148,50mg
Veículo q.s.p	1.000mL

Orosol

Indicação: Suplemento polivitamínico indicado para pássaros nas diversas fases de vida, principalmente manutenção.

Modo de Uso: Aves: 1 mL/litro de água de bebida.

Apresentação: Frasco gotejador contendo 10mL.

Composição:
Níveis de garantia por litro do produto

Garantia	Valor/Unidade
Ácido Nicotínico (Mínimo)	9.960mg
Biotina (Mínimo)	15mg
Colina (Mínimo)	99g
Pantotenato de Cálcio (Mínimo)	2.500mg
Vitamina A (Mínimo)	20.000.000UI
Vitamina B1 (Mínimo)	1.245mg
Vitamina B12 (Mínimo)	1.000mcg
Vitamina B2 (Mínimo)	1.500mg
Vitamina B6 (Mínimo)	496mg
Vitamina C (Mínimo)	8.000mg
Vitamina D3 (Mínimo)	760.000UI
Vitamina E (Mínimo)	9.680UI
Vitamina K3 (Mínimo)	498mg
Veículo q.s.p	1.000mL

Suprafer Pássaros

Indicação: Suplemento para pássaros, indicado principalmente na fase de muda.

Modo de Uso: Administrar 3mL para cada litro de água limpa (9 gotas para cada 100mL de água) ou 6mL para cada kg de ração.

Apresentação: Frasco gotejador contendo 10mL.

Composição:
Níveis de garantia por litro do produto

Garantia	Valor	Unidade
Ácido Fólico (Mínimo)	1.000	mg
Ácido Nicotínico (Mínimo)	1.000	mg
Açúcares totais (Máximo)	200	g
Cobalto (Mínimo)	14,91	mg
Cobre (Mínimo)	185,50	mg
Ferro (Mínimo)	5.142	mg
Lactose (Mínimo)	200	g
Pantotenato de Cálcio (Mínimo)	1.000	mg
Vitamina B1 (Mínimo)	1.424	mg
Vitamina B12 (Mínimo)	20.000	mcg
Vitamina B2 (Mínimo)	760	mg
Vitamina B6 (Mínimo)	830	mg
Vitamina K3 (Mínimo)	135	mg
Zinco (Mínimo)	6.993	mg
Veículo q.s.p	1.000	mL

GRANDES ANIMAIS

Laviz MO Horse

Indicação: Suplemento nutricional composto de aminoácidos, minerais e vitaminas, indicado para equinos em todas as fases de vida. Única formulação no mercado na forma de pasta palatável de uso oral exclusiva para equinos.

Modo de Uso: Equinos Adultos: administrar o conteúdo das duas seringas (80 g) a cada 15 dias, via oral; potros: administrar 1 seringa a cada 15 dias, via oral.

Apresentação: Caixa com duas seringas dosadoras contendo 40g cada.

Composição: Níveis de garantia por kilograma do produto

Garantia	Valor/Unidade
Ácido Aspártico (Mínimo)	5.830mg
Ácido Fólico (Mínimo)	220mg
Ácido Glutâmico (Mínimo)	7.920mg
Ácido Nicotínico (Mínimo)	660mg
Açúcares totais (Máximo)	23g
Alanina (Mínimo)	15,55g
Arginina (Mínimo)	8.690mg
Biotina (Mínimo)	60mg
Cálcio (mínimo/máximo)	40/48g
Cobalto (Mínimo)	151,2mg
Cobre Quelatado (Mínimo)	7,5mg
Colina (Mínimo)	3.300mg
Cromo (Mínimo)	5mg
DL-Metionina (Mínimo)	28,88g
Enxofre (Mínimo)	495mg
Fenilalanina (Mínimo)	1.980mg
Ferro quelatado (Mínimo)	3.384mg
Flúor (Máximo)	320mg
Fósforo (Mínimo)	37g
Glicina (Mínimo)	18,37g
Hidroxiprolina (Mínimo)	18,15g
Histidina (Mínimo)	660mg
Iodo (Mínimo)	130mg
Isoleucina (Mínimo)	1.494mg
L-Carnitina (Mínimo)	11g
L-Lisina (Mínimo)	30,20g
Leucina (Mínimo)	2.860mg
Magnésio (Mínimo)	864mg
Manganês (Mínimo)	331,7mg
Pantotenato de Cálcio (Mínimo)	650mg
Prolina (Mínimo)	14,30g
Selênio (Mínimo)	0,9mg
Serina (Mínimo)	1.760mg
Sódio (Mínimo)	175,50mg
Tirosina (Mínimo)	440mg
Treonina (Mínimo)	1.100mg
Triptofano (Mínimo)	1.474mg
Valina (Mínimo)	2.090mg
Vitamina A (Mínimo)	4.400.000UI
Vitamina B1 (Mínimo)	445mg
Vitamina B12 (Mínimo)	14.000mcg
Vitamina B2 (Mínimo)	220mg
Vitamina B6 (Mínimo)	224mg
Vitamina C (Mínimo)	5.500mg
Vitamina D3 (Mínimo)	250.000UI
Vitamina E (Mínimo)	5.632UI
Zinco (Mínimo)	2.100mg
Veículo q.s.p	1.000mL

GeloVet Gel

Indicação:
Gelovet é um gel refrescante, relaxante e hidratante para ser utilizado em massagens e sessões de fisioterapia. Indicado para equídeos, cães, gatos, bovinos e caprinos.
Contém essência de mentol, glicerina, eucaliptol, cânfora e salicilato de metila.

Composição:
Glicerina, salicilato de metila, mentol, eucaliptol e cânfora.

Modo de uso:
Colocar a quantidade sobre o dorso e espalhar por toda a superfície corporal, tomando cuidado com os olhos, ouvidos e boca.

Apresentação: Pote contendo 300g.

Lema-Injex bioLOGIC

PEQUENOS ANIMAIS

Tridoxin 40

Indicação:
Tridoxin 40 suspensão oral é uma associação de Sulfametoxazol e Trimetoprim com ação sinérgica bactericida. Devido a sua apresentação (seringas graduadas) permite o tratamento de animais domésticos de pequeno porte pela facilidade do ajuste das dosagens a serem administradas.

Composição: Cada mL do produto contém
Sulfametoxazol ..... 40 mg
Trimetoprim ..... 8 mg
Veículo ..... q.s.p. ..... 1 mL

Modo de uso e Posologia:
Uso oral produto pronto para uso.
Deve-se agitar o produto, e administrar o volume indicado diretamente no canto da boca do animal, entre a gengiva e a bochecha. Recomenda-se levantar a cabeça do animal para facilitar a deglutição do medicamento. O produto é indicado na dosagem de 20mg de sulfametoxazol e 4mg de Trimetoprim po Kg de peso corporal, ou seja, 0,5 mL do produto para cada Kg de peso do animal, conforme a tabela:

Peso do animal	Volume da Dose
Até 1 Kg	0,5 mL
1 a 5 Kg	0,5mL a 2,5mL
5 a 10 Kg	2,5mL a 5,0mL
10 a 20 Kg	5,0mL a 10mL
Acima de 20 Kg	Acrescentar 1 mL para cada 2 Kg de peso

Apresentação:
Seringa dosadora com 10 mL.

Febrax Oral

Indicação:
Indicado para o tratamento de dor aguda ou crônica, estados febris, nos quadros de hipermotilidade gastrointestinal (cólicas) de cães, provendo rápido alívio dos estados dolorosos. Devido a sua apresentação (seringas graduadas) permite o tratamento de cães pela facilidade do ajuste das dosagens a serem administradas.

Composição:
Cada mL do produto contém
Dipirona sódica ..... 500 mg
Veículo ..... q.s.p. 1mL

Modo de uso:
Administração por via oral.
Após abrir a embalagem, retire a tampa plástica do bico da seringa e aplique o produto de preferência no canto da boca do animal, entre a gengiva e a face interna da bochecha. Recomenda-se levantar o focinho do animal para facilitar a deglutição do medicamento.
Dosagem:
25 mg/Kg (0,05mL para cada 1 Kg de Peso Vivo), ou seja, 0,5mL do produto para 10Kg de peso vivo.
Repetir a dosagem se necessário após 6 horas, ou à critério do Médico Veterinário.

Apresentação:
Seringa dosadora contendo 10mL.

Inibidex

Indicação:
Inibição de estro (cio) em cadelas e gatas, de acordo com as seguintes orientações:
1 - Cadelas e gatas nas quais a procriação ou a reprodução envolve grandes riscos para a vida do animal.
2 - Cadelas e gatas que apresentam riscos cirúrgicos mínimos para o ovário.
3 - Cadelas e gatas cujas ninhadas não são desejadas.
4 - Cadelas e gatas das quais as ninhadas são opcionais.

Composição:
Acetato de medroxiprogesterona…….50 mg
Veículo q.s.p. ……..……1mL

Modo de uso: Cadelas: A aplicação deve ser feita na fase do anestro, isto é: 3º ao 5º mês após o cio ou 1º ao 3º mês após o parto.
Cadelas de pequeno porte (até 10 Kg): aplicar a dose única de 1,0 mL
Cadelas de médio porte (de 10 a 20 Kg): aplicar a dose única de 2,0 mL
Cadelas de grande porte (acima de 20 Kg): aplicar a dose única de 3,0 mL
Gatas: A aplicação deve ser feita na fase do anestro, isto é: 3ª a 6ª semana após o cio ou 15º ao 20º dia após o parto.
Aplicar 1 mL do produto, independente do peso do animal.

Apresentação: Cartucho com 50 ampolas de 1 mL. e cartela com 5 ampolas de 1mL acompanhadas de seringas estéreis.

Sabão Sarnatyl

Indicação:
Sarnatyl é indicado no combate à sarna e pulgas, no tratamento auxiliar de eczemas, coceiras, caspa e queda de pelo, em cães, gatos, equinos e bovinos.

Composição:
Cada 100 g do produto contém:

Trissulfato de Arsênico:	2,9 g
Enxofre Sublimado:	7,3 g
Alcatrão da Noruega:	4,4 g
Fenol Bruto:	4,4 g
Cresol:	2,9 g
Sabão medicinal q. s. p.:	100,0 g

Modo de uso:
Ensaboar o animal, deixando a espuma por mais de 30 minutos, enxaguando-o, após, com água pura em abundância.
Repetir o tratamento duas ou três vezes, com intervalo de 24 horas.

Apresentação:
Embalagem individual contendo 100g. Cartucho coletivo contendo 12 unidades de 100g cada.

GRANDES ANIMAIS

Soro Antiofídico

Indicação: Tratamento de acidentes ofídicos causados por picadas de serpentes do gênero Bothrops (jararacas, jararacuçús e urutus) e Crotalus (cascavéis).

Composição:
Solução purificada e liofilizada de imunoglobulinas específicas, obtidas de soro de equídeos hiperimunizados com veneno de serpentes dos gêneros *Bothrops* e *Crotalus.* O soro é purificado por digestão péptica, concentrado, titulado, frente ao veneno de *Bothrops* (jararaca) e frente ao veneno *Crotalus durissus terrificus (cascavel)* e adicionado de 0,5% de fenol como preservativo. Cada mililitro do soro neutraliza 2,0mg de veneno de *Bothrops* (jararaca) e 1,0mg de veneno *Crotalus durissus terrificus (cascavel).*

Modo de uso: No momento da aplicação diluir o conteúdo do frasco do produto liofilizado, com o diluente (50 mL) da seringa acompanhante. Após reconstituído o produto deve ser aplicado imediatamente. De um modo geral, recomenda-se o seguinte esquema:
Casos benignos: 01 (um) frasco reconstituído contendo 50 mL, por via subcutânea ou via endovenosa, em uma única dose.
Casos médios: 01 (um) frasco reconstituído contendo 50 mL, por via subcutânea, e outro frasco de 50 mL reconstituído por via endovenosa em única dose.
Casos graves: 01 (um) frasco reconstituído contendo 50 mL, por via subcutânea e 3 (três) frascos de 50 mL reconstituído por via endovenosa em uma única dose.

Apresentação: Frasco ampola contendo o produto liofilizado, seringa contendo 50 mL de diluente.

Soro Antitetânico

Indicação:
É indicado no tratamento e na profilaxia do tétano dos: Bovinos; Equinos; Suínos; Ovinos; Caprinos; Cães e Gatos.

Composição:
O Soro Antitetânico Liofilizado é um composto de antitoxinas do tipo imunoglobulinas, obtidas por concentração e purificação de plasma ou soro de cavalos imunizados com toxóide e toxina tetânica.
Diluente: Água bidestilada estéril.

Modo de uso:
Após a reconstituição do produto liofilizado com o diluente que vem acondicionado na seringa plástica de uso veterinário, o produto pode ser aplicado pelas vias subcutânea, endovenosa ou intramuscular, nas seguintes dosagens ou a critério do Médico Veterinário: Terapêutica: 100.000 a 300.000 UI. Profilática: 1.500 a 5.000 UI. Nos animais com tétano já declarado, o prognóstico é grave. Entretanto recomenda-se a soroterapia terapêutica.

Apresentação:
Frasco-ampola de 5mL contendo o produto liofilizado (5.000 UI) acompanhado de uma seringa plástica descartável com 5mL de diluente.

Lema-Injex bioLOGIC

Seringa Descartável

Apresentação:
Seringa descartável com agulha:
1 mL - 3 mL - 5mL - 10 mL - 20 mL

Torciflex

Indicação:
Para massagens ou fricções em casos de reumatismo, inflamação de úbere, artrites, entorces ou torceduras, luxações, tendinites, sinovites, miosites, membros inflamados e/ou dolorosos após trabalho forçado e torcicolos.

Composição:
Cada 100mL contém
Essência de terebentina ..... 5,00 mL
Salicilato de metila ..... 5,00 mL
Mentol ..... 3,50 g
Cânfora ..... 4,00 g
Fenol ..... 1,50 g
Guaiacol ..... 3,00 g
Álcool etílico q.s.p. ..... 100 mL

Modo de uso:
Uso exclusivamente externo: aplicar o TORCIFLEX em quantidade suficiente para umedecer a região e massagear ou friccionar vigorosamente 2 ou 3 vezes ao dia. Repetir quantos dias forem necessários.

Apresentação:
Frasco spray contendo 120 ml

Calfort

Indicação: CALFORT é uma associação de dextrose com minerais indispensáveis para a formação, manutenção, desempenho e restauração orgânica do animal. Recomendado nas distrofias ósseas (raquitismo, osteomalácia, osteoporose, osteofi brose), febre vitular (febre do leite), tetania, debilidade orgânica, distúrbios metabólicos de origem energética e mineral, nos estados alérgicos, toxi-infecciosos e acetonemia.

Composição: Cada 100 ml contém:
Gluconato de cálcio anidro..... 22,0 g
Glicerofosfato de sódio.....1,5 g
Cloreto de magnésio anidro .....2,0 g
Dextrose anidra .....8,0 g
Veículo .q.s.p. .....100 ml

Modo de uso: Administrado através da via intravenosa ou subcutânea
Bovinos adultos: 200 a 500ml
Bezerros: 25 a 30ml
Equinos adultos: 200 a 250ml
Potros: 30 a 35ml
Suínos adultos: 35 a 40ml
Leitões: 3 a 5ml
Ovinos e caprinos: 25 a 30ml
Cães: 10 a 15ml

Apresentação: Frasco ampola de 200 mL.

Febrax Injetável

Indicação:
O produto é indicado como analgésico e antipirético. Indicado também nas cólicas equinas e outras condições de espasmo ou hipermotilidade gastrointestinal em pequenos e grandes animais.

Composição:
Cada 100mL do produto contêm
Dipirona Sódica 0,5g
Água destilada q.s.p 1,0mL

Modo de uso e Posologia:
Injetar por via subcutânea, intramuscular ou endovenosa. Ad dosagens podem ser repetidas uma ou mais vezes ao dia com intervalos de 8 horas. No caso da utilização do produto na embalagem de seringas estéreis descartáveis já contendo o produto, não fracionar para posterior aplicação e usar somente para tratamento individualizado. Alterações na posologia e modo de usar, a critério do Médico Veterinário.
Equinos adultos ..... 10 a 20 mL
Potros ..... 5 a 10 mL
Cães e Gatos adultos e jovens ..... 1 a 5 mL

Apresentação:
Frasco contendo 50mL.

Bimeda

Cidental

Indicação:
Cidental é indicado para bovinos no tratamento de todos os ferimentos inclusive de umbigo dos bezerros recém-nascidos, como larvicida e repelente de moscas em geral (*Musca domestica e Cochliomyia hominivorax*), na cura e na prevenção das miáses (*bicheiras*) causadas por *Cochliomyia hominivorax*.

Composição:
Cada 100 mL contém:
Cialotrina.....1,00 g
Propoxur.....1,00 g
Veículo q.s.p.....100,00 mL

Modo de Uso:
Cidental é indicado exclusivamente para uso tópico. Limpar e lavar o ferimento, enxugando-o com um pano limpo. Aplicar o produto abundantemente no local do ferimento ou na ''bicheira'' e ao seu redor. Normalmente uma aplicação é suficiente. Caso necessário, repetir com intervalos de 24 horas. Trantando-se de bicheiras cuja abertura esteja voltada para baixo, aplicar o produto e manter o animal deitado pelo menos por 3 minutos, para que o produto atinja as camadas inferiores.

Apresentação:
Frasco de 250mL.

Trigental

Indicação:
É indicado no tratamento das enterites (diarreias) dos bovinos e suínos, causadas por *Salmonella spp* e *Escherichia coli*.

Composição:
Cada 100 g contém:
Enrofloxacino .....5,00 g
Excipiente q.s.p .....100,00 g

Modo de Uso:
Bovinos e Suínos: 5 gramas de Trigental para 100kg de peso, o que corresponde a 2,5 mg de enrofloxacino por Kg de peso corpóreo.
Essas doses devem ser aplicadas a cada 24 horas ou a critério do Médico Veterinário. Não interromper o tratamento antes de decorridas, pelo menos, 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Apresentação:
Seringa plástica descartável dosadora contendo 40g.

GRANDES ANIMAIS

Estreptomax Injetável

Indicação: **Estreptomax®** é um antibiótico indicado para aplicação em bovinos jovens e adultos no tratamento de infecções causadas pelos principais sorovares de Leptospira spp. que acometem bovinos.
- Controla a leptospirose de animais portadores.
- Ação rápida e eficaz.

Composição: Cada frasco-ampola de pó contém:
Sulfato de Estreptomicina* ..... 6,25 g
*Equivalente a 5,00 mg de Estreptomicina (sulfato)
Cada ampola plástica contém:
Diluente para injeção..... 15,00 mL

Modo de Uso: O medicamento deve ser aplicado somente pela via intramuscular. Puxar em uma seringa estéril 15 mL do diluente, misturar com o pó e agitar bem antes de aplicar no animal.

Apresentação: Display com 12 unidades de frasco-ampola contendo 6,25 g de pó e 12 ampolas plásticas contendo 15 mL de diluente.

Colosso Pour On

Indicação:
- Eficaz: combate carrapatos, bernes, moscas, sarnas e piolhos.
- Seguro: associa ativos de alta segurança.
- Frasco anatômico com alça: prático e fácil de manusear.
- Tratamento sem estresse.

Composição: Cada 100mL contém:
Cipermetrina.....5,0 g
Clorpirifós..... 7,0 g
Citronelal..... 0,5 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 mL

Modo de uso e dosagem:
Aplicar na linha dorsal do animal, iniciando pela inserção da cauda até o pescoço.
Bovinos: 10mL para 100kg de peso corporal. Animais acima de 500kg aplicar somente 50mL.
Suínos: 5mL para 100kg de peso vivo.
Intervalo entre doses: A frequência do tratamento dependerá do desafio parasitário, baseado no limiar de infestação e dinâmica populacional do parasito, sempre de acordo com a orientação de um médico veterinário.

Apresentação: Frasco dosador com 1 e 2 L.

Colosso Pulverização

Indicação: Uso em pulverização ou banheiro de imersão para o combate de carrapatos, bernes, moscas, sarnas e piolhos. Em galpões avícolas, é indicado no controle do cascudinho (Alphitobius diaperinus) e piolhos.
- Eficaz: combate carrapatos, bernes, moscas, piolhos e sarnas.
- Seguro: associa ativos de alta segurança.
- Controla o cascudinho e outras pragas de galpões avícolas.
- Rentável: 1 litro trata em média 160 bovinos adultos.

Composição: Cada 100 mL contém:
Cipermetrina ..... 15,0 g
Clorpirifós ..... 25,0 g
Citronelal ..... 1,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 mL

Modo de uso: Bovinos: diluir em água limpa.
Pulverização: 1 litro para 800 litros de água ou 25mL para 20 litros. Utilizar 5 litros de calda por animal adulto.
Banho de imersão - Carga: 1 litro para 1.000 litros de água; Recarga: 1.5 litro para 1.000 litros de água.
Suínos: diluir 1 litro em 400 litros de água.
Aviários: diluir 1 litro em 400 litros de água. 1.000 litros de solução para pulverizar um aviário de 1.200m².

Apresentação: Frascos com 25mL, 100mL, 250mL e 1L.

Cypermil Pour On

Indicação: Cypermil® Pour On é indicado para o controle estratégico exclusivamente da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) em bovinos.
- Pronto para uso.
- Indicado no combate estratégico da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans).
- Prático: frasco anatômico fácil de aplicar e manusear.

Composição: Cada 100 mL contém:
Cipermetrina ..... 15,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 mL

Modo de uso: A aplicação do produto deve ser feita individualmente, com o animal contido por corda, canzil, brete de tábuas estreitas ou cordoalha, devendo ser administrado pela via tópica (pour on), com aplicação em toda a linha dorsal dos bovinos, da inserção da cauda até o meio do pescoço.
A dosagem recomendada do produto é de 1 mL para cada 10 kg de peso corporal, o que corresponde a 5 mg do princípio ativo Cipermetrina por kg de peso corporal, conforme tabela presente na bula.
Para animais acima de 500 kg de peso vivo, a dose máxima recomendada é de 50 mL.

Apresentação: Frasco de plástico com 250 e 1L e galão plástico contendo 5, 10 ou 20L.

Colosso FC30

Indicação:
Colosso FC30 é indicado para o tratamento contra carrapatos (Rhipicephalus [Boophilus] microplus), mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) e bernes (larvas de Dermatobia hominis).

Composição: Cada 100 mL contém:
Clorpirifós..... 30 g
Cipermetrina. ..... 15 g
Fenthion ..... 15 g
Veículo q.s.p. .....100 mL

Modo de uso e dosagem:
Produto de uso externo.
O produto deve ser diluído em água limpa obedecendo à proporção de 25 mL de Colosso FC30 para 20 litros de água (1:800). Banhar toda a superfície do animal, deixando-o completamente molhado, garantindo que todas as partes do corpo recebam a calda. 3 a 5 litros de calda geralmente são suficientes para molhar todo o animal.

Apresentação:
Frascos com 25mL, 100mL, 250mL e 1 L.

Corta Curso

Indicação:
Tratamento de diarreias dos bovinos, ovinos e caprinos.

Composição: Cada 100 mL contém:
Hiclato de Doxiciclina ..... 4,52 g*
Benzetimide cloridrato ..... 0,0165 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL
*Equivalente a 4 g de Doxiciclina base

Modo de uso:
Aplicar via intramuscular 1 mL para cada 10 kg de peso vivo.
Se necessário, repetir o tratamento após 24 horas.
Não ultrapassar 3 dias
de aplicação.

Apresentação: Frasco com 50 mL.

CB 30 TA

Indicação: CB-30 TA tem como principal composto o cloreto de alquil dimetil benzil amônio, que é um agente catiônico de atividade em superfície, com elevada ação germicida, associado a um poderoso tensoativo que desengordura, potencializando a atuação do desinfetante. Usado corretamente nas diluições recomendadas, é altamente eficaz contra bactérias, fungos e esporos.

Composição: Cada 100 ml contém:
Cloreto de alquil dimetil benzil amônio (100%) .....30,0 g
Poliexietilenonilfenileter .....5,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 mL

Modo de Uso: O produto deve ser usado diluído na água e aplicado nas seguintes proporções:
Desinfecção em geral (uniformes, paredes e pisos), lavagem e assepsias de feridas e frieiras: Utilizar CB-30 TA 1:3.000 (10 mL em 30 litros de água).
Pulverização e desinfecção de cama de aves, aviários, câmaras incubadoras, bandejas, equipamentos em geral, maternidades, creches, ordenhadeiras mecânicas, úberes, mãos do ordenhador, rodolúvio, pedilúvio: Utilizar CB-30 TA 1:2.000 (10 mL em 20 litros de água).
Desinfecção de caixas e reservatórios de água: Utilizar CB-30 TA 1:6.000 (10 mL em 60 litros de água).
Pulverização das aves no galpão, semanalmente, usando atomizador: Utilizar CB-30 TA 1:200 (10 mL em 2 litros de água).
CB-30 TA apresenta uma ampla margem de segurança na dosagem indicada. Não usar com sabões e detergentes.
A eficácia de desinfetantes depende da sensibilidade dos microrganismos aos princípios ativos que compõem o produto e do atendimento adequado às recomendações e diluições presentes neste rótulo-bula.

Apresentação: Frasco dosador de 1 litro.

Cortiflan

Indicação:
Tratamento de doenças inflamatórias em geral dos bovinos, equinos, suínos e ovinos. No tratamento de inflamações articulares. Tratamento da cetose bovina. Doenças alérgicas e dermatológicas. Auxilia no tratamento de mastites, pneumonias graves e afecções reumáticas.

Composição: Cada 100 mL contém:
Fosfato sódico de Dexametasona ..... 200 mg
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Modo de uso e dosagem:
Dose terapêutica: 0,25 a 20 mg de Dexametasona (fosfato sódico) por animal.
Bovinos- Dose*/animal ..... 2,5 a 10,0 mL
Intramuscular ou intravenosa
Equinos- Dose*/animal ..... 1,25 a 2,5 mL
Intramuscular ou intravenosa
Suínos e ovinos- Dose*/animal ..... 1,25 a 2,5 mL
Intramuscular ou intravenosa
*Repetir a dose, se necessário.

Apresentação: Frasco com 50 mL.

Iver OF

Indicação: Iver OF é um endectocida para bovinos de amplo espectro, indicado no tratamento de nematódeos gastrintestinais e bernes.

Composição: Cada 100 mL contém:
Ivermectina ..... 1,00 g
Veículo q.s.p. ..... 100,00 mL

Modo de Uso: Aplicar pela via subcutânea, na dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme o quadro abaixo:
Peso (kg) ..... Dose (mL)
50 kg ..... 1 mL
100 kg ..... 2 mL
200 kg ..... 4 mL
300 kg ..... 6 mL
400 kg ..... 8 mL
500 kg ..... 10 mL
1 mL a cada 50 kg
Dosagem equivalente a 200 μg de Ivermectina por kg de peso corporal.

Apresentação: Frasco de 50mL, 500mL e 1L.

Diclofenaco 50

Indicação:
Dor, febre e inflamação.

Composição: Cada 100 mL contém:
Diclofenaco Sódico ..... 5 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Modo de uso e dosagem:
Aplicar via intramuscular, intravenosa ou subcutânea a dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso vivo.

Apresentação: Frasco-ampola com 50 mL.

Finador

Indicação:
Para dor ou febre de origem variada.

Composição: Cada 100 mL contém:
Dipirona Sódica ..... 50 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Modo de uso e dosagem:
Aplicar via intramuscular ou intravenosa lenta.
Bovinos e equinos adultos ..... 20 a 35 mL
Bezerros e potros ..... 5 a 15 mL
Suínos adultos ..... 15 a 20 mL
Suínos jovens, ovinos e caprinos ..... 5 a 15 mL

Apresentação: Frasco-ampola com 50 mL.

Iver Gel Composto

Indicação:
Tratamento e controle dos principais parasitas internos dos equinos, como: Trichostrongylus axei, Oxyuris equi, Strongylus edentatus, Triodontophorus serratus, Probstmayria vivipara e Cyathostominae.

Composição: Cada seringa de 9,6 g contém:
Ivermectina ..... 0,12 g
Praziquantel ..... 1,5 g
Vitamina E ..... 0,6 g
Veículo q.s.p. ..... 9,6 g

Modo de uso e dosagem:
Administrar por via oral na dosagem de 1,6 g para cada 100 kg de peso corporal, conforme graduação da seringa.

Apresentação: Seringa com 9,6 g.

Lepecid BR Spray

Indicação: É indicado no combate às miíases cutâneas (bicheiras), nas castrações, descornas, cura do umbigo dos recém-nascidos, nos ferimentos e cirurgias de pele em geral de bovinos. Aplicar o produto em toda a área afetada, bem como ao seu redor, mantendo o tubo de spray a uma distância de 10 a 20 cm da região a ser tratada (uso externo).

Composição: Cada 100 mL contém:
Clorpirifós ..... 1 g
Diclorvós (DDVP).....1,5 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 mL

Modo de uso: Lepecid BR spray é um produto para aplicação tópica, na forma de aerossol. Deve-se aplicar o produto em toda área afetada, bem como ao seu redor, uma vez ao dia, mantendo o tubo de spray a uma distância de 10 a 20 cm da região a ser tratada. Aplicar o produto diariamente até a cicatrização completa da ferida, ou a critério do médico-veterinário.

Apresentação: Tubo de aerosol com capacidade para 475 mL, contendo 255 g.

ourofino

Sincrocio

Indicação: Sincrocio® é um indutor de partos em fêmeas suínas com rápido efeito luteolítico. Deve ser aplicado 24 horas antes da data prevista para os partos, visando concentrá-los.

Composição: Cada 100 mL contém:
Cloprostenol sódico* ..... 26,30 mg
Veículo. q.s.p. ..... 100,00 mL
*Equivalente a 25 mg de cloprostenol base

Modo de uso: Sincrocio® deve ser administrado em BOVINOS na dose de 2 mL por via intramuscular, em uma única aplicação ou a critério do médico-veterinário.
Em EQUINOS, deve-se aplicar 1 mL por via intramuscular.
Para a administração em SUÍNOS, deve-se utilizar 0,7 mL pela via intramuscular ou 0,3 a 0,5 mL pela submucosa vulvar.

Apresentação: Frasco ampola de 4mL e 20mL.

Master LP

Indicação:
Master LP combate os nematódeos (vermes gastrintestinais e pulmonares). Auxilia no controle de carrapatos por até 87 dias e de berne por até 70 dias.

Composição: Cada 100 mL contém:
Ivermectina ..... 4 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Modo de uso e dosagem:
Aplicar via subcutânea 1 mL para cada 50 kg de peso vivo.

Apresentação:
Frasco com 50 mL, 200 mL, 500 mL e 1 litro.

Maxicam 2%

Indicação:
Processos inflamatórios dos equinos, bovinos e suínos.

Composição: Cada 100 mL contém:
Meloxicam ..... 2 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Modo de uso e dosagem:
Via intramuscular ou intravenosa, a cada 24 horas.
Equinos ..... 3 mL/100 kg de peso vivo
Bovinos ..... 2 mL/100 kg de peso vivo
Suínos ..... 2 mL/100 kg de peso vivo

Apresentação: Frasco com 50 mL.

Maxicam Gel

Indicação:
Anti-inflamatório não esteroide com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2), indicado nos seguintes processos inflamatórios dos equídeos: patologias do aparelho locomotor e doenças músculo-esqueléticas, como miosites, tendinites, osteítes, artrites, artrites reumatoides, osteoartrites, osteoartrose, sinovites, distensões miotendinosas, traumatismos, claudicações, síndrome do navicular e laminites. Auxilia na reparação de fraturas.

Composição: Cada 100 g contém:
Meloxicam ..... 4,5 g
Vitamina E (acetato) ..... 7,5 g
Veículo q.s.p. ..... 100 g

Modo de uso: Via oral, a cada 24 horas, de acordo com a graduação da seringa. 1 seringa contém 5 dias de tratamento para animais adultos (450kg) e 10 dias de tratamento para animais jovens (225kg).

Apresentação: Seringa com 30 g.

Ourotetra Plus LA

Indicação:
Afecções podais (casco), pneumonias, afecções uterinas, preventivo no pré e pós-operatório e tratamento da tristeza parasitária bovina (anaplasmose).

Composição: Cada 100 mL contém:
Oxitetraciclina (dihidrato) ..... 20 g
Diclofenaco de Sódio ..... 1 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Modo de uso e dosagem:
Bovinos, ovinos e caprinos
1 mL/10 kg de peso vivo, dose única, via intramuscular profunda ou subcutânea.
1 mL/20 kg de peso vivo, uma vez ao dia por até 4 dias consecutivos, via intravenosa lenta.
Suínos
1 mL/10 kg de peso vivo, dose única, via intramuscular profunda.

Apresentação: Frasco com 50 mL.

Penfort PPU

Indicação:
Bovinos - abcessos e infecções dos tratos gastrintestinal, respiratório e reprodutivo.
Suínos - abcessos e infecções dos tratos gastrintestinal, respiratório e urinário.
Equinos - abcessos e infecções dos tratos gastrintestinal e respiratório.

Composição: Cada 100 mL contém:
Penicilina G Procaína ..... 10.000.000 UI
Penicilina G Benzatina ..... 10.000.000 UI
Dihidroestreptomicina (sulfato) ..... 20 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Modo de uso e dosagem:
Deve ser aplicado pela via intramuscular profunda utilizando agulhas com 25 a 30 mm de comprimento.
Deve-se respeitar o volume máximo por local de aplicação de 10 mL, caso o volume seja superior recomenda-se dividir em dois ou mais locais de aplicação.
A dosagem recomendada é 1 mL do produto para cada 8 kg de peso corporal, o que corresponde a 25.000 UI de Penicilina e 25 mg de sulfato de Dihidroestreptomicina por quilograma de peso corporal. Tratamento em dose única.
Essas dosagens podem ser alteradas de acordo com o médico-veterinário.

Apresentação: Frasco com 50 mL.

Penfort Reforçado

Indicação: Penfort® Reforçado é indicado para o tratamento de doenças bacterianas que acometem os bovinos, causadas ou associadas aos seguintes microrganismos: Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Trueperella pyogenes, Moraxella bovis e Streptococcus uberis.

Composição: Cada frasco de 8,4 g contém:
Penicilina G Procaína ..... 1.500.000 UI
Penicilina G Potássica ..... 1.500.000 UI
Penicilina G Benzatina ..... 3.000.000 UI
Sulfato de Estreptomicina ..... 2.500 mg

Cada ampola de diluente com 15 mL contém:
Diclofenaco de Sódio ..... 225 mg
Veículo q.s.p. ..... 15 mL

Modo de uso: Penfort® Reforçado deve ser administrado na região do glúteo e/ou da tábua do pescoço e caso o volume a ser aplicado exceda 10 mL, recomenda-se que seja dividido em dois ou mais pontos de aplicação.

Apresentação: Frasco ampola com 8,4g de pó, acompanhado de ampola com 15mL de diluente. Acondicionados em cartuchos.

Trissulfin Injetável

Indicação:
Trissulfin® Injetável é indicado no tratamento das doenças infecciosas bacterianas causadas por agentes Gram-positivos e Gram-negativos sensíveis à associação Sulfa e Trimetoprim.

Composição: Cada frasco de 50 mL contém:
Sulfametoxazol ..... 10 g
Trimetoprim ..... 2 g
Veículo q.s.p. ..... 50 mL

Modo de uso e dosagem:
Trissulfin® Injetável é indicado para aplicação intramuscular, na dosagem de 1 mL para cada 15 kg de peso vivo por dia, durante 5 dias consecutivos.

Apresentação: Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 50 mL.

Trissulfin

Indicação:
Trissulfin® é indicado na prevenção e no tratamento das enfermidades causadas pelos agentes Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum e Pasteurella multocida que acometem aves.

Composição: Cada 100 g contém:
Trimetoprim ..... 2 g
Sulfametoxazol ..... 10 g
Veículo q.s.p. ..... 100 g

Modo de uso e dosagem:
Pode-se fornecer Trissulfin® aos animais adicionando-o à ração, considerando 1 g de produto para cada 3 kg de peso do animal.

Apresentação: Sachês de 50 e 100 g.

Mastifin

Indicação: Mastifin® é indicado no tratamento de mastite dos bovinos, causadas por microrganismos sensíveis à Gentamicina, tais como: Corynebacterium bovis, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae e Trueperella pyogenes.

Composição: Cada seringa de 10 g contém:
Gentamicina (como Sulfato)* ..... 150,00 mg
Excipiente q.s.p . ..... 10,00 g
*Equivalente a 254,24 mg de Sulfato de Gentamicina.

Modo de uso: Após a ordenha aplicar pela via intramamária, todo o conteúdo de 1 seringa, ou seja, 10 g de Mastifin® em cada quarto afetado. Após a aplicação, massagear o teto de baixo para cima no úbere, para uma melhor dispersão do produto na glândula mamária. Após o uso do produto, realizar a higienização dos tetos pós ordenha, por meio do pós-dipping. Mastifin® deve ser aplicado em cada quarto afetado por 3 dias consecutivos, com intervalos de 24 horas entre as aplicações.

Apresentação: Display com 24 seringas plásticas descartáveis contendo 10 g.

Mastifin Vaca Seca

Indicação: Mastifin® Vaca Seca possui uma formulação especial desenvolvida para o tratamento e prevenção das mastites fora do período de lactação, com uma ação prolongada, que se estende por 4 semanas. A ação bacteriana da Gentamicina atinge os principais agentes Gram-positivos e Gram-negativos causadores das mastites dos bovinos.

Composição: Cada seringa de 10 g contém:
Sulfato de Gentamicina ..... 677,00 mg*
Excipiente q.s.p. .....10,00 g
*Equivalente a 400,00 mg de Gentamicina base.

Modo de uso: Após a última ordenha da lactação e a desinfecção dos tetos, aplicar pela via intramamária, todo o conteúdo de 1 seringa, ou seja, 10 g em cada quarto do úbere, em dose única. Recomenda-se fazer uma massagem de baixo para cima no úbere, para melhor dispersão do produto por toda a glândula mamária.

Apresentação: Display com 24 seringas plásticas descartáveis contendo 10 g.

Fortemil

Indicação: Fortemil® é indicado para bovinos, equinos e suínos, no tratamento do esgotamento físico por excesso de trabalho ou de produção. Anorexias, caquexias e desidratações. Indicado ainda como adjuvante no tratamento das verminoses e das doenças infecciosas, como anaplasmose e piroplasmose. O produto também é indicado após intervenções cirúrgicas, hemorragias prolongadas, neuropatias e acetonemias.

Composição: Cada 500 mL contém:
Riboflavina (vitamina B2) ..... 20 mg
Nicotinamida (vitamina B3) ..... 1000 mg
Cloridrato de Piridoxina (vitamina B6) ..... 15 mg
Cianocobalamina (vitamina B12) ..... 10 mg
Acetil DL-Metionina ..... 660 mg
Cloreto de Sódio ..... 3500 mg
Cloreto de Potássio ..... 250 mg
Cloreto de Cálcio ..... 150 mg
Cloreto de Magnésio ..... 90 mg
Dextrose ..... 25000 mg
Veículo q.s.p. ..... 500,00 mL

Modo de Uso: O produto Fortemil® deve ser administrado utilizando-se equipo apropriado para a aplicação de soro. Está indicado para as espécies bovina, equina e suína, de acordo com as faixas de peso e vias de administração apresentadas na bula.

Apresentação: Frasco-ampola com 500 mL, ampola de vitamina B12 com 3 mL e equipo para aplicação.

Nokalt

Indicação: Para o controle do carrapato dos bovinos (Boophilus microplus).
Para o controle da sarna psorótica (Psoroptes var. ovis) e piolhos (Bovicola ovis) dos ovinos.
Para o controle da sarna sarcóptica (Sarcoptes scabei var. suis) dos suínos.

Composição: Cada 100 mL contém:
Amitraz ..... 12,50 g
Veículo q.s.p. .... 100,00 mL

Modo de Uso: Produto para ser usado em pulverização, obedecendo à tabela presente na bula.
ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS E OVINOS
ABATE: O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 15 dias após a última aplicação.
LEITE: O leite dos animais tratados com este produto não deve ser destinado ao consumo humano até 05 dias após a última aplicação deste produto.
SUÍNOS
ABATE: O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 15 dias após a última aplicação.

Apresentação: Display com 12 frascos com 40mL cada, frascos com 40mL e frascos com 1L

ourofino

Fluatac DUO

Indicação: Fluatac DUO®é indicado para auxiliar no controle estratégico de carrapatos Riphicephalus (Boophilus) microplus, de mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) e para auxiliar no controle de bernes (larvas de Dermatobia hominis).

Composição: Cada 100 mL contém:
Fluazuron ..... 3,00 g
Abamectina ..... 0,50 g
Veículo q.s.p. ..... 100,00 mL

Modo de Uso: A aplicação do Fluatac DUO® deve ser feita individualmente, com o animal contido por corda, canzil, brete de tábuas estreitas ou cordoalha, devendo ser administrado pela via tópica (pour on), com aplicação em toda a linha dorsal dos bovinos, do meio do pescoço até a inserção da cauda, na dose de 5 mL para cada 50 kg, conforme tabela na bula.

Apresentação: Frasco dosador contendo 1 litro

Pirofort

Indicação: Pirofort® é indicado para bovinos, ovinos e caprinos para o tratamento de infecções por babesias (piroplasmose) e tripanossomas, causadas pelos seguintes agentes: *Babesia bovis, Babesia bigemina, Babesia argentina, Tripanosoma rhodesiense, Tripanosoma congolense, Tripanosoma spp.*

Composição: Cada 100 mL contém:
Diaceturato de diminazeno ..... 7 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Modo de Uso: Pirofort® deve ser administrado por via intramuscular profunda, conforme dosagens abaixo:
Para Babesia (piroplasmose): A dosagem recomendada é de 3,5 mg/kg de diminazeno, ou seja, 1 mL da solução para cada 20 kg de peso corporal, em dose única.
Para Tripanossomas: A dosagem recomendada é de 7,0 mg/kg de diminazeno, ou seja, 1 mL da solução para cada 10 kg de peso corporal, em dose única.
Para Papilomatose: A dosagem recomendada é de 3,5 mg/kg de diminazeno, ou seja, 1 mL da solução para cada 20 kg de peso corporal, fazendo uma aplicação do produto a cada 15 dias, durante 4 a 8 semanas.

Apresentação: Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 30 mL, acondicionado em cartucho individual.

MATACURA

PEQUENOS ANIMAIS

Shampoo Sarnicida

Indicação: Shampoo Matacura é indicado no controle das pulgas, no tratamento da sarna e para uma perfeita higiene e condicionamento de todos os tipos de pelos, deixando-os macios e levemente perfumados.

Composição: Teor Ativo: Permetrina 1%

Modo de Uso: Dosagem e administração:
Molhar o animal. Aplicar o Shampoo Matacura sobre o local ou sobre todo o corpo, começando pela cabeça em direção a cauda, evitando a área dos olhos, massageando em sentido contrário ao dos pelos. Deixar o animal coberto pelo produto por três minutos. Logo depois, enxaguar o animal e reaplicar o produto repetindo a operação inicial.

Apresentação: Shampoo Matacura em frasco contendo 200ml.

Talco Antisséptico

Indicação: Talco Matacura Antisséptico e Removedor de Odores tem ação desodorizante e antisséptica, mascarando odores indesejáveis dos cães e gatos e do ambiente em que eles permanecem. Possui em sua fórmula o Antisséptico Triclosan e a peneira molecular Zeolite que atua atraindo os odores e prendendo-os hermeticamente dentro de sua superfície porosa. Não possui perfume, é extremamente seguro, suave e hipoalergênico.

Composição: Cada 100g contém:
Triclosan.....0,20g
Zeolite.....5,00g
Talco Farmacêutico...q.s.p.100,00g

Modo de Uso: Aplicar em todo o corpo do animal, no sentido contrário ao dos pelos, levantando-os com o auxílio de uma escova, evitando a área dos olhos. Deixar o produto atuando por alguns minutos e escovar o animal no sentido direto dos pelos. Para remover odores dos animais no ambiente, pulverizar o talco no local desejado e depois escovar levemente.

Apresentação: Embalagem contendo 100g.

Sabonete Antisséptico e Bactericida

Descrição:
Sabonete Antisséptico e Bactericida Matacura 90g

Modo de Usar:
Molhar o animal e esfregar o sabonete, massageando no sentido contrário ao dos pelos, evitando a área dos olhos. Deixar o produto atuando por três minutos e enxaguar.

Especificação:
O SABONETE MATACURA ANTISSÉPTICO é indicado para a higiene e como auxiliar nas afecções da pele devido a sua ação antisséptica. È um sabonete cremoso, muito suave e tem ação desodorizante, mascarando odores indesejáveis de cães e gatos.

Característica:
Teor Ativo: Triclosan 0,15%

Sabonete Sarnicida e Antipulgas

Descrição:
Sabonete Matacura Sarnicida 80g

Modo de Usar:
Lavar friccionando o Sabonete Matacura Sarnicida provocando bastante espuma. Deixar por um período de 5 a 10 minutos. A seguir, enxaguar de forma abundante com água fria ou morna. Repetir a aplicação durante 6 a 8 dias, diariamente.

Especificação:
Mata piolhos, carrapatos, pulgas e outros parasitas da pele. Combate caspas, coceiras e sarnas psorótica, sarcópitica e notoédrica, conservando o pêlo fino e sedoso.

Característica:
Teor Ativo: Benzoato de Benzila 10%

GRANDES ANIMAIS

Anestésico L

Indicação:
Indicado em anestesia de infiltração e tópica.

Composição: Cada 100 mL contém:
Cloridrato de Lidocaína....2,000 g
Epinefrina.....0,002g
Veículo q.s.p.....1,0mL

Modo de uso: Administrar por via subcutânea.
Obs.: NÃO É RECOMENDADO PARA USO INTRAMUSCULAR.
Posologia: As doses para grandes animais, variam conforme a cirurgia a ser realizada e os locais de sua aplicação: Grandes animais: 0,5 a 10,0mL de solução. Pequenos animais: 1,0 a 2,5mL de solução.

Apresentação: Frasco ampola de 50mL.

Creolina

Indicação:
A Creolina® possui em sua fórmula fonte de compostos fenólicos, uma mistura de Cresóis e Fenóis associados a hidrocarbonetos aromáticos na forma miscível, produzindo um tipo de emulsão essencialmente fina em diluição na água. Possui eficácia nas seguintes indicações: • • No tratamento das miíases (bicheiras) - larvas de Cochliomyia hominivorax; • • Como desinfetante de instalações rurais, tais como: granjas, aviários, pocilgas, estábulos, haras, cocheiras, canis e galpões, assegurando o mais amplo espectro de ação bactericida e fungicida sobre os microorganismos.

Composição: Cada 100 mL contém:
Óleo carbólico....31,2 g
Fenol.....15,5 mL
Veículo qsp.....100 mL

Modo de uso:
• TRATAMENTO DE MIÍASE (bicheiras): uso tópico, aplicar 1 mL sobre cada lesão, em uma única aplicação;
• COMO GERMICIDA: fazer diluições de 2,0% ou 4,0% em água (vide tabela) e manter a solução em contato com a superfície a ser desinfetada durante 10 minutos.

Apresentação: Frascos: 50 mL e 100 mL - Latas: 500 mL e 1 litro.

Aminofort

Indicação: Indicado para espécie bovina como: revitalizante e estimulante orgânico que supre as deficiências de aminoácidos vitaminas e oligominerais carentes nas fontes naturais dos alimentos; auxiliar na promoção da fertilidade em machos e fêmeas; na regularização do cio; no crescimento na produção de leite no ganho de peso; nas defesas orgânicas contra enfermidades na recuperação de animais fracos magros e refugos; estimular o apetite; anti-estressante no período de transportes pós-parto pós-cirurgias no desmame nas castrações e descornas.

Modo de Uso: (agite antes de usar)
Injeção intramuscular profunda.
O Aminofort é acondicionado em:(frasco "A" 240 ml e frasco "B" 10 ml) e (frasco "A" 96 ml frasco "B" 4 ml) para serem juntados antes do uso formando 250 ml ou 100 ml que deve ser agitado fortemente e usado todo conteúdo de 250 ml ou 100 ml no período de 24 horas após a mistura..

Apresentação: (frasco "A" 240 ml e frasco "B" 10 ml) e (frasco "A" 96 ml frasco "B" 4 ml) para serem juntados antes do uso formando 250 ml ou 100 ml que deve ser agitado fortemente e usado todo conteúdo de 250 ml ou 100 ml no período de 24 horas após a mistura.

Composição: Frasco "A»
Fórmula completa para 100 ml de Aminofort:
L - Ácido Glutâmico..... 42000 mg
L - Lisina Cloridrato..... 1.00000 mg
Acetil Metionina..... 21000 mg
L - Triptofano..... 6000 mg
L - Histidina Cloridrato..... 21000 mg
Hidrolisados de Órgãos e Glândulas ..... 5.00000 mg
Sódio..... 1600 mg
Cobalto..... 300 mg
Magnésio..... 4200 mg
Cobre ..... 1500 mg
Manganês..... 1500 mg
Zinco..... 800 mg
Ferro Dextrano..... 1000 mg
Água Destilada q.s.p. ..... 10000 ml

Frasco "B»
Fórmula completa para 100 ml de Aminofort:

Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina)..... 50000 mg
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina)..... 50000 mg
Niacina (Ácido Nicotínico)..... 2.20000 mg
Água Destilada q.s.p. ..... 10000 ml

Hipotac

Indicações:
HIPOTAC é um vermicida e larvicida de amplo espectro com atividade contra as formas adultas e larvares de Strongylus equi, Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Oxyuris equi, Habronema spp e larvas de Gasterophilus spp dos eqüinos.

FÓRMULA: cada 100g contém:
Albendazol 8,0g
Triclorfon 58,0g
Veículo q.s.p. 100,0g

MODO DE USAR:
HIPOTAC é um produto pronto para uso, administrado por via oral, segundo o peso animal.
A administração de 6,0g de HIPOTAC é suficiente para tratar 100Kg de peso, o que confere 35mg de triclorfon/Kg e 5mg de albendazol/Kg de peso. Uma única aplicação é suficiente ou de acordo com o veterinário. O conteúdo total de cada injetor é suficiente para tratar 500Kg de peso.

APRESENTAÇÃO: Contém 1 injetor 30 g

Pulmodrazin Reforçado

Indicação: Tratamento de infecções bacterianas que acometem os animais. Coadjuvante no tratamento das viroses das vias respiratórias, prevenindo ou combatendo as infecções secundárias.

Composição: Cada frasco-ampola contém:
Benzilpenicilina procaína .....1.000.000 UI
Benzilpenicilina potássica.....500.000 UI
Estreptomicina (sulfato).....1,0 g
Isoniazida.....1,0 g
Prednisolona.....20 mg
Diluente estéril.....10 mL

Modo de uso: Preparar a suspensão no momento da aplicação, adicionando-se o conteúdo do diluente com seringa estéril ao frasco ampola com pó, agitando-se até completa dissolução. Grandes e médios animais (bovinos ,eqüinos, suínos, caprinos e ovinos): 1 a 2 mL para cada 25 kg de peso vivo, a cada 24 horas, correpondente a 6.000 UI-12.000 UI de Benzilpenicilina procaína e potássica; 4,0mg de Estreptomicina; 4,0mg-8mg de Isoniazida e 0,08mg-0,16mg de Prednisolona por Kg de peso corporal. Pequenos animais (cães e gatos): 0,5 a 1 mL para cada 5 kg de peso vivo, a cada 24 horas, correspondente a 15.000 UI-30.000 UI de Benzilpenicilina procaína potássica; 10mg-20mg de Estreptomicina; 10mg-20mg de Isoniazida e 0,2mg-0,4mg de Prednisolona por Kg de peso corporal.

Apresentação: Caixa com 1 frasco-ampola e 1 ampola diluente de 10mL.

PEARSON SAÚDE ANIMAL

Unguento

Indicações:
UNGUENTO PEARSON possui ação cicatrizante e repelente. É indicado no tratamento do umbigo dos recém-nascidos, eczemas, úlceras varicosas, pruridos e nos pequenos ferimentos causados por pequenas operações cirúrgicas, tosquias, descornas, marcações, arranhaduras, pisaduras e castração. É indicado ainda como repelente para as moscas causadoras das miíases (bicheiras) e bernes.

Fórmula: Cada 100 g contém:
Óxido de Zinco.....20 g
Óleo de Pinho.....5,0 g
Caulim.....32,0 g
Xilol.....6,0 g
Excipiente especial contendo substâncias estabilizantes e solventes q.s.p.....100,0 g

Posologia e modo de usar: Secar a ferida com um pano limpo ou gaze e aplicar o UNGUENTO PEARSON, utilizando uma espátula ou um bastão. Repetir a aplicação diariamente até completa cicatrização.

Apresentação: Potes de 250 e 700 g.

Pulmodrazin Plus

Indicações:
PULMODRAZIN® PLUS é um antibacteriano com amplo espectro de ação devido à associação de dois antibióticos: Benzilpenicilina procaína (eficaz contra bactérias gram positivas) e Diidroestreptomicina (eficaz contra bactérias gram negativas). É indicado em infecções bacterianas que acometem bovinos, eqüinos, suínos, ovinos e caprinos. Apresenta também em sua composição Piroxicam, antiinflamatório não-esteroidal, que facilita a recuperação do animal doente devido a sua ação analgésica e antiiflamatória.
Fórmula: Cada 100mL contém:
Benzilpenicilina procaína..... 20.000.000 UI
Diidroestreptomicina (Sulfato) ……..……..... 8,0 g
Piroxicam …….....…… 0,6 g
Procaína (Cloridrato).....…….....….. 2,0 g
Veículo q.s.p. …….....……100,0 mL
Posologia e modo de usar:
Bovinos e Eqüinos: 1mL/20kg de peso corporal, correspondendo a 10.000UI de Benzilpenicilina procaína; 4mg de Diidroestreptomicina e 0,3mg de Piroxicam/kg de peso corporal. Ovinos, suínos e caprinos: 2mL/10kg de peso corporal, correspondendo a 40.000UI de Benzilpenicilina procaína, 16mg de Diidroestreptomicina e 1,2mg de Piroxicam por kg de peso corporal..
Apresentação:
Display com 25 frascos com 25mL de suspensão injetável pronta para uso

Cruzwaldina

Indicação: A Cruzwaldina® é um desinfetante veterinário para desinfecção de instalações rurais, tais como: pocilgas, galinheiros, canis, estábulos e outros abrigos de animais. Cruzwaldina® desinfeta e afasta o mau cheiro, deixando o ambiente protegido contra a maioria dos insetos e microrganismos.

Composição: Cada 100 mL contém:
Hidrocarbonetos……..58,8 mL
Cresóis……6,0 mL
Fenóis…… 6,0 mL
Veículo q.s.p……..100,0 mL

Modo de Uso: Uso Externo.
Utilizar uma solução na concentração de 30 mL, ou duas colheres das de sopa de Cruzwaldina® para cada litro de água.

Apresentação: Lata de 500 mL

Laboratorio PINUS

Friezol Unguento

Indicação: Indicado no tratamento auxiliar contra frieiras decorrentes de aftosa, ou de outras feridas como: rachaduras, cortes resultantes de cirurgia de cascos, bicheiras e podridão dos cascos. Para pequenos animais contra berne ou bicheira.
Composição: cada 100g contém:
alcatrão vegetal.....54g
triclorfon.....0,75g
excipiente q.s.q.....100g
Modo de uso: Uso externo. Contra bernes e bicheiras: após a prévia assepsia, aplicar o friezol unguento no local atacado com o auxilio de um pincel. Contra frieiras: limpar o local cuidadosamente, remover as partes apodrecidas e aplicar no dia seguinte o friezol unguento.
Apresentação: Potes plásticos de 250g.

Friezol Estankasangue

Indicação: Friezol Estankasangue é indicado no tratamento das lesões externas, no tratamento das orelhas e do umbigo de recém-nascidos. Nas áreas atacadas por micoses, sarnas, bicheiras e outros ectoparasitas dos animais. Nas incisões cirúrgicas em geral e especialmente nas castrações, descorna e todos os processos hemorrágicos decorrentes de ferimentos.
Composição: Cada 100g contém
Triclorflon.....0,50g
Iodo Metálico.....2,00g
Percloreto de Ferro.....16,00g
Salicinato de Metila.....1,00g
Etanol.....64,50g
Água Purificada.....16,00ml
Modo de uso: Uso externo
Administrar exclusivamente por via tópica.
Aplicar o produto embebido em algodão ou esguichar diretamente sobre o local a ser tratado, duas a três vezes ao dia. Diminuir as aplicações conforme a recuperação do local tratado.

Apresentação: Embalagem plástica de 250ml e 30ml.

Pinus Tintura de Iodo 10%

Indicação: PINUS Tintura de Iodo é uma eficaz solução antibacteriana comumente usada em soluções que causam rupturas de tecido dermal, nos quadros de recuperação pós-cirúrgica e nas assepsias cirúrgicas.

Composição:
Cada 100ml contém:
Iodo.....10,00g
Iodeto de sódio.....3,75g
Álcool diluido..... q.s.p.....100,00 ml

Modo de uso:
Uso externo. Administrar exclusivamente por via tópica como antisséptico local, pincelar o local atingido com algodão ou gaze embebida no produto. Pode ser diluído em álcool hidratado para diminuir a concentração. Quantidade suficiente a critério do veterinário.

Apresentação: Embalagem plástica de 100ml e 1 litro.

PEQUENOS ANIMAIS

Otocanis

Indicação: No tratamento tópico das otites simples e infecciosas, sensíveis à sulfanilamida dos cães. Uso tópico. Otocanis tem por base a sulfanilamida, um quimioterápico de ação bactericida e bacteriotática sobre vários germes patogênicos capazes de produzir infecções, piogênicas no aparelho auditivo dos animais.

Composição: Cada 100mL contém:
Sulfanilamida (sal sódico)..... 1,00 g
Veículo aquoso q.s.p .....100,0 mg

Modo de Uso: OTOCANIS é administrado em aplicações tópicas no ouvido doente. Pingar de acordo com o tamanho do animal 3 ou mais gotas de Otocanis em cada ouvido, 2 a 3 vezes ao dia. Repetir diariamente o tratamento, enquanto se fizer necessário ou de acordo com a orientação do médico veterinário.

Apresentação: Frascos conta-gotas de 10mL.

Pipicanis

Indicação:
A educação do seu cãozinho é primordial para uma relação saudável entre você e ele. Com Pipicanis ele vai aprender a fazer suas necessidades em apenas um lugar, e você é quem vai determinar o local, gerando assim a sensação de respeito no seu bicho. Adestramento sanitário de cães.

Composição:
Cada 100 mL contém:
Bicarbonato de amônio.....5,0 g
Uréia.....5,0 g
Veículo q.s.p.....100,00 mL

Modo de Uso:
Aplicar o produto nos locais previamente escolhidos.

Apresentação: Frasco contendo 20 mL.

Cascosan

Indicação:
Cascosan é uma solução alcoólica de Alcatrão Vegetal e Breu que possui ação antisséptica, antipruriginosa, queratoplástica, protetora e repelente dos insetos. É indicado no tratamento e prevenção das doenças dos cascos de equinos. Cascosan possui grande poder de aderência, formando uma camada protetora que evita a invasão dos germes causadores das doenças dos cascos.

Composição: Cada 100mL contém:
Alcatrão Vegetal 25,00g
Breu 30,00g
Álcool a 96° q.s.p. 100,00mL

Modo de uso: Limpar o casco e aplicar com auxilio de um pincel, na sola, ranilha e paredes do casco, massageando a faixa coronária, se necessário.
- Casco sadio: aplicar semanalmente como preventivo.
- Casco inflexível (mole ou duro), rachado ou quebradiço: apliicar em dias alternados até a cura, passando então a usar semanalmente.
- Casco com broca ou pododermatites: aplicar diariamente.

Apresentação: Frascos de 90mL e 1000mL.

Sabão de Enxofre

Indicado:
Indicado para higiene e auxilia no tratamento das sarnas e micoses dos cães.

Composição: (uso tópico)
Cada 100g contém:
Enxofre.....10,00g
Sabão neutro q.s.p.....100,00g

Modo de usar e Posologia:
Molhar o pêlo do cão e ensaboá-lo massageando suavemente, de modo que a espuma entre em contato com a pele. Deixar a espuma em contato com a pele por 5 minutos, enxaguando-a em seguida. Deve ser utilizado em banhos periódicos do animal ou a critério do médico veterinário.

Apresentação:
Contém 1 unidade.

Prevempet Sabão

Indicação: Indicado no controle de pulgas, carrapatos e piolhos dos cães e gatos.

Composição: Cada 100 g contém:
Permetrina ..... 0,12 g
Butóxido de piperonila ..... 0,60 g
*Excipiente q.s.p. ..... 100,00 g
*(Álcool 96°, Amido e Sabão Neutro)

Modo de Uso: Molhar o corpo do animal e aplicar o Prevempet Sabão. Friccionar até obter espuma abundante. Deixar o produto atuar durante alguns minutos. Enxaguar com bastante água e repetir a aplicação. Uma aplicação semanal é suficiente para controlar as reinfestações.

Apresentação:
Contém 1 unidade.

Prevempet Talco

Indicação: Talco Prevempet é um talco indicado para cães e gatos no tratamento das infestações por pulgas, carrapatos e piolhos.

Composição: Cada 100 g contém:
Permetrina ..... 1,00 g
Ácido Bórico ..... 2,00 g
Excipiente q.s.p. ..... 100,00 g

Modo de Uso: USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO. Pulverizar o Prevempet Talco sobre todo o corpo do animal, espalhando com uma escova, de modo que o produto entre em contato com a pele. Recomenda-se aplicar também nos locais de permanência do animal. Uma aplicação semanal é suficiente para controlar as reinfestações. Usar luvas protetoras para a aplicação do produto.
Advertências:
Não utilizar a embalagem vazia.
Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e cosméticos.

Apresentação: Frasco contendo 100g.

Prevempet Shampoo

Indicação: Indicado no controle de pulgas, carrapatos e piolhos dos cães e gatos.

Composição: Cada 100 ml contém:
Permetrina ..... 0,10 g
Veículo q.s.p. ..... 100,00 mL

Modo de Uso: Uso exclusivamente externo, via tópica. Após molhar o corpo do animal, aplicar o Prevempet Shampoo, começando pela cabeça em direção à cauda, evitando a área dos olhos e demais mucosas, massageando em sentido contrário ao dos pelos até obter uma espuma. Aguardar o produto agir por 10 minutos. Enxaguar o animal com água, adequadamente e secá-lo em temperatura ambiente. Repetir o procedimento por 3 dias

Apresentação: Frasco contendo 500mL.

Provets® Simões

Vermidog

Indicado:
VERMIDOG é recomendado no tratamento das verminoses provocadas por Áscaris e Oxiúros. Também indicado para o combate ao Ancylostoma caninum.

Composição:
Cada 10mL contém:
Hexahidrato de piperazina 0,50g
Nipagin .....0,05 g
Xarope de anis 5,00mL
Água purificada q.s.p. 10,00mL

Modo de usar e Posologia:
Administrar por via oral, puro, diretamente na boca do animal ou adicionado à água ou leite.
Animais até 3kg de peso vivo: uma colher de chá (5mL) por dia, durante 3 dias consecutivos;
Animais de 3kg até 6kg de peso vivo: uma colher de sobremesa (10mL) por dia, durante 3 dias consecutivos;
Animais acima de 6kg de peso vivo: uma colher de sopa (15mL) por dia, durante 3 dias consecutivos.

Apresentação:
Frasco plástico de 30mL.

Unguento

Indicado:
Larvicida, cicatrizante e repelente de insetos. Recomendado no tratamento de miíases em geral, como medicação curativa de ferimentos causados pela tosquia, no umbigo de recém nascidos, nas castrações e descornas e como repelente de moscas causadoras de bernes.

Composição:
Cada 100 g contém:
Permetrina.....0,5 g
Butóxido de Piperonila.....1,0 g
Óxido de zinco.....20,0 g
Excipiente q.s.p.....100,0 g

Modo de usar e Posologia:
Uso exclusivamente externo, em aplicações dermatológicas.
Limpar e secar o ferimento, aplicar o UNGÜENTO VETERINÁRIO LCR SIMÕES, utilizando-se uma espátula ou bastão, de modo a cobrir toda a lesão com uma camada uniforme do produto. Repetir a aplicação diariamente até a completa cicatrização do ferimento.

Apresentação:
Potes plástico de 40g (display) e 250g.
Também em bisnaga contendo 50g.

Colirio Vet Simões

Indicação: Indicado para cães e gatos no tratamento das oftalmias com inflamações e irritações dos olhos, bem como nas conjutivites catarrais agudas ou crônicas, em aplicações tópicas oculares.

Composição: Cada 100 mL contém:
Sulfato de zinco.....0,50 g
Sulfato de cobre.....0,50 g
Ácido bórico.....1,90 g
Cloreto de benzalcônio.....3,00 mg
Veículo q.s.p.....100,00 mL

Modo de Uso: Exclusivamente como colírio, em aplicações tópicas oculares. De acordo com o tamanho do animal, pingar 2 a 5 gotas no olho afetado, duas vezes ao dia. Limpar previamente os olhos com algodão ou gaze, quando um excesso de secreção catarral ou purulenta impedir a penetração do colirio diretamente no olho.

Apresentação: Frasco conta-gotas contendo 10 mL.

AVES

Piolhaves

Indicação: PIOLHAVES é indicado no tratamento e controle de piolho em pássaros e nas aves ornamentais. O seu uso também se estende ao combate de outros ectoparasitas que atacam as aves, tais como percevejos, ácaros, pulgas e carrapatos. Talco Piolhicida.

Composição: Permetrina técnica 0,25g, Enxofre precipitado 2,50g e Excipiente q.s.p. 100,00g.

Modo de Uso: Uso exclusivamente externo, em pulverizações diretamente sobre o corpo das aves; sobre os pisos de gaiolas, viveiros, e nos ninhos para auto-tratamento. Aplicar uma fina camada de talco a cada 2 ou 3 dias, até o desaparecimento dos parasitas.

Apresentação: Sachê de 20g e pote contendo 300g.

Sanagogo

Indicado: Recomendado para o tratamento da Singamose, também conhecida como gogo, nas aves ornamentais (galinhas, perus e gansos).

Composição: Cada 100mL contém:
Ácido salicílico.....1,000g
Iodo metalóide.....0,125g
Veículo oleoso q.s.p.....100,000mL

Modo de usar e Posologia: Somente para aplicação tópica intratraqueal. Imobilizar a ave, delicadamente. Com os dedos, polegar e indicador, abrir o bico elevando a garganta da ave, até aparecer o orifício da laringe; pingar 2 a 5 gotas de SANAGOGO, neste orifício, tomando-se cuidado para não asfixiar a ave. Um só tratamento é suficiente.

Apresentação: Frasco conta-gotas contendo 20mL e frasco de vidro âmbar contendo 90mL.

Thuya

Indicado: Tratamento de bouba (pipocas), verrugas e epitelioma contagioso das aves em geral (galinhas, perus, patos, pássaros de gaiola e viveiro) em todas as fases da criação, evitando as complicações que a doença produz.

Composição: Tintura de Thuya occidentalis à 20%.

Modo de usar e Posologia: Frasco contendo 20mL: Adicionar 100 gotas de Thuya Avicola Simões oral, diariamente em cada litro de água dos bebedouros, durante 2 (duas) semanas.
Frasco contendo 90mL: Adicionar uma colher de chá (5mL) de Thuya Avicola Simões oral, diariamente em cada litro de água dos bebedouros, durante 2 (duas) semanas.

Apresentação: Frascos contendo 20, 90 e 150mL.

PEQUENOS ANIMAIS

Alumex

Indicação:
É indicado como analgésico e anti-inflamatório nas síndromes dolorosas em consequência das artrites, contusões, luxações, entorses, mialgias e pisaduras.

Composição:
Cada 100 g do produto contém:

Salicilato de Metila	4 mL
Bálsamo do Peru	3 g
Cânfora	5 g
Sulfato de Alumínio e de Potássio	4,29 g
Óxido de Zinco	10 g
Excipiente q.s.p.	100 g

Modo de Uso:
Via de administração: Tópica. Aplicar uma fina camada e massagear suavemente, espalhando o produto em toda a área a ser tratada, duas vezes ao dia até a recuperação total. Modificações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário. Obs.: Não aplicar em ferimentos abertos.

Apresentação: Bisnaga com 30g, 100g e pote 500g.

Ecto-Lin

Indicação:
É indicado para cães, no controle de pulgas e piolhos, auxilia no combate dos carrapatos e no tratamento das sarnas, deixando os pelos mais sedosos.

Composição:
Cada 100 ml contém:

Permetrina	0,04 g
Lauril Sulfato de Sódio	10,0 g
Veículo q.s.p.	100 ml

Modo de Uso:
Via de administração: Tópica. Aplicar sobre os pelos umedecidos, massageando até alcançar uma espuma homogênea em todo o corpo do animal. Aguardar alguns minutos para atuação do produto, enxaguar em seguida. Repetir a operação para 2 a 3 dias, ou até que se eliminem os ectoparasitas.

Apresentação: Frasco com 300 mL.

Cypermeit

Indicação:
Controle das infestações por Carrapatos (Boophilus microplus), e Moscas (Musca domestica, Haematobia irritans e Stomoyxs calcitrans). Auxilia no controle do Berne (Larva de Dermatobia hominis), Sarnas (Psoroptesspp) e Piolhos (Linognathus spp, Damallnia spp, Haematopinus spp e Solenoples spp). Instalações - Repelente de insetos.

Composição:
Cada 100 ml contém:
Cipermetrina 15 g
Veículo q.s.p. 100 ml

Modo de uso:
Via de administração: Ambiental. Instalações: quintais, canis, etc. Diluir 20 ml do produto em 20 litros de água. Pulverizar todas as estruturas como pisos, tetos, paredes e corredores. Usar 1 litro da solução para cada 10 m² de superfície.

Apresentação: Frasco de 20 mL.

Top Gard Comprimido

Indicação:
Top Gard é o medicamento que combate os parasitas intestinais que podem infestar cães e gatos. Possui alta segurança, praticidade e eficácia. Controle das infestações parasitárias, em cães e gatos, causadas pelos seguintes Nematódeos e Cestódeos: Ancyslostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Toxocara canis, Toxocara cati, Ucinaria stenocephala, Toxascaris leonina, Taenia hydatigena, Taenia spp, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Echinococcus multiloculares, Mesocestoídes spp, Hydatigera taeniaeformis e Multiceps multiceps. *Top Gard é o novo nome do antigo Dau Verme Comprimidos*

Composição: Cada comprimido de 660 mg contém:

Praziquantel	50 mg
Pirantel (Pamoato)	144 mg
Excipiente q.s.p.	660 mg

Modo de Uso:
Via de administração: Oral Top Gard deve ser administrado para cães e gatos por via oral, junto com alimentos, carne, pão ou ração; nas seguintes dosagens: 5 mg de Praziquantel e 5 mg de Pirantel base (Equivalente a 14,4 mg de Pamoato de Pirantel) por kg de peso, em dose única. Administrar 1 comprimido de Dau Verme Comprimidos para cada 10 kg de peso conforme a seguinte tabela de dosagens: Peso Dose Até 5 kg……½ comprimido - De 6 a 10 kg……..1 comprimido - De 11 a 15 kg……1 e ½ comprimidos - De 15 a 20 kg……2 comprimidos - De 21 a 25 kg……2 e ½ comprimidos - De 25 a 30 kg……3 comprimidos - De 31 a 35 kg……3 e ½ comprimidos - De 36 a 40 kg……4 comprimidos

Apresentação: Cartucho com blister de 4 comprimidos de 660 mg e display com 25 blisters de 4 comprimidos de 660 mg.

Max Prata

Indicação:
Profilaxia e tratamento de Miíases ou "Bicheira" (larvas de Cochliomyia hominivorax), ocasionadas após cirurgias, tratamento de umbigo de recém-nascidos, etc.

Composição:
Cada 100 g do concentrado contém:

Sulfadiazina de Prata	0,1 g
Diclorvós	1,6 g
Cipermetrina	0,4 g
Alumínio	5,0 g
Veículo q.s.p.	100 g

Modo de uso:
Via de administração: Tópica. Agite energicamente o frasco e vaporize a uma distância entre 10 a 20 cm, dentro da ferida previamente higienizada, e nas suas bordas. Recobrir toda a área da ferida com uma camada fina, mais consistente do produto, dentro do esquema seguinte: Profilaxia: Aplicação única. Tratamento: Uma vez ao dia durante 4 a 5 dias consecutivos. Nos casos de alta infestação ambiental, a aplicação pode ser repetida após 5 a 7 dias até a cura completa.

Apresentação: Embalagem metálica, tipo aerosol com 200 ml (116 g).

Unguento

Indicação:
Unguento Vansil está indicado para bovinos, ovinos, suínos, equinos nas seguintes situações: descornas, marcações, arranhaduras, castrações, cura de umbigo de recém-nascidos, cirurgias, bicheiras e ferimentos em geral. Indicado como repelente para as moscas causadoras das miíases (bicheiras) e para os insetos que transportam os ovos da mosca do berne.

Composição:
Cada 100 g do produto contém:

Permetrina	0,5 g
Butóxido de Piperonila	3,5 g
Óxido de Zinco	20 g
Veículo q.s.p.	100 g

Modo de Uso:
Via de administração: Tópico. Higienizar o local com o auxílio de uma compressa de gaze e aplicar o Unguento Vansil. Repetir a aplicação diariamente até completa cicatrização da ferida. O excesso deve ser removido antes da aplicação da pomada nas reaplicações. O produto deve ser aplicado durante todo o tempo que se fizer necessário a fim de se obter uma perfeita cura.

Apresentação: Pote com 50g e 250g.

VANSIL saúde animal

AVES

Avecox

Indicação:
Avecox é indicado para previnir e tratar a coccidiose em pássaros causadas por Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria tenella, Eimeria necatrix, Eimeria brunetti, Isospora andesensis, Isospora gryphoni, Isospora sporophilae, Isospora flausinoi, Isospora teixeirafilhoi e Isospora adiei.

Composição: Cada 100mL do produto:
Diclazurila 1,3 g
Veículo q.s.p. 100,0 ml

Modo de uso:
Via de administração: Oral.
Pássaros: Diluir 3 gotas do produto para 50 mL de água de bebida ou 1mL por litro, administrando durante 4 dias consecutivos.

Apresentação: Frasco de 15 mL

Enro Flec 10% Oral

Indicação: Enro Flec 10% Oral é indicado no tratamento de infecções causadas por bactérias Gram negativas, Gram positivas, Espiroquetas e Micoplasmas, em frangos de corte.

Composição: Cada 100 ml contém:
Enrofloxacino 10 g
Veículo q.s.p. 100 ml

Modo de uso:
Via de administração: Oral. Aves de produção: Administrar 1mL por litro de água de bebida durante 3 a 5 dias consecutivos ou 10 mg de Enrofloxacina por kg de peso. Efetuar a troca da solução a cada 24 horas. Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação: Frasco com 10 e 100 ml e 1litro.

Criasil E

Indicação: Criasil Reprodução está indicado para a suplementação de vitamina E em pássaros.

Composição: Aroma de Banana; Vitamina E e Veículo q.s.p.
Níveis de garantia por litro do produto:
Vitamina E (mínimo) 15.000 UI

Modo de uso: Via de administração: Oral. Pássaros de pequeno porte: Administrar 3 gotas do produto em 50 mL de água de bebida por dia durante 15 dias consecutivos. Pássaros de grande porte: Administrar 6 gotas do produto em 50 mLde água de bebida por dia durante 15 dias consecutivos.

Apresentação: Frasco de 15 mL

Enroflec Oral

Indicação: Contra as seguintes infecções dos pássaros causadas por Mycoplasma galisepticum, Mycoplasma sinoviae - Doença crônica respiratória (DCR), Sinovite infecciosa-Escherichia coli, Colibaciose intestinal e Pulorose - Salmonella pullorum, Salmonella galinarum, Tifo aviário - Staphylococcus, aureus, Cólera aviária-Pasteurella muttocida.

Composição: Cada mL contém:
Enrofloxacino 100mg
Veículo q.s.p. 1ml

Modo de uso: Via de administração: oral. Pássaros e aves ornamentais: 1 ml (30 gotas) por litro de água de bebida ou 2 ml (60 gotas) para cada kg de alimento sólido (farinhada) durante 3 dias consecutivos. No caso específico de Salmonelose, o tratamento deve ser de 5 dias consecutivos. Efetuar a troca da solução a cada 24 horas. Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.
Apresentação: Frasco de 10 mL

Neocolin

Indicação: Na prevenção e tratamento das enterites bacterianas em pássaros, aves silvestres, provocadas por germes sensíveis à neomicina tais como: Escherichia coli, Proteus spp, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Stapihylococcus spp.

Composição: Cada mL contém:
Sulfato de Neomicina 50mg
Veículo q.s.p. 1mL

Modo de uso: Diluir em água de bebida: 5 gotas para cada em 50mL de água ou 1mL em 250mL de água. Administrar por 5 dias consecutivos.

Apresentação: Frasco de 10 mL

Sulfa Quinoxalina

Indicação: Para aves no tratamento e profilaxia da Coccidiose (*Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. maximae* e *E. brunetti*). No tratamento do Tifo Aviário (*Salmonella gallinarum*), Coriza Infecciosa (*Haemophilus paragallinarum*) e Cólera Aviária (*Pasteurella multocida*).

Composição: Cada 100 g contém:
Sulfaquinoxalina Sódica.....20 g
Veículo q.s.p.....100 ml

Modo de uso: Via de administração: Oral. Tratamento individual: administrar 2,5 ml do produto em 1 litro de água durante 3 dias consecutivos, descansar 2 dias e repetir se necessário. Observação: cada ml corresponde a 20 gotas do frasco gotejador. Tratamento coletivo: administrar 10 ml do produto em 4 litros de água durante 3 dias consecutivos, descansar 2 dias e repetir se necessário. Profilaxia: usar a metade da dose recomendada durante uma semana. Renovar a água a cada 24 horas. Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário. VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Apresentação: Frasco de 10 ml

GRANDES ANIMAIS

Alumex

Indicação:
Alumex é indicado como analgésico e anti-inflamatório nas síndromes dolorosas em consequência das artrites, contusões, luxações, entorses, mialgias e pisaduras em bovinos, equinos, ovinos e caprinos.

Composição:

Salicilato de Metila	4 mL
Bálsamo do Peru	3 g
Cânfora	5 g
Sulfato de Alumínio e de Potássio	4,29 g
Óxido de Zinco	10 g
Excipiente q.s.p.	100 g

Modo de Uso:
Via de administração tópica. Aplicar uma fina camada e massagear suavemente, espalhando o produto em toda a área a ser tratada, duas vezes ao dia até a recuperação total. Modificações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário. Obs.: Não aplicar em ferimentos abertos.

Apresentação:
Bisnaga de 30 e 100g e pote 500g.

Anestésico Vansil

Indicação:
Anestésico Vansil é indicado para casos em que é desejável inibir a dor em uma determina região, para realização de tratamentos e intervenções clínico-cirúrgicas. Produz ação rápida e extensa anestesia regional, não sendo irritante aos tecidos, nem causando lesão às estruturas nervosas da região.

Composição:
Lidocaina (Cloridrato) 2,0 g, Epinefrina (Bitartarato) 2,0 mg e Veículo q.s.p 100,0 mL.

Modo de Uso:
Anestésico Vansil® deve ser administrado através de aplicações subcutâneas, infiltrações musculares, perineural e epidural após a assepsia da pele. As doses recomendadas baseiam-se na idade, estatura, estado físico do animal e velocidade de absorção sistêmica estimada no local da injeção. Deve-se usar a menor dose necessária, fracionada, para produzir os resultados desejados. – Animal de grande porte: 5,0 a 10,0 ml (Bovinos e eqüinos adultos). – Animais de médio porte: 2,5 a 5,0 ml (potros e bezerros). O período de ação do Anestésico Vansil varia entre 60 e 120 minutos de acordo com o tipo de anestesia. A dose máxima permitida é de 9,0 mg de Lidocaína por kg de peso. Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:
Frasco-ampola contendo 50 ml.

Arsenatrol

Indicação:
Arsenatrol é um tônico geral na convalescença de doenças infecciosas dos animais. Nas anemias ferroprivas em consequência de parasitoses e moléstias infecciosas. Na inapetência (falta de apetite). Em cavalos de corrida, salto, polo e de trabalho como estimulante geral, para a formação dos glóbulos vermelhos do sangue, para equinos e muares.

Composição: Cada 100mL contém:

Citrato de Ferro Amoniacal	1,5 g
Metil Arseniato de Sódio	0,85 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Modo de Uso:
Via de administração endovenosa e intramuscular. Aplicar lentamente por via endovenosa, podendo ser utilizada a via intramuscular profunda, nas seguintes doses: Para equinos e muares adultos: 1ª – 15 ml, 2ª – 20 ml, 3ª – 25 ml. Para potros: 1ª – 10 ml, 2ª – 13 ml, 3ª – 16,5 ml. Aplicar as doses com intervalo de 3 dias. Empregar seringa e agulha previamente esterilizadas. No local da aplicação fazer assepsia com Álcool ou solução de Álcool iodado.

Apresentação: Caixa com 3 fracos-ampola de 20 mL.

Dexfer Reforçado B12

Indicação:
Tratamento e profilaxia das anemias ferroprivas. Normalizar os níveis de hemoglobina nos casos de Anaplasmose e Babesiose, durante a pré-imunização para estas duas hemoparasitoses. Coadjuvante no tratamento das hemorragias, verminoses severas e infestações por carrapatos, que levem à anemia.

Composição: Cada 1 ml contém:

Ferro Dextrano	100 mg
Vitamina B12	50 mcg
Veículo q.s.p.	1 ml

Modo de Uso:
Via de administração intramuscular. Administrar através de injeções intramusculares profundas, após prévia assepsia da pele do local nas seguintes doses: Suínos: Leitões: 2,0 ml (200 mg de Ferro, correspondentes às suas necessidades por 35 dias, quando já estarão ingerindo o Ferro necessário através da ração) entre o 3º e o 5º dia de vida. Matrizes gestantes: 5,0 a 6,0 ml, 30 dias antes do parto. Bovinos: Bezerros: Para profilaxia, 2,0 ml na 1ª semana de vida, repetindo-se na 6a semana ou por ocasião da desverminação. Para tratamento: 5,0 a 6,0 ml em dose única. Adultos: Para tratamento, 10,0 ml em dose única. Ovinos e Caprinos. Para profilaxia e tratamento, 2,0 a 3,0 ml.

Apresentação: Frascos com 50 mL.

Enro Flec 10% Injetável

Indicação:
Enro Flec Injetável é indicado no tratamento de infecções em bovinos, ovinos, caprinos e suínos, causadas por bactérias Gram negativas, Gram positivas, Espiroquetas e Micoplasmas.

Composição:
Cada mL contém:

Enrofloxacino	100mg
Veículo q.s.p.	1ml

Modo de Uso:
Via de administração: Intramuscular. A dosagem terapêutica é de 2,5 mg do princípio ativo por kg de peso, uma vez por dia, durante três dias ou a critério do Médico Veterinário, através de injeções intramusculares. Bovinos, suínos, caprinos e ovinos: 0,5 ml para cada 20 kg de peso. Nas infecções respiratórias complicadas, aplicar 0,5 ml para cada 10 kg de peso durante cinco dias. Caso a dose seja superior a 10 ml, recomenda-se dividi-la em mais locais de aplicação.

Apresentação: Frasco com 10, 50 e 500 mL.

Fortlozin

Indicação:
Fortlozin é indicado para profilaxia e tratamento das principais doenças infecciosas que acometem os bovinos, caprinos, ovinos e suínos. Também é indicado no tratamento de apoio de Enterite Necrótica Superficial, infecções bacterianas secundárias às moléstias virais e infecções pós-operatórias em geral.

Composição:
Cada 100 ml do produto contém:

Tilosina	20 g
Veículo q.s.p.	100 ml

Modo de uso:
Via de administração: Intramuscular. Bovinos: Administrar 0,5 a 1,0 ml para cada 20 kg de peso ao dia, por via intramuscular profunda durante 5 dias. Suínos: Administrar 0,5 a 1,0 ml para cada 20 kg de peso ao dia, por via intramuscular profunda durante 3 dias. Ovinos e Caprinos: Administrar 1,0 ml para cada 20 kg de peso ao dia, por via intramuscular profunda durante 5 dias. Não aplicar mais que 20 ml em cada local de aplicação. Intervalos entre aplicações deve ser de 24 horas.

Apresentação:
Frasco de 50 e 100mL.

Vansil saúde animal

Evolution M.O.

Indicação:
Evolution M.O. é indicado como suplemento vitamínico, mineral e aminoácido para equinos.

Modo de uso:
Via de administração: Oral. Equinos jovens: Administrar uma seringa a cada 15 dias. Equinos adultos: Administrar duas seringas a cada 15 dias. Alterações no modo de uso a critério do Técnico Especializado.

Apresentação: Display com 2 seringas.

Composição: Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Aspártico	6.000 mg	L-Lisina	30 g
Ácido Fólico	150 g	Leucina	3.000 mg
Ácido Glutâmico	8.000 mg	Lisina	2.500 mg
Ácido Nicotínico	1.000 mg	Magnésio	1.700 mg
Alanina	15,55 g	Maltodextrina	30 g
Arginina	9.000 mg	Manganês	350 mg
Biotina	2.500 mg	Niacina	1.000 mg
Cálcio (Max./Mín.)	50/55 g	Pantotenato de Cálcio	3.000 mg
Cobalto	160 mg	Potássio	25 mg
Cobre Quelatado	9 mg	Prolina	15 g
Colina	25 g	Selênio	10 mg
Cromo	6 mg	Serina	2.000 mg
DL-Metionina	30 g	Tirosina	500 mg
Enxofre	500 mg	Treonina	1.200 mg
Fenilalanina	2.000 mg	Triptofano	1.500 mg
Ferro Quelatado	4.000 mg	Valina	2.200 mg
Fluor (max.)	400 mg	Vitamina A	5.000.000 UI
Fósforo	40 g	Vitamina B1	9.000 mg
Glicina	20 g	Vitamina B 12	50.000 mcg
Hidroxiprolina	20 g	Vitamina B2	8.000 mg
Histidina	700 mg	Vitamina B6	2.000 mg
Inositol	100 mg	Vitamina C	33 g
Iodo	150 mg	Vitamina D3	275.000 UI
Isoleucina	1.500 mg	Vitamina E	7.000 UI
L-Carnitina	15 g	Zinco Quelatado	2.200 mg

Triclorsil

Indicação: Triclorsil é indicado no controle de parasitas em animais domésticos tais como: Bernes (larva de Dermatobia hominis), Bicho da Cabeça (Oestrus ovis), Gasterophilus, Habronema gástrico e cutâneo, bicheiras, piolhos, sarnas, pulgas dos animais domésticos e moscas das instalações.

Composição: Cada 100 g contém:
Metrifonato (Triclorfon) 98 g
Excipiente q.s.p. 100 g

Modo de uso: Via de administração: Oral Bovinos: No combate a Bernes e outros parasitas: 0,5 ml de uma solução a 10% para cada kg de peso vivo (10 g em 100 ml de água). Dose máxima de 200 ml. Caprinos e Ovinos: No combate ao bicho da cabeça e outros parasitas: 1 ml da solução a 10% para cada kg de peso vivo. Equinos: No combate à Gasterofilose, Habronemose e outras parasitoses: 3 a 4 g do produtopara cada 100 kg de peso vivo, puro ou misturado à ração. Pulverização: Bovinos: No combate à bernes: solução a 0,4% (80 g em 20 litros de água), pulverizar todo o animal consumindo 3 litros de solução por animal adulto.

Apresentação: Sachês de 20 g, 150 g e 500 g.

Max Prata

Indicação: Profilaxia e tratamento de Miíases ou "Bicheira" (larvas de Cochliomyia hominivorax) em Bovinos, Ovinos, Caprinos, Suínos, Equinos, ocasionadas após cirurgias, descornas, tratamento de umbigo de recém-nascidos, etc.

Composição: Cada 100 g do concentrado contém:
Sulfadiazina de Prata 0,1 g; Diclorvós 1,6 g; Cipermetrina 0,4 g; Alumínio 5,0 g; Veículo q.s.p. 100 g; Propolente Butano 80; Propano20.

Modo de uso: Via de administração: Tópica. Agite energicamente o frasco e vaporize a uma distância entre 10 a 20 cm, dentro da ferida previamente higienizada, e nas suas bordas. Recobrir toda a área da ferida com uma camada fina, mais consistente do produto, dentro do esquema seguinte: Profilaxia: Aplicação única. Tratamento: Uma vez ao dia durante 4 a 5 dias consecutivos. Nos casos de alta infestação ambiental, a aplicação pode ser repetida após 5 a 7 dias até a cura completa.

Apresentação: Embalagem metálica, tipo aerosol com 500 ml (290 g).

Triclorsil Pasta

Indicação: É indicado no controle e tratamento das infestações parasitárias gastrointestinais dos equídeos (equinos, muares e asininos). Atua eficazmente sobre Strongylus spp (grandes e pequenos), Parascaris equorum, Tridontophorus spp, Oesophagodontus spp, Trichostrongylus spp, Oxyuris equi, Trichonema spp e Strongyloides westeri. Controla ainda larvas de 1º, 2° e 3° estágios de Gasterophylus intestinalis e Gasterophylus nasais e formas adultas de Habronema spp.

Composição: Cada 100 g contém
Mebendazol 14,67 g
Metrifonato(Triclorfon) 50 g
Veículo q.s.p. 100 g

Modo de uso: Administrar por via oral 8,8 mg de Mebendazol e 30 mg de Triclorfon por kg de peso, correspondentes a 3 g de pasta para cada 50kg de peso, ajustando-se o marcador do êmbolo conforme o peso.

Apresentação: Seringas plásticas graduadas com 30 g.

Ubrecilin

Indicação:
Tratamento e profilaxia das mamites (mastites) subclínicas agudas e crônicas causadas por agentes etiológicos sensíveis aos princípios ativos da fórmula, tanto Gram Positivos como Gram negativos. Gram-Positivos – *Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus aureus e Staphylococcus epidermis.* Gram-Negativos – *Escherichia coli, Klebsiella sp e Pseudomonas aeruginosa.*

Composição:
Cada frasco-ampola de 100 ml contém:
Sulfato de Neomicina 5 g
Cloxacilina Sódica 2 g
Acetado de Prednisolona 20 mg
Veículo q.s.p. 100 ml

Modo de uso:
Via de administração: Intramamária. Esgotar totalmente o leite do quarto afetado, logo em seguida introduzir pelo orifício do teto correspondente o equivalente a 10 ml de Ubrecilin, utilizando para tanto a seringa que acompanha o produto, descartando a cânula aplicadora após cada aplicação. Repetir o tratamento a cada ordenha durante 03 (três) dias consecutivos. Agitar o frasco antes do uso.

Apresentação: 1 frasco-ampola com 100 ml, companhado de 1 seringa plástica de 10 ml, e 10 cânulas aplicadoras.

Unguento Vansil

Indicação:
Unguento Vansil está indicado para bovinos, ovinos, suínos, equinos e caprinos nas seguintes situações: descornas, marcações, arranhaduras, castrações, cura de umbigo de recém-nascidos, cirurgias, bicheiras e ferimentos em geral. Indicado como repelente para as moscas causadoras das miíases (bicheiras) e para os insetos que transportam os ovos da mosca do berne.

Composição:
Cada 100 g do produto contém:
Permetrina 0,5 g
Butóxido de Piperonila 3,5 g
Óxido de Zinco 20 g
Veículo q.s.p. 100 g

Modo de uso: Via de administração: Tópico. Higienizar o local com o auxílio de uma compressa de gaze e aplicar o Unguento Vansil. Repetir a aplicação diariamente até completa cicatrização da ferida. O excesso deve ser removido antes da aplicação da pomada nas reaplicações. O produto deve ser aplicado durante todo o tempo que se fizer necessário a fim de se obter uma perfeita cura.

Apresentação: Frascos de 50 e 250 g.

VetBras
Saúde e Nutrição Animal

PEQUENOS ANIMAIS

Condrocal B12

Indicação: CONDROCAL B12 é um Suplemento Mineral e Vitamínico composto por Condroitina, Glicosamina pelos minerais Cálcio e Fósforo e pelas Vitaminas B1, B2, B6, B12 e D3, indicado para animais, em todos os casos em que seja necessária a suplementação desses nutrientes, visando maior bem-estar do animal. É um complemento nutricional importante para filhotes em crescimento, animais que praticam exercícios físicos constantes e animais idosos.

Composição: Níveis de garantia por L(litro) do produto:
Cálcio (Mín).....50 g
Cálcio (Máx).....55 g
Fosforo (Mín).....23,4 g
Sulfato de Condroitina (Mín).....100 g
Sulfato de Glicosamina (Mín).....150 g
Vitamina B1 (Mínimo).....200 mg
Vitamina B12 (Mínimo).....6.000 mcg
Vitamina B2 (Mínimo).....170 mg
Vitamina B6 (Mínimo).....150 mg
Vitamina D3 (Mínimo).....40.000 UI

Modo de usar: Cães e gatos: administrar direto na boca do animal ou misturado ao alimento. 1ml para cada 5kg.
Pôneis e potros: até 150kg de peso vivo, administrar direto da boca do animal ou misturado ao alimento. 10ml por dia por animal.
Equinos, asininos e muares adultos: administrar direto na boca do animal ou misturado ao alimento. 20ml por dia por animal.
Suínos - Leitões em crescimento e adultos: administrar 3ml por kg de alimento.
Após 90 dias de tratamento, administrar a metade da dose indicada como dose manutenção.

Apresentação: Frascos 60mL e 120ml

Linovit ADE

Indicação: O LINOVIT é um Suplemento Vitamínico rico em ácidos graxos (Ômegas 3, 6 e 9) e composto por Vitaminas A, D e E. É indicado para cães e gatos em todos os casos em que seja necessária a suplementação destes nutrientes. Auxilia na manutenção do brilho e da maciez dos pelos.

Composição: Níveis de garantia por litro (L) de produto:

Vitamina A (min.)	200.000	UI
Vitamina D3 (min.)	40.000	UI
Vitamina E (min.)	1.000	UI
Ácido Linoleico - Fator Ômega 6 (min.)	405	g
Ácido Linolênico - Fator Ômega 3 (min.)	56	g
Ácido Oleico - Fator Ômega 9 (min.)	171	g
Colina (min.)	18	g

Modo de uso: Fornecer o LINOVIT por via oral puro, diretamente na boca do animal, ou misturado ao alimento, de acordo com a idade e o peso do animal, conforme a recomendação: CÃES - *Filhotes:* 1mL de LINOVIT para cada kg de peso corporal; *Adultos:* 1mL de LINOVIT para cada 2kg de peso corporal. Para animais com 60kg de
peso corporal ou mais, fornecer no máximo 60mL do produto ao dia, misturado ao alimento. GATOS - Administrar 1mL de LINOVIT para cada kg de peso corporal.

Apresentação: Frascos 60mL, 200mL e 400mL

GlicoVet Gold

Indicação: O GLICOVET GOLD é um Suplemento Mineral, Vitamínico e de Aminoácidos, indicado para animais de pequeno e médio portes. Contém em sua formulação um conjunto de nutrientes que disponibiliza energia de forma rápida e eficaz (Maltedextrina, Glicose, Glutamina), além de aminoácidos que são utilizados no processo da gliconeogênese e na realização da síntese de proteínas. favorece na recuperação física dos animais e no seu estado geral, principalmente em animais debilitados. O GLICOVET GOLD é pratico e palatável, podendo ser utilizado em qualquer fase de vida dos animais.

Modo de usar: Administrar por via oral, diretamente na boca do animal ou misturado na água ou alimento, nas seguintes dosagens:
CÃES E GATOS - Administrar 0,5 mL (10 gotas) para cada kg de peso corporal durante 3 dias seguidos, sendo a dosagewm máxima de 40 mL. A gose de manutenção deve ser a metadae da dose recomendada ou a critério do Médico Veterinário.
AVES, COELHOS E OUTROS ROEDORES - Administrar 0,5 mL (10 gotas) para cada 100 mL de água de bebida durante 3 dias seguidos. A dose de manutenção deve ser a metade da dose recomendada ou a critério do Médico Veterinário.
PÁSSAROS - Administrar 0,25 mL (5 gotas) em um bebedouro de gaiola (50 mL), durante 3 dias seguidos. A dose de manutenção deve ser a metade da dose recomendada ou à critério do Médico Veterinário.
Importante: Trocar a água dos bebedouros diariamente.

Apresentação: Frascos 30 mL, 60mL, 120mL e 250 mL.

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO (L) DE PRODUTO:

Ác. Aspártico (mín.)	3.900 mg	Carnitina (mín.)	13 g
Ác. Glutâmico (mín.)	7.000 mg	Leucina (mín.)	2.400 mg
Ác. Nicotínico (mín.)	2.000 mg	Lisina (mín.)	16 g
Ác. Pantotênico (mín.)	2.000 mg	Metionina (mín.)	17 g
Alanina (mín.)	6.050 mg	Prolina (mín.)	9.200 mg
Arginina (mín.)	3.500 mg	Serina (mín.)	1.200 mg
Betaína (mín.)	11,5 g	Taurina (mín.)	5.400 mg
Cisteína (mín.)	255 mg	Tirosina (mín.)	900 mg
Colina (mín.)	15,5 g	Treonina (mín.)	700 mg
Cromo (mín.)	10 mg	Triptofano (mín.)	200 mg
Ferro (mín.)	4.000 mg	Valina (mín.)	1.800 mg
Zinco (mín.)	3.500 mg	Vitamina B1 (mín.)	2.100 mg
Fenilalanina (mín.)	1.570 mg	Vitamina B2 (mín.)	400 mg
Glicina (mín.)	17 g	Vitamina B6 (mín.)	1.700 mg
L-Glutamina (mín.)	6.700 mg	Vitamina B12 (mín.)	17.000 mcg
Hidroxiprolina (mín.)	1.100 mg	Vitamina C (mín.)	2.500 mg
Histidina (mín.)	790 mg	Glicose (mín.)	202 g
Isoleucina (mín.)	1.020 mg	Maltodextrina (mín.)	35 g

HemoPet Gold

Indicação: O HEMOPET GOLD é um suplemento vitamínico e mineral indicado para animais de pequeno e médio portes. Contém nutrientes que auxiliam na formação e na integridade das células sanguíneas. Sua formula apresenta minerais quelatados (cobre, cromo, ferro e zinco), que aumentam a disponibilidade para o organismo, melhorando assim o estado geral dos animais. Apresenta ainda vitaminas do complexo B, que melhoram o metabolismo hepático e agem diretamente no processo da hematopoese (formação e desenvolvimento das células sanguíneas). O HEMOPET GOLD é pratico e palátavel, podendo ser dado em que qualquer fase da vida dos animais.

Modo de usar: Administrar por via oral, diretamente na boca do animal ou misturado na água ou alimento, nas seguintes dosagens:
CÃES E GATOS - Administrar 0,1 mL (2 gotas) por kg de peso corporal duas vezes ao dia. A dose de manutenção deve ser a metade da dose recomendada ou a critério do Médico Veterinário.
AVES, COELHOS E OUTROS ROEDORES - Administrar 1 mL (20 gotas) para cada 500 mL de água de bebida. A dose de manutenção deve ser a metade da dose recomendada ou a critério do Médico Veterinário.
PÁSSAROS - Administrar 5 gotas em um bebedouro de gaiola (50 mL) ou 10 gotas no bebedouro maior de 100 mL. A dose de manutenção deve ser a metade da dose recomendada ou à critério do Médico Veterinário.
Importante: Trocar a água dos bebedouros diariamente.

Apresentação: Frascos 30 mL, 60mL e 120mL.

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO (L) DE PRODUTO:

Ácido Fólico (mínimo)	100 mg
Ácido Nicotínico (mínimo)	2.700 mg
Ácido Pantotênico (mínimo)	2.600 mg
Cobalto (mínimo)	120 mg
Cobre (mínimo)	555 mg
Cromo (mínimo)	10 mg
Ferro (mínimo)	6.100 mg
Zinco (mínimo)	5.520 mg
Glicose (mínimo)	103 g
Maltodextrina (mínimo)	103 g
Energia Metabolizável (mínimo)	824 kcal
Vitamina B1 (mínimo)	200 mg
Vitamina B2 (mínimo)	500 mg
Vitamina B6 (mínimo)	220 mg
Vitamina B12 (mínimo)	5.000 mcg
Vitamina C (mínimo)	5.000 mg
Vitamina K3 (mínimo)	150 mg

VetBras
Saúde e Nutrição Animal

Natu Verm Comprimido

Indicação: NATU VERM COMPRIMIDO é um vermífugo de amplo espectro de ação, indicado no combate de nematódeos e cestódeos. NEMATÓDEOS: *Ancylostoma caninum e Ancylostoma tubaeforme* - ancilostomíase; *Toxocara canis* e *Toxocara cati* - toxocaríase; *Toxascaris leonina* - toxascaríase; *Trichuris vulpis* - tricuríase; CESTÓDEOS: *Dipylidium caninum* - dipilidiose; *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Echinococcus granulosus* - hidatiose; *Multiceps multiceps, mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei*, *Taenia ovis, Taenia hydatigena, Taenia multiceps, Spirometra ssp*. - teníase, *Echinococcus multilocularis* - echinococose.

Composição: Cada comprimido de 349,5mg contém:

Praziquantel	50,0 mg
Pirantel (Pamoato)	144,0 mg
Excipiente q.s.p	349,5 mg

Modo de uso: Deve ser administrado somente por via oral, diretamente na boca do animal, mantendo-a fechada até total deglutição ou ministrado em pequena quantidade de alimento que deverá ser totalmente ingerido na dosagem única de 01(um) comprimido para cada 10kg de peso animal.

Apresentação: Blíster com 4 comprimidos

Linovit Raças Pequenas

Indicação: O LINOVIT RAÇAS PEQUENAS é um Suplemento Vitamínico rico em ácidos graxos (Ômegas 3, 6 e 9) e composto por Vitaminas A, D e E. É indicado para cães e gatos de raças pequenas em todos os casos em que seja necessária a suplementação das vitaminas A, D e E e dos Ômegas 3, 6 e 9. Auxilia na manutenção do brilho e da maciez dos pelos, proporcionando maior embelezamento dos animais.

Composição: Níveis de garantia por litro (L) de produto:

Ácido Linoleico - Fator Ômega 6 (min.)	403	g
Ácido Linolênico - Fator Ômega 3 (min.)	63	g
Ácido Oleico - Fator Ômega 9 (min.)	176	g
Colina (min.)	18	g
Vitamina A (min.)	200.000	UI
Vitamina D3 (min.)	40.000	UI
Vitamina E (min.)	1.000	UI

Apresentação: Frascos 120mL

Natu Verm Plus

Indicação: NATU VERM PLUS é um vermífugo de amplo espectro de ação, indicado na prevenção e tratamento de parasitoses intestinais e da giardíase em cães e gatos causados por formas larvais e adultas de nematódeos, cestódeos e protozoários. Nematódeos (vermes redondos): Ancylostoma braziliense; Ancylostoma caninum; Toxocara canis; Toxocara cati; Toxascaris leonina; Trichuris vulpis; Uncinaria stenocephala. Cestódeos (vermes chatos): Echinococcus multilocularis; Dipylidium caninum; Joyeuxiella pasqualei; Taenia pisiformis; Taenia hydatigena; Taenia multiceps Taenia taeniaeformis; Taenia ovis; Echinococcus granulosus; Mesocestoides spp. Protozoários: Giardia spp.

Composição: Cada comprimido de 660mg contém:

Praziquantel	50,0 mg
Pirantel (Pamoato)	144,0 mg
Febantel	150,0 mg
Excipiente q.s.p	660,0 mg

Apresentação: Blíster com 4 comprimidos

Natu Verm Suspenção

Indicação: NATU VERM SUSPENSÃO é um vermífugo de amplo espectro de ação, indicado no combate de nematódeos e cestódeos. NEMATÓDEOS: *Ancylostoma caninum* e *Ancylostoma tubaeforme* - ancilostomíase; *Toxocara canis e Toxocara cati* - toxocaríase; *Toxascaris leonina* - toxascaríase; *Trichuris vulpis* - tricuríase; CESTÓDEOS: *Dipylidium caninum* - dipilidiose; *Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Echinococcus granulosus* - hidatiose; *Multiceps multiceps, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei, Taenia ovis, Taenia hydatigena, Taenia multiceps, Spirometra spp.* - teníase; *Echinococcus multilocularis* - echinococose.

Composição: Cada comprimido de 100mL contém:

Praziquantel	1,00 g
Pirantel (Pamoato)	2,88 g
Excipiente q.s.p	100,00 mL

Modo de uso: Após dosagem do produto de acordo com o peso do animal, na dosagem única de 1,00mL para cada 2kg de peso (de acordo com a tabela abaixo), utilizando seringa dosadora, administrar o produto diretamente na boca do animal, mantendo-a fechada até total deglutição, ou misturado em pequena quantidade de alimento que deverá ser totalmente ingerido.

Apresentação: Frascos 20mL e seringa dosadora.

Natuflin Comprimidos

Indicação: NATUFLIN é indicado no tratamento das infecções causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, Espiroquetas e Mycoplasmas sensíveis ao enrofloxacino tais como: *Staphylococcus spp.; Streptococcus spp. e Pseudomonas spp.* - Pneumonia, broncopneumonia, bronquite, cistite, nefrite, pielonefrite, otite, onfaloflebite, dermatite. *Escherichia coli e Salmonella spp,* - Infecções gastrointestinais.

Composição: Cada comprimido de 120mg contém:

Enrofloxacino	50 mg
Excipiente q.s.p	120 mg

Apresentação: Blíster com 10 comprimidos

Insetox

Indicação: Tratamento e controle das infecções por nematódeos e cestódeos de cães e gatos: Toxocara canis – toxocaríase; Trichuris vulpis – tricuríase; Toxascaris spp – toxascaríase; Ancylostoma caninum – ancilostomíase; Dipylidium caninum – dipilidiose; Taenia hydatigena – teníase; Echinococcus granulosus – echinococose.

Composição: Cada comprimido de 200 mg contém:

Mebendazol	100 mg
Excipiente q.s.p.	200 mg

Modo de uso: Administrar o SUINVET, por via oral, misturado ao alimento (ração), da seguinte forma. LEITÕES EM CRESCIMENTO, FÊMEAS EM GESTAÇÃO, LACTAÇÃO E REPRODUTORES: Misturar 1,5 kg do SUINVET EM 100 kg de alimento (ração), fornecer diariamente e à vontade para leitões em crescimento e diariamente para fêmeas em gestação, lactação e machos reprodutores.

Apresentação: Embalagem de 30mL e 100mL.

ProbVet

Indicação: O PROBVET e uma associação de Vitaminas do Complexo B, Prebioticos e Probioticos (acidos organicos) e enzimas digestivas, indicado para caes recem-nascidos, em crescimento e adultos de pequeno, medio e grande portes e gatos, e tem como objetivo, contribuir para o equilibrio da microbiota intestinal, sempre que necessario.

Apresentação: Seringa dosadora 14g

Composição: Níveis de Garantia por kg de Produto:

Bacillus subtilis (mín)	1,2 x 10^{11} UFC/kg
Bifidobacterium bifidum (mín)	1,2 x 10^{11} UFC/kg
Enterococcus faecium (mín)	2,4 X 10^{11} UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín)	3,0 X 10^{11} UFC/kg
Lactobacillus casei (mín)	2,4 X 10^{11} UFC/kg
Lactobacillus lactis (mín)	1,8 X 10^{11} UFC/kg
Acido Linolênico - Ômega 3 (mín)	9.000 mg
Ácido Linoleico - Ômega 6 (mín)	57,5 g
Ácido Oléico - Ômega 9 (mín)	25 g
Beta Glucanas (mín)	15 g
Cálcio (máx)	48 g
Cálcio (mín)	45 g
Ferro (mín)	1.500 mg
Mananoligossacarídeo - MOS (mín)	8.500 mg
Metionina (mín)	9.900 mg
Vitamina B1 (mínimo)	80 mg
Vitamina B2 (mínimo)	75 mg
Vitamina B6 (mínimo)	70,4 mg
Vitamina B12 (mínimo)	5.000 mcg

Mebendazole Naturrich

Indicação: Tratamento e controle das infecções por nematódeos e cestódeos de cães e gatos: Toxocara canis – toxocaríase; Trichuris vulpis – tricuríase; Toxascaris spp – toxascaríase; Ancylostoma caninum – ancilostomíase; Dipylidium caninum – dipilidiose; Taenia hydatigena – teníase; Echinococcus granulosus – echinococose.

Composição: Cada comprimido de 200 mg contém:
Mebendazol 100 mg
Excipiente q.s.p. 200 mg

Modo de uso: Mebendazole Naturrich Cães e Gatos deve ser administrado por via oral, diretamente na boca do animal, ou misturado ao alimento, na dosagem recomendada a cada 12 horas, durante 03 dias consecutivos:

INFESTAÇÕES POR NEMATÓDEOS:
Cães – até 5 Kg: ½ comprimido;
entre 6 e 10 Kg: 1 comprimido;
entre 11 e 15 Kg: 1 e ½ comprimido;
entre 16 e 20 Kg: 2 comprimidos;
entre 21 e 30 Kg: 3 comprimidos;
entre 31 e 40 Kg: 4 comprimidos.
Gatos – ½ comprimido.

INFESTAÇÕES POR CESTÓDEOS (TÊNIAS):
Dobrar a dosagem recomendada para nematódeos.

Apresentação: Display com 150 comprimidos (caixa de papelão com 10 display's).

Pulgol

Indicação: Combate pulgas, piolhos e carrapatos dos animais domésticos e instalações rurais. Combate moscas, insetos e ácaros dos currais, estábulos, pocilgas, galinheiros e outras dependências rurais

Composição: Cada 100g contém:
Carbaril 3,0 g
Deltrametrina 0,1 g
Excipiente q.s.p. 100,0 g

Modo de uso: Uso externo. Cobrir o corpo do animal com uma fina camada de pó espalhando bem entre os pelos. Polvilhar as instalações, esterqueiras, currais e cama dos animais com 50g a 100g do produto por m² para controlar as infestações de moscas, ácaros e outros insetos, aplicando nos ninhos de uma a duas colheres de sopa do produto. Usar duas vezes por semana no caso de infestações e quinzenal como tratamento preventivo.

Apresentação: Sacos 100g e 1kg; Talqueira 100g; Baldes com 150 sacos de 100g ou 15 sacos de 1kg.

Vermi Plus

Indicação: VERMIPLUS é um vermífugo oral de amplo espectro indicado na prevenção e tratamento de parasitoses causadas pelas formas larvais e adultas de cestódeos e nematódeos de cães e gatos, tais como: *Ancylostoma braziliensis, Ancylostoma caninum, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoides spp., Taenia hydatigena, Taenia Multiceps, Taenia ovis, Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis, Toxocara canis, Toxocaris leonina, Trichuris vulpis e Uncinaria stenocephala.*

Composição: Cada 100mL contém:
Praziquantel.....1,00 ...g
Pirantel (Pamoato).....2,88 ...g
Febantel.....3,00 ...g
Excipiente q.s.p.....100,00 mL

Modo de usar: Administrar o produto por via oral, sobre a língua, mantendo a boca do animal fechada até que o produto seja totalmente ingerido. Utilizar a dosagem de 1 mL para cada 2 kg de peso corporal, em dose única. O produto pode ser misturado à ração ou carne, sendo bem tolerado e dispensado regime prévio. Repetir o tratamento a cada 3 (três) ou 6 (seis) meses, a critério do Médico Veterinário.

Apresentação: Frasco 20mL

Verminex Gatos

Indicação: VERMINEX COMPRIMIDO é um vermífugo de amplo espectro de ação, indicado no combate de nematódeos e cestódeos EM GATOS. **NEMATÓDEOS:** Ancylostoma caninum e Ancylostoma tubaeforme – ancilostomíase; Toxocara canis e Toxocara cati – toxocaríase; Toxascaris leonina – toxascaríase; Trichuris vulpis – tricuríase; **CESTÓDEOS:** Dipylidium caninum – dipilidiose; Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Echinococcus granulosus – hidatiose; Multiceps multiceps, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei, Taenia ovis, Taenia hydatigena, Taenia multiceps, Spirometra spp. – teníase; Echinococcus multilocularis – echinococose.

Composição: Cada comprimido contém:
Embonato de Pirantel.....230,0 mg
Praziquantel.....20,0 mg
Excipiente q.s.p.....339,0 mg

Modo de uso: Verminex Gatos deve ser administrado somente por via oral, diretamente na boaca do animal, mantendo-a fechada até total deglutição ou misturado em pequena quantidade de alimento, ração ou à carne que deverão ser totalmente ingeridos na dosagem única de 01(um) comprimido para cada 4kg de peso animal, ou de acordo com a tabela abaixo:

Peso / Animal	Quantidade
até 1kg	1/4 comprimido
de 1,1 a 2kg	1/2 comprimido
de 2,1 a 3kg	3/4 comprimido
de 3,1 a 4kg	1 comprimido

Apresentação: Cartucho contendo 02 (dois) ou 04 (quatro) comprimidos cada.

Vitacanis

Indicação: O VITACANIS é um suplemento vitamínico, mineral e de aminoácidos indicado para cães e gatos nas épocas de aleitamento das fêmeas, amamentação dos filhotes, crescimento, gestação, reprodução e geriatria dos animais, em todos os casos em que seja necessária a suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos presentes na composição do produto.

Modo de usar: Administrar o produto Vitacanis diariamente, puro ou misturado ao alimento, nas seguintes dosagens: Cães: Para cães jovens, em crescimento e de companhia: 1g para cada kg de peso corpóreo. Para cadelas em gestação, lactação e machos reprodutores: 1,5g para cada kg de peso corpóreo. Gatos: Para gatas em gestação, lactação e machos reprodutores: 1g para cada kg de peso corpóreo por dia. Para animais jovens: 0,7g para cada kg de peso corpóreo.

Apresentação: Pote com 250 G

Composição: NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:
Ácido Fólico (Mínimo).....5mg
Ácido Pantotênico (Mínimo).....250mg
Cobalto (Mínimo).....60mg
Cobre (Mínimo).....180mg
Colina (Mínimo).....30g
Ferro (Mínimo).....2.000mg
Iodo (Mínimo).....60mg
Magnésio (Mínimo).....11g
Manganês (Mínimo).....126mg
Nicotinamida (Mínimo).....280mg
Sódio (Mínimo).....4,77g
Treonina (Mínimo).....400mg
Triptofano (Mínimo).....300mg
Vitamina A (Mínimo).....150.000UI
Vitamina B1 (Mínimo).....25mg
Vitamina B12 (Mínimo).....960mcg
Vitamina B2 (Mínimo).....50mg
Vitamina B6 (Mínimo).....25mg
Vitamina D3 (Mínimo).....15.000UI
Vitamina E (Mínimo).....1.490UI

VetBras
Saúde e Nutrição Animal

AVES

Averex Antibiótico

Indicação: Averex é indicado no tratamento da coccidiose ou eimeriose ou diarreia das aves, coriza infecciosa, tifo, cólera aviária e outros processos infecciosos provocados por agentes gram-positivos (Staphylococcus sp., Clostridium sp. e Streptococcus sp.) e gram-negativos (Escherichia coli; Salmonella sp.; Pasteurella sp.; Pseudomonas aeruginosa) sensíveis à Sulfadiazina em aves de pequeno, médio e grande portes.

Composição: Cada 100mL contém:
Sulfadiazina Sódica.....5,00 g
Azul de Metileno.....0,10 g
Veículo q.s.p.....100,00 g

Modo de uso: Aves de pequeno, médio e grande portes (Galinhas, gansos, marrecos, patos, perus): Diluir 10 g por litro de água nos bebedouros durante 5 a a7 dias ou misturar 10 g para cada kg de ração e fornecer à vontade para as aves. Pássaros em geral: Diluir 1 g para cada 50 mL de água e colocar nos bebedouros ou misturar 1 g para cada 50 g de alimento e fornecer à vontade.

Averin Solúvel

Indicação: Averin Solúvel é indicado no tratamento da Coccidiose ou Eimeriose ou Diarreia de sangue (Eimeria ssp.) e da Cólera Aviária ou Pasteurelose (Pasteurella multocida). Também é indicado no tratamento de outras moléstias que acometem o trato digestivo e/ou respiratório como: Coriza infecciosa ou catarro infeccioso (Haemophilus gallinarum), Pulorose ou diarreia branca dos pintos (Salmonella pullorum), Tifo aviário ou mal triste (Salmonella gallinarum) e outras infecções causadas por germes sensíveis à associação Sulfametoxazol + Trimetoprim.

Composição: Cada 100mL contém:
Sulfametoxazol.....4.000 mg
Trimetoprim.....800 mg
Azul de Metileno.....10 mg
Veículo q.s.p.....100,0mL

Modo de usar: Dissolver o produto em água de bebida e fornecer aos animais de acordo com a dosagem a seguir:
Galinhas, gansos, marrecos, perus e aves em geral. No tratamento preventivo: adicionar 10ml do produto para cada 2,5 litros de água de bebida ou 10 gotas para cada 50ml de água dos bebedouros e fornecer aos animais durante 5 a 7 dias seguidos.
No tratamento curativo: adicionar 20ml do produto para 2.5ml de água de bebida ou 20 gotas para cada 50ml de água dos bebedouros e fornecer aos animais durante 5 a 7 dias seguidos.

Apresentação: Frascos 20L, 100mL e 1 Kg

Rubramin B12

Indicação: O RUBRAMIN B12 é uma associação das vitaminas do Complexo B com as vitaminas E e K, que são muito importantes, contribuindo para o bom funcionamento de alguns órgãos dos animais. Indicado para o crescimento, animais mais idosos e animais mais fracos, todas as vezes em que seja necessária a suplementação de vitaminas do Complexo B, vitamina E e vitamina K.

Composição: Níveis de garantia por L (litro) de produto:

Vitamina B1 (min.)	5.507 mg
Vitamina B6 (min.)	2.500 mg
Vitamina B12 (min.)	6.000 mcg
Vitamina E (min.)	5.500 UI
Vitamina K (min.)	3.000 mg

Apresentação: Frascos 20L

Potemin B12

Indicação: Potemin B12 Oral é indicado para aves, bovinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, cães e gatos. Pode ser utilizado no período de gestação e lactação, após o manejo de vacinações e outros manejos que causem desconforto aos animais na época de cobertura, no complemento alimentar dos filhotes em crescimento, no reforço alimentar de animais de esportes e trabalhos pesados, e na complementação vitamínica e mineral dos animais mais idosos. Auxilia aos animais a mostrarem todo o seu potencial.

Modo de Usar: AVES DE PEQUENO PORTE (CANÁRIOS, CURIÓS, ETC.): Administrar 6 gotas nos bebedouros de gaiola (50 mL), continuamente ou até suprir totalmente as necessidades das aves.

Apresentação: Frascos 20L e 120mL

Composição: NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO (L) DE PRODUTO:

Ácido Pantotênico (Mín)	1.350mg
Cálcio (Mín)	1.800mg
Cálcio (Máx)	2.000mg
Potássio (Mín)	1.500mg
Sódio (Mín)	3.950mg
Vitamina B1 (Mín)	200mg
Vitamina B2 (Mín)	400mg
Vitamina B6 (Mín)	300mg
Vitamina B12 (Mín)	20.000mg
Vitamina K (Mín)	400mg
Nicotinamida (Mín)	1.700mg

Thuya Avícola Naturrich

Indicação: Antisséptico e Ceratolítico. Indicado no tratamento de verrugas e condilomas, resultantes de processos infecciosos e de afecções como a bouba avícola. Indicado como adjuvante na remoção de calosidades em aves.

Composição: Cada 100mL contém:
Tintura de Thuya occidentalis.....20 mg
Veículo q.s.p.....100,0mL

Modo de Uso: *Uso tópico (externo):* Aplicar o produto nas regiões afetadas com auxílio do cotonete ou bastão com uma mecha de algodão na ponta, uma vez ao dia, durante 06 (seis) dias, até desaparecimento das afecções.
Uso oral (interno): Adicionar 5mL (uma colher das de chá) do produto em cada litro de água dos bebedouros, no início do dia, descartando as sobras no final do dia, durante 02 (duas) semanas. Suspender o uso por 01 (uma) semana e retornar caso os sintomas não tenham desaparecido.

Apresentação: Frascos 20mL, 30mL e 100mL

Farinha de Cálcio Fosfatada

Indicação: A FARINHA DE CÁLCIO FOSFATADA é um suplemento mineral para Aves para ser fornecido puro ou adicionado ao alimento, suplementando as aves principalmente com cálcio, fósforo, magnésio e Zinco, contribuindo para o bom crescimento das aves, e auxiliando na melhoria das cascas dos ovos.

Composição: Níveis de garantia por L (litro) de produto:

Cálcio (min.)	332	g
Cálcio (máx.)	322	g
Cloro (min.)	33	g
Enxofre (min.)	5.000	mg
Fluor (máx.)	240	mg
Fósforo (min.)	20	g
Iodo (min.)	40	mg
Magnésio (min.)	10	g
Sódio (min.)	22	g
Zinco (min.)	2.000	mg

Apresentação: Saco 1 kg.

Biotrin Vet Cálcio + B12 Pó

Indicação: O BIOTRIN VET CÁLCIO + B12 é um Suplemento Vitamínico e Mineral indicado para todas as aves domésticas e silvestres em todos os casos em que seja necessária a suplementação de Cálcio, Fósforo e vitaminas D3 e B12.

Composição: Níveis de garantia por kg de produto:

Cálcio (min.)	173	g
Cálcio (máx)	190	g
Fósforo (min.)	63	g
Vitamina B12 (min.)	2.000	mcg
Vitamina D3 (min.)	150.000	UI

Modo de usar: Administrar o Biotrin Pó Cálcio + B12 nas seguintes proporções:
Aves ornamentais e pássaros de menor porte (canários, curiós, etc.): administrar 6 gotas nos bebedouros de gaiola (50ml), continuamente ou até que não seja mais necessária a administração.

Apresentação: Frascos 50g

Biotrin Vet ADE

Indicação: O BIOTRIN VET ADE é um Suplemento Vitamínico para ser misturado à água de bebida, indicado para todas as aves domésticas e silvestres, em todos os casos em que seja necessária a suplementação de Vitaminas A, D e E.

Composição: Níveis de garantia por L (litro) de produto:

Vitamina A (min.)	15.000.000 UI
Vitamina D3 (min.)	1.500.000 UI
Vitamina E (min.)	4.500 UI

Modo de usar: Administrar o BIOTRIN VET ADE nas seguintes proporções: AVES DE PEQUENO PORTE: misturar diariamente na água do bebedouro comum de gaiola de 50mL, 4 gotas do produto. Fornecer a mistura até o completo restabelecimento das aves; AVES DE MÉDIO E GRANDE PORTES (frangos e aves de postura, avestruzes e outros tipos de aves): misturar 1mL (20 gotas) em 1 litro de água de bebida e fornecer a mistura até o completo restabelecimento das aves.
Obs.: Trocar a água dos bebedouros diariamente.

Apresentação: Frascos 20mL

Biotrin Vet Pó Vitaminico

Indicação: O BIOTRIN VET PÓ VITAMÍNICO é um Suplemento Vitamínico, Mineral e de Aminoácidos indicado para todas as aves domésticas e silvestres em todos os casos em que seja necessária a suplementação de Cálcio, Fósforo, Ferro, Zinco, Cobre, Magnésio, Iodo, Selênio, Vitaminas A, D, E, K, do complexo B, Nicotinamida, Acido Pantotênico, Acido Fólico e aminoácidos presentes na composição do produto. Auxilia no embelezamento da plumagem das aves.

Apresentação: Frascos 50g

Composição: Níveis de garantia por kg de produto:

Ácido Fólico (mínimo)	60	mg
Ácido Pantotenico (mínimo)	80	mg
Biotina (mínimo)	10	mg
Cálcio (mínimo)	46	g
Cálcio (máximo)	51	g
Cobre (mínimo)	110	mg
Colina (mínimo)	13	g
Ferro (mínimo)	550	mg
Fósforo (mínimo)	39	g
Iodo (mínimo)	8,8	mg
Lisina (mínimo)	7.500	mg
Magnésio (mínimo)	2,400	mg
Metionina (mínimo)	3.500	mg
Nicotinamida (mínimo)	2.600	mg
Selênio (mínimo)	4	mg
Vitamina A (mínimo)	100.000	UI
Vitamina B1 (mínimo)	16	mg
Vitamina B2 (mínimo)	24	mg
Vitamina B6 (mínimo)	24	mg
Vitamina B12 (mínimo)	2.000	mcg
Vitamina D3 (mínimo)	13.500	UI
Vitamina E (mínimo)	700	UI
Vitamina K (mínimo)	40	mg
Zinco (mínimo)	660	mg

Biotrin Vet Muda de Penas

Indicação: O BIOTRIN VET MUDA DE PENAS é um Suplemento Mineral, Vitamínico e de Aminoácidos indicado para a muda de pena das aves, fornecendo nutrientes necessários para a reposição normal das pernas e bicos. Ajuda a manter as aves na normalidade durante o processo de muda de penas.

Composição: Níveis de garantia por kg de produto:

Biotina (mín)	150	mg
Cálcio (mín)	1.350	mg
Cálcio (máx)	1.490	mg
Colina (mín)	4.500	mg
Iodo (mín)	150	mg
Lisina (mín)	1.200	mg
Metionina (mín)	2.400	mg
Nicotinamida (mín)	2.400	mg
Pantotenato de Cálcio (mín)	1.200	mg
Potássio (mín)	50	mg
Vitamina A (mín)	1.000.000	UI
Vitamina B1 (mín)	2.000	mg
Vitamina B6 (mín)	2.000	mg
Vitamina B12 (mín)	400	mcg
Vitamina D3 (mín)	400.000	UI
Vitamina K (mín)	300	mg
Zinco (mín)	150	mg

Modo de uso: Administrar por via oral, misturado à água ou ao alimento, nas seguintes proporções: Aves de Pequeno Porte e Ornamentais - administrar 8 gotas em cada bebedouro de gaiola(50mL) ou alimento administrado no cocho, enquanto durar o processo de muda.

Apresentação: Frascos 20mL

Biotrin Vet Cálcio + B12 Solúvel

Indicação: O BIOTRIN VET CÁLCIO + B12 SOLÚVEL é um Suplemento Vitamínico e Mineral indicação para todas as aves domesticas e silvestres em todos os casos em que seja necessária a suplementação de Cálcio e Vitaminas K, D e B12. Auxilia no crescimento sadio e no embelezamento da plumagem das aves. Auxilia na melhora da qualidade da casca dos ovos.

Composição:
Níveis de garantia por L (litro) de produto:

Cálcio (min.)	17	g
Cálcio (máx)	19	g
Vitamina B12 (min.)	10.000	mcg
Vitamina D3 (min.)	500.000	UI
Vitamina K (min.)	390	mg

Modo de Uso: Administrar o BIOTRIN VET CÁLCIO + B12 SOLÚVEL na água de bebida ou alimento nas seguintes proporções: Aves Ornamentais e Pássaros de Menor Porte (canários, curiós, etc.) - continuamente ou até que não seja mais necessária a administração.

Apresentação: Frascos 20mL

VetBras
Saúde e Nutrição Animal

Biotrin Vet Filhotes

Indicação: O BIOTRIN VET FILHOTES é um Suplemento Mineral, Vitamínico e de Aminoácidos indicado para os filhotes de todas as aves domésticas e silvestres. Apresenta em sua formulação o Cálcio, Vitamina D, Vitamina B12, Lisina, Colina e Metionina. O Cálcio e a Vitamina D auxiliam na formação e fortalecimento ósseo e a Lisina é um aminoácido essencial ao desenvolvimento das aves. A Colina e a Metionina proporcionam melhora da função hepática e a Vitamina B12 é essencial na formação sanguínea. Todos esses elementos juntos, proporcionam um crescimento sadio das aves.

Composição: Níveis de garantia por L (litro) de produto:

Cálcio (min.)	17	g
Cálcio (máx)	19	g
Vitamina B12 (min.)	10.000	mcg
Vitamina D3 (min.)	500.000	UI
Lisina (min.)	1.400	mg
Colina (min.)	600	mg
Metionina (min.)	1.980	mg

Apresentação: Frascos 20L

Biotrin Vet 100 PS

Indicação: O BIOTRIN VET 100 PS é um Suplemento de Aminoácidos, Vitamínico e Mineral, indicado para todas as aves domésticas e silvestres, em todos os casos em que seja necessária a suplementação dos componentes da formulação, visando auxiliar no crescimentos sadio da musculatura, no embelezamento da plumagem, no auxilio dos stress causando por altas temperaturas e transportes, e na manutenção da boa saúde das aves.

Apresentação:
Frascos 20L

Composição: Níveis de garantia por kg de produto:

Ácido Nicotinico (mín)	3.299	mg
Ácido Pantotênico (mín)	1.000	mg
Arginina (mín)	3.500	mg
Cloro (mín)	24	g
Ferro (mín)	4.000	mg
Glicose (mín)	200	g
Isoleucina (mín)	1.020	mg
Lisina (mín)	7.000	mg
Magnésio (mín)	300	mg
Potássio (mín)	12,75	g
Sódio (mín)	15,6	g
Vitamina A (mín)	1.200.000	UI
Vitamina B1 (mín)	5.500	mg
Vitamina B6 (mín)	2.000	mg
Vitamina B12 (mín)	10.000	mcg
Vitamina C (mín)	4.000	mg
Vitamina E (mín)	2.000	mg
Vitamina K3 (mín)	600	mg
Zinco (mín)	3.500	mg

Biotrin Vet Fertilidade e Reprodução

Indicação: O BIOTRIN VET FERTILIDADE E REPRODUÇÃO é um Suplemento Vitamínico e de Aminoácidos indicado para o período da reprodução, por auxiliar no preparo das aves para o acasalamento e início reprodutivo, fornecendo um maior equilíbrio biológico às aves, para o melhor desempenho dessa função.

Composição: Níveis de garantia por L (litro) de produto:

Ácido Pantotênico (min.)	300	mg
Nicotinamida (min.)	10	g
Triptofano (min.)	300	mg
Vitamina A (min.)	1.500.000	UI
Vitamina E (min.)	6.000	UI
Vitamina K (min.)	390	mg

Modo de uso: Administrar por via oral, misturado à água de bebida ou ao alimento, nas seguintes proporções: Aves Ornamentais - administrar 8 gotas no bebedouro de gaiolas (50mL), até o nascimento dos filhotes.

Apresentação: Frascos 20L

Biotrin Vet Complexo Vitamínico

Indicação: O Biotrin - Complexo Vitamínico é um suplemento vitamínico para ser misturado à água de bebida, indicado para todas as aves domésticas e silvestres, em todos os casos em que seja necessária a suplementação de Vitaminas A, D, E, do Complexo B e Nicotinamida. Auxilia no embelezamento da plumagem das aves.

Modo de usar: Administrar o Biotrin - Complexo Vitamínico nas seguintes proporções: Aves de pequeno porte: misturar diariamente na água do bebedouro comum de gaiola de 50ml, 6 gotas do produto.Obs.: Trocar a água dos bebedouros diariamente.

Apresentação: Display contendo 50 saches 20g , Display contendo 25 saches 20g

Composição: Níveis de garantia por kg do produto Biotrin - Complexo Vitamínico:

Nicotinamida (mínimo)	10g
Vitamina A (mínimo)	12.000.000 UI
Vitamina B1 (mínimo)	5.500mg
Vitamina B2 (mínimo)	2.000mg
Vitamina B6 (mínimo)	3.000mg
Vitamina B12 (mínimo)	5.000mcg
Vitamina D3 (mínimo)	600.000 UI
Vitamina E (mínimo)	5.500 UI

Biotrin Vet Plumagem

Indicação: O BIOTRIN VET PLUMAGEM é um Suplemento Mineral, Vitamínico e de Aminoácidos composto por ácidos graxos (ômegas 3, 6 e 9), vitaminas, lisina e zinco, indicado como auxiliar na formação de embelezamento da plumagem das aves (principalmente dos filhotes que estão com a plumagem em formação), proporcionando um desenvolvimento normal das aves.

Composição: Níveis de garantia por L (litro) de produto:

Ácido Linoleico (min.)	5.500	mg
Ácido Linoleico (min.)	900	mg
Ácido Oleico (min.)	2.500	mg
Biotina (min.)	120	mg
Lisina (min.)	1.200	mg
Nicotinamida (min.)	5.000	mg
Ácido Pantotênico (min.)	2.200	mg
Vitamina A (min.)	1.000.000	UI
Vitamina B6 (min.)	2.200	mg
Vitamina D3 (min.)	500.000	UI
Vitamina K (min.)	300	mg
Zinco (min.)	1.000	mg

Modo de Uso: Administrar por via oral, misturado à água ou ao alimento, nas seguintes proporções: Aves Ornamentais de Pequeno Porte - administrar 5 gotas no bebedouro da gaiola (50mL), ou diluir ao alimento no cocho.

Apresentação: Frascos 20L

Biotrin Vet Ferro

Indicação: O BIOTRIN VET FERRO é um Suplemento Vitamínico e Mineral para ser misturado à água de bebida indicado para todas as aves domésticas e silvestres em todos os casos em que seja necessária a suplementação de Ferro, Nicotinamida, Acido Pantotênico e Vitaminas do Complexo B.

Composição: Níveis de garantia por L (litro) de produto:

Ácido Pantotênico (min.)	480	mg
Ferro (min.)	27	g
Nicotinamida (min.)	5.000	mg
Vitamina B1 (min.)	166	mg
Vitamina B2 (min.)	200	mg
Vitamina B6 (min.)	418	mg
Vitamina B12 (min.)	6.560	mcg

Modo de Uso: Administrar o BIOTRIN VET FERRO nas seguintes proporções: AVES DE PEQUENO PORTE: misturar diariamente na água do bebedouro comum de gaiola de 50mL, 8 gotas do produto. Fornecer a mistura até o completo restabelecimento das aves.

Apresentação: Frascos 20L

Biotrin Vet Boldo

Indicação: O BIOTRIN VET BOLDO é um Suplemento Vitamínico e de Aminoácidos, que contém Extrato de Boldo, Vitaminas do Complexo B, além de Metionina, Lisina e Colina indicado para suplementação diária de pássaros e aves ornamentais, auxiliando na manutenção de aves alegres e sadias.

Composição: Níveis de garantia por L (litro) de produto:

Boldina (min.)	60	mg
Betaína (min)	4.000	mg
Metionina (min.)	80	g
Colina (min.)	100	g
Lisina (min.)	15	g
Maltodextrina(min.)	22	g
Inositol (min.)	11	g
Energia metabolizável (min.)	88	kcal
Vitamina B1 (min.)	2.100	mg
Vitamina B12 (min.)	5.000	mcg
Vitamina B6 (min.)	2.188	mg

Apresentação: Frascos 20L

Biotrin Vet Canto

Indicação: O BIOTRIN VET CANTO é um Suplemento Mineral, Vitamínico e de Aminoácidos, com Extratos de Pimenta, de Própolis e Óleo Essencial de Gengibre, indicando para suplementação diária de pássaros e aves ornamentais visando o bem estar e o canto.

Apresentação: Frascos 20mL

Composição: Níveis de garantia por kg de produto:

Ácido Aspártico (mín)	233	mg
Ácido Fólico (mín)	401	mg
Ácido Glutâmico (mín)	800	mg
Ácido Pantotênico (mín)	600	mg
Nicotinamida (mín)	1.003	mg
Arginina (mín)	2.000	mg
Cisteína (mín)	500	mg
Extrato de Pimenta (mín)	250	mg
Sacarose (mín)	200	g
Energia Metabolizável (mín)	960	kcal
Lisina (mín)	1.700	mg
Metionina (mín)	4.000	mg
Maltodextrina (mín)	40	g
Óleo Essencial de Gengibre (mín)	1.000	mg
Extrato de Própolis (mín)	30	mg
Taurina (mín)	2.000	mg
Vitamina A (mín)	1.000.000	UI
Vitamina D3 (mín)	125.000	UI
Vitamina E (mín)	1.000	UI
Vitamina B1 (mín)	150	mg
Vitamina B12 (mín)	5.000	mcg
Vitamina B2 (mín)	100	mg
Vitamina B6 (mín)	100	mg
Vitamina C (mín)	4.000	mg
Vitamina E (mín)	2.000	mg
Vitamina K3 (mín)	300	mg
Zinco (mín)	3.000	mg

VetBras
Saúde e Nutrição Animal

Biotrin Vet - Tabela de Administração

Siga a ordem numérica de cada indicação, de acordo com a necessidade de cada ave.
Optar por um único complexo vitamínico. Não misture os produtos no mesmo bebedouro.
Suplemento Vitamínico - uso contínuo - misturado ao alimento.
O termo 'peito seco', não é uma doença e sim um sintoma. Significa que a ave emagreceu demais e rapidamente. Há diversas causas para esse emagrecimento. O Biotrin 100 PS atua sobre as causas nutricionais (carências, deficiência, entre outras).

INDICAÇÕES	BIOTRIN Reprodução	BIOTRIN Cálcio	BIOTRIN Antibiótico	BIOTRIN ADE	BIOTRIN Vitamínico	BIOTRIN Ferro	BIOTRIN Muda	BIOTRIN Plumagem	BIOTRIN Baldo	BIOTRIN 100 PS	BIOTRIN Canto	BIOTRIN Pó
ANEMIA				2º		1º						●
COCCIDIOSE			1º			2º			3º			●
FILHOTES					1º		2º	3º				●
DEFICIÊNCIA DE CÁLCIO		1º										●
ESTRESSE				2º	1º							●
EMBELEZAMENTO DAS PLUMAS								1º				●
EXPOSIÇÕES				2º				1º			3º	●
INFECÇÕES BACTERIANAS			1º		2º				3º	4º		●
MUDA							1º	2º				●
POSTURA		1º			2º							●
RECUPERAÇÃO				2º	1º				3º	4º		●
REPRODUÇÃO	1º				2º							●
SUPLEMENTAÇÃO DIÁRIA					1º							●
VERMINOSES INTESTINAIS					1º				2º			●
PEITO SECO*			2º							1º		●
ROUQUIDÃO			1º								2º	●
ESTIMULO DE CANTO											1º	●

GRANDES ANIMAIS

Ade Pó

Indicação: ADE Pó Vetbras é um suplemento composto por vitaminas A D e E protegidas, indicado para aves, bovinos, caprinos, coelhos, equinos, ovinos e suínos, em todos os casos de deficiências em que haja necessidade de suplementação de vitaminas ADE principalmente no período da seca onde as pastagens estão mais pobres em nutrientes.

Composição: Níveis de garantia por kg do produto ADE Pó Vetbras:
Cálcio (Mínimo).....270g
Cálcio (Máximo).....297g
Vitamina A (Mínimo).....13.000.000 UI
Vitamina D3 (Mínimo).....2.200.000 UI
Vitamina E (Mínimo).....7.000mg

Modo de uso: Ao usar o ADE Pó Vetbras misturado aos macrominerais, utilizar a mistura no máximo em 7 dias. Bovinos: Nos macrominerais, administrar 1kg em 25kg e distribuir à vontade em cochos cobertos e protegidos das chuvas. Na ração, administrar 1kg por tonelada. No alimento volumoso, administrar a proporção de 4 g por dia por animal, até o completo restabelecimento do animal.
Potros até 100kg: Nos macrominerais, administrar 1kg em 25kg e distribuir à vontade em cochos cobertos e protegidos das chuvas. Na ração, administrar 1kg por tonelada. No alimento volumoso, administrar a proporção de 2 g por dia por animal, até o completo restabelecimento do animal.
Equinos adultos e em lactação: Nos macrominerais, administrar 1kg em 25kg e distribuir à vontade em cochos cobertos e protegidos das chuvas. Na ração, administrar 1kg por tonelada. No alimento volumoso, administrar a proporção de 4g por dia por animal, até o completo restabelecimento do animal.
Ovinos e caprinos: Nos macrominerais, administrar 1kg em 25kg e distribuir à vontade em cochos cobertos e protegidos das chuvas. Na ração, administrar 1kg por tonelada. No alimento volumoso, administrar a proporção de 2g por dia por animal, até o completo restabelecimento do animal.
Suínos, aves e coelhos: Administrar a proporção de 500g por tonelada de ração.

Apresentação: Frascos contendo 30g e sachê contendo 30g, 50g e 100g.

Potemin B12

Indicação: Potemin B12 Oral é indicado para aves, bovinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, cães e gatos. Pode ser utilizado no período de gestação e lactação, após o manejo de vacinações e outros manejos que causem desconforto aos animais na época de cobertura, no complemento alimentar dos filhotes em crescimento, no reforço alimentar de animais de esportes e trabalhos pesados, e na complementação vitamínica e mineral dos animais mais idosos. Auxilia aos animais a mostrarem todo o seu potencial.

Composição: NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO (L) DE PRODUTO:
Ácido Pantotênico (Mín)..... 1.350mg
Cálcio (Mín)..... 1.800mg
Cálcio (Máx)..... 2.000mg
Potássio (Mín)..... 1.500mg
Sódio (Mín)..... 3.950mg
Vitamina B1 (Mín)..... 200mg
Vitamina B2 (Mín)..... 400mg
Vitamina B6 (Mín)..... 300mg
Vitamina B12 (Mín)..... 20.000mg
Vitamina K (Mín)..... 400mg
Nicotinamida (Mín)..... 1.700mg

Modo de Usar: Administrar 1 mL para cada 2 kg de peso vivo, 2 vezes ao dia continuamente, ou até suprir totalmente as necessidades dos animais.
Administrar 2 mL para cada 5 kg de peso vivo, 2 vezes ao dia continuamente, ou até suprir totalmente as necessidades dos animais.
BOVINOS (BEZERROS) E EQUINOS (POTROS) ATÉ 100 KG DE PESO VIVO, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS (ADULTOS): Administrar 2 mL para cada 15 kg de peso vivo, 2 vezes ao dia continuamente, ou até suprir totalmente as necessidades dos animais.
BOVINOS E EQUINOS EM CRESCIMENTO: ATÉ 300 KG DE PESO VIVO: Administrar 2 mL para cada 25 kg de peso vivo, duas vezes ao dia continuamente, ou até suprir totalmente as necessidades dos animais.
BOVINOS E EQUINOS ADULTOS: Administrar 2 mL para cada 30 kg de peso vivo, duas vezes ao dia continuamente, ou até suprir totalmente as necessidades dos animais.

Apresentação: Frascos 20L e 120mL

VetBras
Saúde e Nutrição Animal

Calcioral B12

Indicação: O CALCIORAL B12 é um Suplemento Vitamínico e Mineral indicado para animais de pequeno, médio e grande portes, em todos os casos em que seja necessária a suplementação dos minerais Cálcio e Fósforo e das Vitaminas A, D3, B1, B2, B6 e B12, como na lactação das fêmeas, no complemento alimentar dos filhotes em crescimento, no reforço alimentar de animais de esportes e na complementação cálcica e vitamínica dos animais mais idosos (geriatria).

Modo de usar: Administrar por via oral, diretamente na boca do animal ou misturado na água ou alimento, nas seguintes dosagens: ANIMAIS DE GRANDE PORTE FILHOTES (ATÉ 150 kg): Administrar 1 mL para cada 5 kg de peso corporal, continuamente ou até o completo restabelecimento do animal; ADULTOS: Administrar 1 mL para cada 10 kg de peso corporal, continuamente ou até o completo restabelecimento do animal; EM LACTAÇÃO: Administrar 1 mL para cada 5 kg de peso corporal, continuamente ou até o completo restabelecimento do animal.

Apresentação: Frasco com 100mL e 1L.

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO (L) DE PRODUTO:

Cálcio (máximo)	55,0	g
Cálcio (mínimo)	50,0	g
Fósforo (mínimo)	23,4	g
Vitamina A (mínimo)	300.000	UI
Vitamina D3 (mínimo)	480.000	UI
Vitamina B1 (mínimo)	200	mg
Vitamina B2 (mínimo)	170	mg
Vitamina B6 (mínimo)	150	mg
Vitamina B12 (mínimo)	6.000	mcg

HidraVet Hidrat Energético

Indicação: HIDRAVET - HIDRATANTE E ENERGÉTICO é um Suplemento Mineral hidratante e energético que contém Cálcio, Cloro, Maltodextrina, Magnésio, Potássio e Sódio em concentrações equilibradas, indicado para aves, bovinos, suínos, coelhos, equinos, cães e gatos, na reposição de eletrólitos perdidos em exercicios prolongados e intensos, e no desconforto causado pelo calor excessivo.

Composição: Níveis de garantia por kg de produto:

Cálcio (min.)	5.000	mg
Cálcio (máx)	5.500	mg
Cloro (min.)	340	g
Energia metabolizável (min.)	680	kcal
Magnésio (min.)	9.000	mg
Potássio (min.)	66	g
Sódio (min.)	182	g

Apresentação: Sachês 10g e 40g e Pote 500g

Equivet Gold

Indicação: EQUIVET GOLD é recomendado para o efetivo controle dos parasitos dos equinos:
GRANDES ESTRÔNGILUS – Strongylus vulgaris (adultos e estágios arteriais), S. edentatus (adultos e estágios tissulares), S. equinus (adultos), Triodontophorus spp. (adultos);
PEQUENOS ESTRÔNGILUS (ADULTOS E LARVAS DE 4º ESTÁGIO) – Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp..
OUTROS NEMATÓDEOS – Harbronema muscae (adultos), Trichostrongylus axel (adultos), Strongyloides westeri (adultos), Oxyuris equi (adultos e imaturos), Parascaris equorum (adultos e larvas de 3º e 4º estágios), Onchocerca spp. (microfilárias).
VERMES PULMONARES (adultos e larvas de 4º estágio) – Dictyocaulus arnfieldi.
DERMATOSES CUTÂNEAS – Draschia spp. (larvas de 3º estágio) ou ''feridas de verão'', Habronema muscae(adultos).
LARVAS – Gasterophilus spp. (estágios oral e gástrico).

Composição: NÍVEIS DE GARANTIA por kg do produto:

Ivermectina	1,87g
Excipiente q.s.p.	100,0g

Modo de uso: EQUIVET GOLD deve ser administrado por via oral. A seringa é graduada com variação de doses equivalente a 100 kg. Girando o anel para a direita, pode-se fixá-lo na marca da dose necessária. No momento da administração do produto, assegurar-se de que o animal não tenha alimento na boca. Aplicar o produto, posicionando o bico da seringa entre os dentes incisivos e os molares. Graduar a seringa na dose adequada ao peso do animal e pressionar o êmbolo, depositando o medicamento na parte posterior da língua. Levantar a cabeça do animal, até que o produto seja totalmente deglutido. Cada seringa de 6,42 g é suficiente para tratar 600 kg de peso corporal.
O Médico Veterinário poderá recomendar o esquema de controle das parasitoses apropriado às condições locais, envolvendo todos os equinos, especialmente éguas, animais de sobre ano e potros a partir de 6 a 8 semanas de idade. O intervalo entre os tratamentos deverá ser feito de acordo com recomendação do Médico Veterinário.

Administrar a dose de 1,07 g do produto para cada 100 kg de peso corporal, obedecendo a graduação impressa no êmbolo da seringa. Isso equivale a 200 mcg de ivermectina por kg de peso corporal.

Apresentação: Seringa 6,42gr

Vet Gold

Indicação: O VET GOLD é um Suplemento Vitamínico indicado para Aves, Coelhos, Equinos, Asininos, Muares, Ovinos, Caprinos, Suínos, Cães e Gatos, em todos os casos em que seja necessária a suplementação de vitaminas A, D, E e do Complexo B, visando suprir parte das necessidades dos animais, proporcionando maciez e brilho aos pelos dos mamíferos e à plumagem das aves.

Composição: NÍVEIS DE GARANTIA POR kg DO PRODUTO:

Nicotinamida (mínimo)	10 g
Vitamina A (mínimo)	15.000.000 UI
Vitamina B1 (mínimo)	4.700 mg
Vitamina B2 (mínimo)	1.500 mg
Vitamina B6 (mínimo)	3.000 mg
Vitamina B12 (mínimo)	5.000 mcg
Vitamina D3 (mínimo)	4.800.000 UI
Vitamina E (mínimo)	3.000 UI

Modo de uso: Misturar VET GOLD na água, leite ou alimento, ou aplicar diretamente na boca do animal através de uma seringa (sem agulha) ou uma colher, diariamente de acordo com as orientações abaixo, observando o porte do animal: - EQUINOS, ASININOS E MUARES – Filhotes e animais em crescimento: administrar 4 mL (80 gotas) para cada 100 kg de peso corpóreo ao dia por animal; Animais de trabalho e passeio: administrar 2 mL (40 gotas) para cada 100 kg de peso corpóreo ao dia por animal; Fêmeas em lactação e reprodutores: administrar 2,5 mL (50 gotas) para cada kg de peso corpóreo ao dia por animal.
- OVINOS E CAPRINOS – Animais em crescimento, recria e fêmeas em descanso: administrar 1,5 mL (30 gotas) para cada 10 kg de peso corpóreo ao dia por animal; Fêmeas em lactação: administrar 2 mL (40 gotas) para cada 10 kg de peso corpóreo ao dia por animal. SUÍNOS – Animais em crescimento e engorda: administrar 1,5 mL (30 gotas) para cada 20 kg de peso corpóreo ao dia por animal; Fêmeas em lactação e reprodutores: administrar 2 mL (40 gotas) para cada 20 kg de peso corpóreo ao dia por animal.

Apresentação: Embalagens de 20mL e 50mL

Cevamix

Indicação: O CEVAMIX é um Suplemento Mineral e Vitamínico para ser misturado ao alimento, indicado para todos os animais domésticos, visando auxiliar no crescimento, engorda e embelezamento dos animais.

Composição: NÍVEIS DE GARANTIA por kg do produto:
Cálcio (Mínimo): .....272 g
Cálcio (Máximo): .....299 g
Flúor (Máximo): .....774 mg
Fosforo (Mínimo): .....77 g
Nicotinamida (Mínimo): .....590 mg
Selênio (Mínimo): .....15 mg
Vitamina B1 (Mínimo): .....724 mg
Vitamina B2 (Mínimo): .....48 mg
Vitamina B6 (Mínimo): .....24 mg

Modo de uso: Misturar CEVAMIX ao alimento e administrar aos animais nas seguintes dosagens: BOVINOS E BUBALINOS - FILHOTES E ANIMAIS EM CRESCIMENTO: 5 g para cada 20 kg de peso corpóreo por animal ao dia. ANIMAIS ADULTOS E REPRODUTORES: 20 g para cada 100 kg de peso corpóreo por animal ao dia. FÊMEAS EM LACTAÇÃO: 25 g para cada 100 kg de peso corpóreo por animal ao dia. EQUINOS, ASININOS E MUARES - FILHOTES E ANIMAIS EM CRESCIMENTO: 5 g para cada 20 kg de peso corpóreo por animal ao dia. ANIMAIS DE TRABALHO E PASSEIO: 25 g para cada 100 kg de peso corpóreo por animal ao dia. FÊMEAS EM LACTAÇÃO E REPRODUTORES: 30 g para cada 100 kg de peso corporal por animal ao dia. OVINOS E CAPRINOS - ANIMAIS QUE NÃO ESTÃO EM LACTAÇÃO: 1 g para cada kg de peso corpóreo por animal ao dia. FÊMEAS EM LACTAÇÃO: 1,5 g para cada kg de peso corpóreo por animal ao dia.

Apresentação: Cartucho 200 g

Farinha de Calcio Vetbras

Indicação: A Farinha de Calcio Vetbras é um suplemento mineral indicado para aves, bovino, bubalinos, caprinos, coelhos, ovinos, suinos, equinos, asininos e muares para ser fornecido puro ou misturado ao alimento. a farinha de cálcio vetbras tem por objetivo fornecer aos animais calcio, fosforo, enxofre, iodo, magnesio e potassio, em todos os casos em que seja indicada a suplementação desses alimentos. tem por objetivo ainda, melhorar a qualidade da casca dos ovos.

Composição: Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (mínimo).....215g
Cálcio (máximo).....237g
Cloro (mínimo).....30g
Enxofre (mínimo).....42g
Flúor (máximo).....900mg
Fósforo (mínimo).....75g
Iodo (mínimo).....41mg
Magnésio (mínimo).....23g
Potássio (mínimo).....25g
Sódio (mínimo).....20g

Modo de uso: Administrar a farinha de calcio vetbras pura ou misturada ao alimento, seguindo as seguintes orientações: bovinos e bubalinos: Filhotes e animais em crescimento: 40 g para cada 100 kg de peso corpóreo por animal ao dia. Femeas em lactação: 50 g para cada 100 kg de peso córporeo por animal ao dia equinos, asininos e muares: Filhotes e animais em crescimento: 30 g para cada 100 kg de peso corpóreo por animal ao dia. Femeas em lactação e reprodutores: 40 g para cada 100 kg de peso corpóreo por animal ao dia. ovinos e caprinos: Animais jovens, em recria e fêmeas em descanso: 5 g para cada 10 kg de peso corpóreo por animal ao dia. Femeas em lactação: 7 g para cada 100 kg de peso corpóreo por animal ao dia. suinos: Animais em crescimento e engorda: 10 g para cada 10 kg de peso corpóreo por animal ao dia. Femeas em lactação e reprodutores: 15 g para cada 10 kg de peso corpóreo por animal ao dia.

Apresentação: Embalagem de 200g

Natu Verm Pó

Indicação: Indicado no combate de vermes nematódeos (ovos, larvas e adultos) de aves, suínos, ovinos, caprinos, bovinos e equinos, e no combate de vermes cestódeos (ovos, larvas e adultos) de aves, tais como AVES - Nematódeos: *Ascaridia galli, Heterakis gallinarum e Oxixpirura mansoni;* Cestódeos (ovos, larvas e adultos): *Amoebotaenia sphenoides, Davainea proglottina e Raillietina sp..* SUÍNOS, OVINOS, CAPRINOS, BOVINOS E EQUINOS - Nematódeos (pulmonares e gastrointestinais): *Ascaris suum, Bunostomun sp., Cooperia sp., Haemonchus sp., Hystrongylus sp., Metastrongylus sp., Oesophagostomun sp., Ostertagia sp., Oxiuris equi, Strongyloides sp. e Trichostrongylus sp..*

Composição: Cada 100g contém:
Fembendazol 2,0 g
Excipiente q.s.p. 100,0 g

Apresentação:
Display contendo 50 saches 20g
Display contendo 25 saches 20g

Modo de uso: Administrar por via oral, misturado à ração ou à água, de acordo com a posologia indicada, nas seguintes dosagens de acordo com a espécie:

ESPÉCIE	DOSAGEM
Aves	20g (1 sachê de Natu Verm Pó) para cada 2kg de alimento, durante 3(três) dias seguidos.
Suínos, caprinos e ovinos	20g (1 sachê de Natu Verm Pó) para cada 80kg de peso vivo, em dose única.
Bovinos	20g (1 sachê de Natu Verm Pó) para cada 80kg de peso vivo, em dose única.
Equinos	20g (1 sachê de Natu Verm Pó) para cada 54kg de peso vivo, em dose única.

Suinvet

Indicação: O SUINVET é um Suplemento Mineral, Vitamínico e de Aminoácidos, destinado a assegurar uma suplementação balanceada ao alimento dos suínos nas diversas fases de produção, favorecendo o melhor aproveitamento dos alimentos.

Modo de uso: Administrar o SUINVET, por via oral, misturado ao alimento (ração), da seguinte forma.
LEITÕES EM CRESCIMENTO, FÊMEAS EM GESTAÇÃO, LACTAÇÃO E REPRODUTORES: Misturar 1,5 kg do SUINVET EM 100 kg de alimento (ração), fornecer diariamente e à vontade para leitões em crescimento e diariamente para fêmeas em gestação, lactação e machos reprodutores.
SUÍNOS EM ENGORDA: Misturar 1,0 kg do SUINVET em 100 kg de alimento (ração), e fornecer à vontade e diariamente aos animais

Apresentação: Saco plástico contendo 1 kg (caixa de papelão contendo 12 unidades).

Composição: NÍVEIS DE GARANTIA por kg do produto:
Ácido Fólico (Mínimo).....7 mg
Ácido Pantotênico (Mínimo).....2500 mg
Cálcio (Mínimo).....192 g
Cálcio (Máximo).....228 g
Cobalto (Mínimo).....95 mg
Cobre (Mínimo).....220 mg
Colina (Mínimo).....5000 mg
Ferro (Mínimo).....12 g
Iodo (Mínimo).....35 mg
Manganês (Mínimo).....800 mg
Metionina (Mínimo).....10 g
Niacina (Mínimo).....3000 mg
Selênio (Mínimo).....15 mg
Vitamina A (Mínimo).....500000 UI
Vitamina B1 (Mínimo).....1200 mg
Vitamina B2 (Mínimo).....2000 mg
Vitamina B6 (Mínimo).....1300 mg
Vitamina D (Mínimo).....100000 UI
Vitamina k3 (Mínimo).....600 mg
Zinco (Mínimo).....7000 mg

Vita A

Indicação: O VITA A é um Suplemento Vitamínico, composto por Vitamina A e Vitamina D, indicado para ser adicionado ao alimento, leite ou à água de bebida, para todos os casos em que seja necessária a suplementação das Vitaminas A e D. Auxilia o animal à melhora de suas mais variadas funções

Composição:
Vitamina A (Mínimo) 8.000.000 UI
Vitamina D3 (Mínimo) 1.000.000 UI

Modo de uso: Diluir o VITA A na água de bebida, leite ou alimento, diariamente, de acordo com as orientações abaixo, observando o porte do animal: **AVES:** PINTOS DE CORTE OU POSTURA ATÉ 30 DIAS, CRESCIMENTO E POSTURA: diluir 1 mL para cada litro de água de bebida, ou kg de alimento; TERMINAÇÃO (FRANGOS): diluir 0,5 mL para cada litro de água de bebida, ou kg de alimento; AVES DE PEQUENO PORTE: diluir 3 gotas num bebedouro de 50 mL; AVESTRUZES (FILHOTES E ADULTOS): diluir 1 mL para cada litro de água de bebida. CÃES: ADULTOS (MANUTENÇÃO): Administrar 1 gota para cada 3 kg de peso corporal ao dia por animal; FILHOTES, CRESCIMENTO, LACTAÇÃO E REPRODUÇÃO: Administrar 1 gota para cada kg de peso corporal por animal. **GATOS:** ANIMAIS ATÉ 1 kg: Administrar 0,5 mL por kg de alimento por animal; ANIMAIS ADULTOS (MANUTENÇÃO): administrar 1 mL para cada 2 kg de alimento por animal. **COELHOS**: FILHOTES E EM CRESCIMENTO ATÉ 500 G DE PESO CORPORAL: administrar 2 gotas por animal. FÊMEAS EM LACTAÇÃO E ADULTOS: administrar 5 gotas por animal. **EQUINOS, ASININOS E MUARES:** Animais em qualquer fase da vida, administrar 0,5 mL para cada 150 kg de peso corporal por animal. OVINOS E CAPRINOS: Administrar 0,5 mL para cada 2 kg de alimento, em qualquer fase da vida dos animais. SUÍNOS: INICIAL: Administrar 1,0 mL para cada kg de alimento; CRESCIMENTO, TERMINAÇÃO E REPRODUÇÃO: Administrar 0,5 mL para cada kg de alimento. OBS.: Trocar a água dos bebedouros para aves a cada 12 horas, outras espécies a cada 8 horas e o leite, a cada 4 horas

Apresentação: Frasco contém 20ml

Ossiba

Osso de siba

Agora os psitacídeos (pássaros de bico curvo ou arredondado) contam com um forte aliado: Ossiba. Excelente fonte de cálcio, propicia a limpeza do bico e elimina o stress do animal. Com fácil aplicação na gaiola ou viveiro, Ossiba é apresentado em três versões:

Pequeno (10g) - para pássaros de pequeno porte, como canários, pássaros preto, viras, sabiás e semelhantes.

Médio (18g) - para pássaros de médio porte, como periquitos australianos, calopsitas, agapornis e semelhantes.

Grande (40g) - para pássaro de grande porte, como papagaios, ararinhas, cacatuas e semelhantes.
Também pode ser aplicados em viveiros com diversas espécies.

40g

18g

10g

MALTA®
UTILIDADES DOMÉSTICAS

Descascador Laranja



Multitec

Pluviômetro e Mini Balança

Pluviômetro
Modelo Padrão
- Cód. 7301
- Cor: Transparente
- Capacidade: 150mm
- Produzido em Poliestireno
- Embalagem: caixa 40 peças

Mini Balança
Modelo Padrão
Cód. 7317
Cor: Verde/Transparente
Capacidade 125gr.
Embalagem de Transp.: Cx. 12 Peças
Produzido em Poliestireno
Prática e fácil de usar

Biotron Açúcar de Uva

Indicação: Deve ser utilizado como fonte de energia para os pássaros, no período de stress como campeonatos, torneios ou em quedas e/ou elevação abrupta de temperatura. É especialmente indicado para filhotes e animais debilitados.

Composição: Dextrose

Modo de Uso: Usar 5 colheres cheias para cada 1 litro de água, aumentar a dose para mais 2 colheres cheias para animais doentes e debilitados.

Apresentação: Embalagem 500g

Biotron CC 2030 Premium

Indicação: Indicação para equilibrio da flora intestinal dos pássaros. Um produto especialmente formulado para aves no início de sua vida, dando-lhes condições de desenvolver todo seu potencial genético. INSETO DE PIGMENTOS.

Composição: Milho Branco Laminado*, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*, Ovo em Pó Integral, Óleo de Soja*, Sal Comum (Cloreto de Sódio), Ácido Cítrico Aromatizante, Palatabilizante, Aditivo Enzimático, Aditivo Probiótico, Aditivo Prebiótico, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítico, DL-Metionina, L-Lisina, L-Carnitina, Cloreto de Colina, Zinco, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Niacina, Ácido Fólico, Biotina, Pantatenato de Cálcio, Vitamina C, Etoxiquim, B.H.A. e Caulim.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, seco ou adicionando água até atingir o ponto de umidade ideal para seus pássaros, não precisa adicionar ovo. Caso utilize úmido, trocar diariamente, retirar as sobras e limpar os comedouros.

Apresentação: Embalagem 1kg e 5kg

Biotron Bambito Mix

Indicação: Alimento para psitacídeos de pequeno porte, indicado para Calopsitas, Periquitos, Agapornis e Neophenas. Recomenda-se que o alimento Bambito Mix seja introduzido de maneira gradativa na dieta das aves, misturado aos alimentos utilizados costumeiramente, pois, toda mudança brusca na alimentação pode causar problemas como estresse e distúrbios digestivos. Assim consegue-se uma boa adaptação ao consumo do alimento, que pode substituir totalmente os alimentos utilizados tradicionalmente. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da dieta seja constituída pelo alimento Bambito Mix.

Composição: Milho Laminado*, Milho Moído*, Sorgo em Grãos, Aveia Descascada, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*, Óleo de Soja Refinado*, Semente de Girassol, Grão de Painço, Farelo de Arroz Integral, Aromatizante, Fosfato Bicálcico, Calcário Calcítico, Corante Amarelo Tartrazina, Corante Vermelho Ponceau, Corante Amarelo Crepúsculo, Corante Azul Indigotina Nº2, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Sulfato Ferroso, Tripicolinato de Cromo, Sulfato de Cobre, Proteinato de Cobre, Sulfato de Manganês, Óxido de Zinco, Proteinato de Zinco, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Selênio Levedura, Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Menadiona Bisulfito de Sódio (Vitamina K3), Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Piridoxina (Vitamina B6), Vitamina B12, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Biotina, DL-Metionina, Bacitracina de Zinco.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, puro ou misturado aos outros alimentos utilizados costumeiramente.

Apresentação: Embalagem 500g e 5kg

Biotron CC Albium

Indicação: Indicado para a alimentação manual de filhotes de pássaros em geral, podendo ser utilizado como fonte alimentar única ou suplementar. Uso proibido na alimentação de ruminantes.

Composição: Farinha de Milho*, Farelo de Soja*, Clara de Ovo em Pó, Ovo em Pó Integral, Ácido Cítrico, Aromatizante, Aditivo Enzimático, Óleo de Soja Refinado*, Probiótico, Prebiótico, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítico, DL-Metionina, L-Lisina, L-Carnitina, Cloreto de Colina, Proteinato de Cobre, Óxido de Zinco, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Tripicolinato de Cromo, Selênio Levedura, Proteinato de Zinco, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Ácido Fólico, B.H.A., Etoxiquim, Sorbato de Potássio, Caulim, Amido Modificado de Milho* e Corante Amarelo Tartrazina.

Modo de Uso: Utilizar uma parte de CC-Albium para três partes de água, preferencialmente morna (38ºCa39ºC), misturando-as de maneira que forme uma papa uniforme. Deve-se palpar o papo antes de cada alimentação. Ele deve estar vazio ou quase vazio entre as refeições, e deve estar completamente vazio uma vez por dia. Frequência de alimentação:
Aves de 1 a 5 dias de idade: Alimentar 6 a 10 vezes por dia.
Aves com os olhos fechados: Alimentar 4 a 6 vezes por dia.
Aves com os olhos abertos: Alimentar 3 a 4 vezes por dia.
Aves com as penas em crescimento: Alimentar 2 a 3 vezes por dia.

Apresentação: Embalagem 250g e 500g

Indicação: Indicado para alimentação manual de filhotes de pássaros em geral. podendo ser utilizado como fonte alimentar única ou suplementar. Uso proibido na alimentação de ruminantes.

Composição: Farinha de Milho*, Farelo de Soja*, Clara de Ovo em Pó, Ovo em Pó Integral, Ácido Cítrico, Aromatizante, Aditivo Enzimático, óleo de Soja Refinado*, Probiótico, Prebiótico, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítifcol DL-Metionina, L-Lisina, L-Carnitina, Cloreto de Colina, Proteinato de Cobre, óxido de Zinco, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Tricolinato de Cromo, Selênio Levedura, Proteinato de Zinco, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Ácido Fólico, B.H.A, Etoxiquim, Sorbato de Potássio, Caulim, Amido Modificado de Milho* e Corante Amarelo Tartrazina.

Modo de Uso: Utilizar uma parte de CC-Albium para três partes de água, preferencialmente morna (38ºC a 39ºC), misturando-as de maneira que forme uma papa uniforme. Deve-se palpar o papo antes de cada alimentação. Ele deve estar vazio ou quase vazio entre as refeições, e deve estar completamente vazio uma vez por dia.

Apresentação: Embalagem 250g, 500g e 5kg

Biotron CC 2030 Amarela

Indicação: E verde, e demais pássaros granívoros que fixem a cor amarelo. Um produto especialmente formulado para aves no início de sua vida, dando-lhes condições de desenvolver todo seu potencial genético.

Composição: Milho Branco Laminado*, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*, Ovo em Pó Integral, Sal Comum (Cloreto de Sódio), Gordura Animal, Óleo de Soja*, Ácido Cítrico, Aromatizante, Aditivo Enzimático, Probiótico, Luteina, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítico, DL-Metionina, L-Lisina, Cloreto de Colina, Proteinato de Cobre, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Óxido de Zinco, Tripicolinato de Cromo, Selênio Levedura, Proteinato de Zinco, Molibidato de Sódio, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Niacina, Ácido Fólico, Biotina, Pantotenato de Cálcio, Vitamina C, Etoxiquim, B.H.A. e Caulim.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, seco ou adicionando água até atingir o ponto de umidade ideal para seus pássaros, não precisa adicionar ovo. Caso utilize úmido, trocar diariamente, retirar as sobras e limpar os comedouros.

Apresentação: Embalagem 1Kg

Biotron CC 2030 Vermelha

Indicação: Canários com fator para coloração vermelha e demais pássaros granívoros que fixem a cor vermelha. Um produto especialmente formulado para aves no início de sua vida, dando-lhes condições de desenvolver todo seu potencial genético.

Composição: Milho Branco*, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*, Ovo em Pó Integral, Semente de Niger, Óleo de Soja*, Gordura Animal, Cantaxantina, Sal Comum (Cloreto de Sódio), Ácido Cítrico, Aromatizante, Aditivo Enzimático, Probiótico, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítico, DL-Metionina, L-Lisina, L-Carnitina, Cloreto de Colina, Proteinato de Cobre, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Óxido de Zinco, Tripicolinato de Cromo, Selênio Levedura, Proteinato de Zinco, Molibidato de Sódio, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Niacina, Ácido Fólico, Biotina, Pantotenato de Cálcio, Vitamina C, Etoxiquim, B.H.A. e Caulim.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, seco ou adicionando água até atingir o ponto de umidade ideal para seus pássaros, não precisa adicionar ovo. Caso utilize úmido, trocar diariamente, retirar as sobras e limpar os comedouros.

Apresentação: Embalagem 1kg

Biotron Coleiro

Indicação: Alimento recomendado para, coleirinha-papa-capim. Recomenda-se que o alimento Biotron Coleiro, seja fornecido de maneira gradativa, misturado às sementes ou aos alimentos utilizados costumeiramente, pois, toda mudança brusca na alimentação pode causar problemas como estresse e distúrbios digestivos. Assim consegue-se uma boa adaptação ao consumo do alimento, que pode substituir totalmente as sementes ou outros alimentos utilizados. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da alimentação fornecida aos pássaros seja constituída pelo Alimento Biotron Coleiro.

Composição: Milho Integral Moído*, Farinha de Arroz, Levedura de Cana, Farelo de Soja*, Espirulina, Semente de Linhaça, Gordura Animal, Lecitina de Soja*, Aromatizante, Fosfato Bicálcico, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Luteína, Inulina, DL-Metionina, L-Lisina, L-Carnitina, Cloreto de Colina, Cobre Quelatado, Selênio Quelatado, Zinco Quelatado, Manganês Quelatado, Iodato de Cálcio, Cromo Quelatado, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Biotina, Ácido Fólico, Pantotenato de Cálcio, Niacina, Vitamina C, Antioxidante (Ácido Ortofosfórico, B. H. A., Etoxiquim, Ácido Cítrico).

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, puro ou misturado com outros alimentos utilizados costumeiramente.

Apresentação: Embalagem 400g

Biotron Frutas & Cereais

Indicação: Alimento para pássaros de pequeno e médio porte. Sabiá, Pássaro-Preto, Trinca-Ferro, Tico-Tico, Pixoxó, Cardeal, Galo Campina e demais pássaros frugívoros e granívoros.

Composição: Milho*, Farelo de Arroz Integral, Farelo de Soja*, Soja Integral Extrusada*, Dextrina, Aroma de Banana, Corante Amarelo Tartrazina, Corante Amarelo Crepúsculo, Fosfato Monobicalcico, Farinha de Conchas de Ostras, Cloreto de Sódio (Sal Comum), DL-Metionina, Sulfato de Cobre, Pantotenato de Cálcio, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Vitamina B2, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina B6, Vitamina A, Calcário Calcítico, Niacina, Vitamina K3, Biotina, Ácido Fólico, Óxido de Manganês, L-Lisina, Cloreto de Colina, Iodato de Cálcio, Bacitracina de Zinco.

Modo de Uso: Pode ser utilizado como fonte alimentar única, ou misturado com os demais alimentos utilizados costumeiramente. Recomenda-se que no início da utilização deste alimento, seja feita uma adaptação, substituindo gradativamente a dieta utilizada.

Apresentação: Embalagem 500g e 5kg

CC Mineral Mix

Indicação: Este produto não atende as exigências nutricionais dos pássaros e não possui ação terapêutica.
Apenas atua com ação mecânica na moela ajudando na quebra das partículas dos alimentos ingeridos.
Recomenda-se o fornecimento de uma alimentação balanceada com níveis adequados de proteínas, energia, minerais e vitaminas, diariamente aos pássaros.

Composição: Carbonato de cálcio, zeolita, calcita, farinha de conchas de ostra, areia lavada e diatomita.

Modo de Uso: Pode ser fornecido sob livre acesso para os pássaros, durante toda sua vida.

Apresentação: Embalagem 500g e 1,5Kg

Biotron Saporito Insetos

Indicação: Alimento para Trinca-ferro e outros pássaros insetívoros. Recomenda-se que o alimento Saporito Inseto seja fornecido de maneira gradativa, misturada às sementes ou aos alimentos utilizados costumeiramente, pois, toda mudança brusca na alimentação pode causar problemas como estresse e distúrbios digestivos. Assim consegue-se uma boa adaptação ao consumo da ração, que pode substituir totalmente as sementes ou outros alimentos utilizados. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da alimentação fornecidas aos pássaros seja constituída pelo Alimento Saporito Insetos. Produto especialmente formulado para pássaros em atividade de competição.

Composição: Aveia Grão, Levedura de Cana, Camarão Aviú, Tenebrio Molitor, Sorgo em Grãos, Farelo de Solja**, Gordura Animal, Semente de Cartamo, Grão de Alpiste, Aromatizante, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Luteína, Inulina, DL-Metionina, L-Lisina, L-Carnitina, Cloreto de Colina, Cobre Orgânico, Selênio Orgânico, Zinco Orgânico, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Cromo Quelatado, Selênio Quelatado, Zinco Quelatado, Oxido de Zinco, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Biotina, Ácido Fólico, Pantotenato de Cálcio, Niacina, Vitamina C Revestida, Antioxidantes.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, puro ou misturando-se como outros alimentos utilizados costumeiramente.

Apresentação: Embalagem 400g

Biotron Saporito Mamão

Indicação: Alimento completo para pássaros, enriquecido com vitaminas, aminoácidos e sais minerais. Desenvolvido com proteínas de alto valor biológico para pássaros de médio porte, tais como Sabiá, Pássaro-Preto, Trinca-Ferro e demais pássaros granívoros deste porte. Recomenda-se que o alimento Saporito Mamão seja introduzido na dieta dos pássaros de maneira gradativa, misturando-o aos alimentos utilizados costumeiramente. Pois, toda mudança brusca na alimentação pode causar problemas como estresse e distúrbios digestivos. Desta forma consegue-se uma boa adaptação ao alimento, podendo substituir totalmente os demais alimentos. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da alimentação dos pássaros seja constituída por este alimento.

Composição: Milho*, Soja integral extrusada**, Farelo de soja**, Sal comum (cloreto de sódio), Aromatizante, Levedura de Cana, Corante Amarelo Crepúsculo, Óleo de soja refinado, Probiótico, Fosfato Bicalcio, Calcário Calcítico, DL-Metionina, L-Lisina, Cloreto de Colina, Sulfato de Cobre, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Cromo quelatado, Selênio quelatado, Zinco quelatado, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Biotina, Ácido Fólico, Pantotenato de Cálcio, Niacina, Vitamina C, Etoxiquim, Bioxido de Silício, B.H.A.

Modo de Uso: Pode ser fornecida a vontade, pura ou misturada aos outros alimentos utilizados costumeiramente.

Apresentação: Embalagem 400g e 2,5kg

Biotron Saporito Mix

Indicação: Alimento para Trinca-Ferro. Recomenda-se que o alimento Saporito Mix seja fornecido de maneira gradativa, misturado ás sementes ou aos alimentos utilizados costumeiramente, pois, toda mudança brusca na alimentação pode causar problemas como estresse e distúrbios digestivos. Assim consegue-se uma boa adaptação ao consumo do alimento, que pode substituir totalmente as sementes ou outros alimentos utilizados. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da alimentação fornecida aos Trinca-Ferros seja constituído pelo alimento Saporito Mix.

Composição: Frutas Desidratadas, Milho Laminado*, Sorgo em Grãos, Aveia Descascada, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*, Óleo de Soja Refinado*, Semente de Girassol, Grão de Alpiste, Cartamo, Farelo de Arroz Integral, Trigo Sarraceno, Aromatizante, Fosfato Bicálcico, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Corante Amarelo, Tartrazina, Corante Vermelho Ponceau, Corante Amarelo Crespúsculo, Corante Azul Indigotina NO 2, Sulfato Ferroso, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês, Óxido de Zinco, Iodato de Cálcio, Selenito de sódio, Vitamina A, Vitamina D, Menadiona Bisulfito de Sódio (Vitamina K3), Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Pirodoxina (Vitamina B6), Vitamina B12, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Biotina, DL-Metionina, Aditivo Antioxidante.

Modo de Uso: Pode ser fornecida a vontade, pura ou misturada aos outros alimentos utilizados costumeiramente.

Apresentação: Embalagem 500g e 5kg

Biotron Saporito Mix Pimenta

Indicação: Alimento para Trinca-Ferro. Recomenda-se que o alimento Saporito Mix Pimenta seja fornecido de maneira gradativa, misturado às sementes ou aos alimentos utilizados costumeiramente, pois, toda mudança brusca na alimentação pode causar problemas como estresse e distúrbios digestivos. Assim consegue-se uma boa adaptação ao consumo do alimento, que pode substituir totalmente as sementes ou outros alimentos utilizados. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da alimentação fornecida aos Trinca-Ferros seja constituída pelo alimento Saporito Mix Pimenta.

Composição: Milho Laminado*, Sorgo em Grãos, Aveia Descascada, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*,Óleo de Soja Refinado*, Semente de Girassol, Semente de Cartamo, Grão de Alpiste, Pimenta Malagueta Desidratada, Farelo de Arroz Integral, Aromatizante, Óleo de Pimenta, Fosfato Bicálcico, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Corante Amarelo Tartrazina, Corante Vermelho Ponceau, Corante Amarelo Crepusculo, Corante Azul Indigotina N2, Sulfato Ferroso, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês, Óxido de Zinco, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Vitamina A, Vitamina D, Viamina E, Menadiona Bisulfito de Sódio (Vitamina K3), Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Piridoxina (Vitamina B6), Vitamina B12, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Biotina, DL-Metionina e Bacitracina de Zinco.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, como fonte alimentar única, ou misturado aos outros alimentos utilizados costumeiramente.

Apresentação: Embalagem 500g e 5kg

Biotron Nativos

Indicação: Alimento extrusado com proteínas de alto valor biológico para Sabiá, Pássaro-Preto, Trinca-Ferro e demais pássaros granívoros deste porte. Recomenda-se que o alimento Nativos seja introduzido na dieta dos pássaros de maneira gradativa, misturando-o aos alimentos utilizados costumeiramente. Pois, toda mudança brusca na alimentação pode causar problemas como estresse e distúrbios digestivos. Desta forma, consegue-se uma boa adaptação ao alimento, podendo substituir totalmente os demais alimentos. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da alimentação dos pássaros seja constituída por este alimento.

Composição: Milho*, Levedura de Cana, Soja Integral Extrusada**, Farelo de Soja**, óleo de Soja Refinado*, Sal Comum(Cloreto de Sódio), Aromatizante, Probiótico, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítifcol DL-Metionina, L-Lisina, Cloreto de Colina, Sulfato de Cobre, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Cromo Quelatado, , Selênio Quelatado, Zinco Quelatado, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Niacina, Ácido Fólico, Biotina, Pantotenato de Cálcio, Vitamina C, Etoxiquim, B.H.A. e Bioxido de Silício.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, puro ou misturado aos outros alimentos.

Apresentação: Embalagem 500g e 5kg

CC Fruta Mix

Indicação: Papa de frutas para pássaros frugívoros. Pombas de Frutas, Trinca-Ferro, Sabiás, Saíras, Tangaras, Neophemas, Ring Neck, Roselas e demais frugívoros.

Composição: Frutas Desidratadas, Milho*, Aveia, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*, Óleo de Soja Refinado*, Gérmen de Milho*, Clara de Ovo em Pó, Aromatizante, Palatabilizante, Probiótico, Fosfato Bicálcico, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum),Sulfato Ferroso, Proteinato de Cobre, Proteinato de Zinco, Tripicolinato de Cromo,Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selênio Levedura, Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Menadiona Bisulfito de Sódio (Vitamina K3), Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Piridoxina (Vitamina B6), Vitamina B12, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Biotina, DL-Metionina, Sorbato de Potássio, Corante Amarelo Tartrazina, Corante Vermelho Ponceau, Corante Amarelo Crepúsculo e Corante Azul Indigotina Nº2.

Modo de Uso: Pode ser fornecida à vontade, como forma de alimentação suplementar para os pássaros.

Apresentação: Embalagem 500g e 5kg

Fortall Papa de Ovo

Indicação: Alimento Completo para pássaros, enriquecido com vitaminas, aminoácidos e sais minerais. Desenvolvido com proteínas de alto valor biológico para pássaros de pequeno porte, tais como: Canários, Curiós, Bicudos, Azulões, Pintassilgos, Coleiros, etc., na fase de reprodução, especialmente para longos períodos de cria. Diminui o desgaste das fêmeas e melhora o desempenho reprodutivo dos machos. Recomenda-se que o Fortall seja introduzido na dieta dos pássaros gradativamente, misturando-o às sementes ou demais alimentos. Assim, evita-se o estresse pela mudança brusca na alimentação. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da dieta dos pássaros seja constituída pelo Fortall.

Composição: Milho*, Aveia Descascada, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*, Ovo em Pó Integral, Gérmen de Milho*, Gordura Animal, Clara de Ovo em Pó, Sal Comum (Cloreto de Sódio), Niger Grão, Ácido Cítrico, Corante Amarelo Tartrazina, Aromatizante, Aditivo Enzimático, Probiótico, Prebiótico, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítico, DL-Metionina, L-Lisina, Cloreto de Colina, Proteinato de Cobre, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Óxido de Zinco, Tripicolinato de Cromo, Selênio Levedura, Proteinato de Zinco, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Niacina, Ácido Fólico, Biotina, Pantotenato de Cálcio, Vitamina C, Etoxiquim, B.H.A. e Caulim.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, puro ou misturado aos outros alimentos. Se fornecido úmido, as sobras devem ser descartadas e os comedouros limpos diariamente.

Apresentação: Embalagem 500g, 1kg e 5kg

Bambito Extrusado

Indicação: Bambito Extrusado da Biotron é uma ração extrusada completa para pássaros, enriquecida com vitaminas, aminoácidos e sais minerais. Desenvolvida com proteínas de alto valor biológico para psitacídeos de médio e pequeno porte, tais como Ringneck, Rosela, Red Humped, Calopsita, Periquitos, Agapornis, Catarinas e demais psitacídeos deste porte. Recomenda-se que o alimento Bambito Extrusada Biotron seja introduzido na dieta dos pássaros de maneira gradativa, misturando-o aos alimentos utilizados costumeiramente. Pois, toda mudança brusca na alimentação pode causar problemas como estresse e distúrbios digestivos. Desta forma consegue-se uma boa adaptação ao alimento, podendo substituir totalmente os demais alimentos. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da alimentação dos pássaros seja constituída por este alimento.

Composição: Milho*, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Semente de Linhaça, Probiótico, Prebiótico, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítico, Óleo de Dendê, DL-Metionina, L-Lisina, Cloreto de Colina, Proteinato de Cobre, Óxido de Zinco, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Tripicolinato de Cromo, Selênio Levedura, Proteinato de Zinco, Molibidato de Sódio, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12 ,Biotina, Ácido Fólico, Pantotenato de Cálcio, Niacina, Vitamina C, Etoxiquim, Caulim e B.H.A.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, puro ou misturado aos outros alimentos utilizados costumeiramente.

Apresentação: Embalagem 500g e 5kg

CC Parrots

Indicação: Alimento para psitacídeos (Agapornis, Calopsita, Neophemas, Ring-Neck, Periquitos e demais psitacídeos). ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, AMINOÁCIDOS E SAIS MINERAIS.
Recomenda-se que o alimento CC-Parrots seja fornecido de maneira gradativa, misturado às sementes ou aos alimentos utilizados costumeiramente, pois toda mudança brusca na alimentação pode causar problemas como estresse e distúrbios digestivos. Assim, consegue-se uma boa adaptação ao consumo do alimento, que pode substituir totalmente as sementes ou outros alimentos utilizados. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da alimentação fornecida aos pássaros seja constituída pelo alimento CC-Parrots.

Composição: Milho*, Aveia Floculada, Soja Integral Extrusada**, Farelo de Soja**, Óleo de Soja Refinado**, Aromatizante, Fosfato Bicálcico, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Sulfato Ferroso, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês, Óxido de Zinco, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Menadiona Bisulfito de Sódio, Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Piridoxina (Vitamina B6), Vitamina B12, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Biotina e DL-Metionina.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, puro ou misturado com outros alimentos utilizados costumeiramente.

Apresentação: Embalagem 5Kg

Curió, Bicudo e Azulão

Indicação: Alimento completo para pássaros, enriquecido com vitaminas, aminoácidos e sais minerais.
Desenvolvido com proteínas de alto valor biológico, enzimas, probióticos e prebiótico, especialmente para pássaros de médio porte, tais como: Curiós, Bicudos e Azulões. Recomenda-se que o Alimento Biotron Curió, Bicudo e Azulão seja introduzido na dieta dos pássaros de maneira gradativa, misturando- o às sementes ou demais alimentos utilizados costumeiramente. Assim, evita-se o estresse pela mudança brusca da alimentação. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da alimentação dos pássaros seja constituída pelo Alimento Biotron Curió, Bicudo e Azulão.

Composição: Milho*, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*, Óleo de Soja Refinado*, Sal Comum(Cloreto de Sódio), Aromatizante, Aditivo Probiótico, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítico, Corante Amarelo Tartrazina, Corante Vermelho Ponceau, Corante Amarelo Crupusculo, Corante Azul Indigotina N2, DL-Metionina, L-Lisina, Cloreto de Colina, Proteinato de Cobre, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Óxido de Zinco, Tripicolinato de Cromo, Selênio Levedura, Proteinato de Zinco, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Niacina, Ácido Fólico, Biotina, Pantotenato de Cálcio, Vitamina C, Caulim, Etoxiquim e Hidróxido de Anizola Butilato (B.H.A.).

Modo de Uso: Pode ser utilizado puro, à vontade ou misturado com os demais alimentos utilizados costumeiramente.

Apresentação: Embalagem 500g e 5kg

Tico-Tico e Canário da Terra

Indicação: Alimento completo para pássaros, enriquecido com vitaminas, aminoácidos e sais minerais.
Desenvolvido com proteínas de alto valor biológico, enzimas, probióticos, prébióticos especialmente para pássaros de pequeno porte, tais como: Canários da Terra, Tico-Tico, Coleiros, etc. Recomenda-se que BIOTRON TICO-TICO/CANÁRIO DA TERRA seja introduzido na dieta dos pássaros gradativamente, misturado às sementes ou demais alimentos. Assim, evita-se o estresse pela mudança brusca da alimentação. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-se que pelo menos 50% da dieta dos pássaros seja constituída de BIOTRON TICO-TICO/CANÁRIO DA TERRA.

Composição: Milho Extruzado*, Quirera de Milho*, Soja Integral Extrusada*, Farelo de Soja*, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Ácido Cítrico, Aromatizante, Probiótico, Gordura Animal, Fosfato Bicalcico, Calcário Calcítico, DL-Metionina, L-Lisina, L-Carnitina, Cloreto de Colina, Proteinato de Cobre, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Óxido de Zinco, Tripicolinato de Cromo, Selênio Levedura, Proteinato de Zinco, Molibidato de Sódio, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Niacina, Ácido Fólico, Biotina, Pantotenato de Cálcio, Vitamina C, Etoxiquim, B.H.A. e Caulim.

Modo de Uso: Pode ser fornecido puro, à vontade, ou misturado com os demais alimentos utilizados costumeiramente.

Apresentação: Embalagem 500g

Papagaio Mix

Indicação: Alimento para Papagaios e demais psitacídeos de grande e médio porte.

Composição: Milho*, Soja Integral Extrusada*,Farelo de Soja*,Óleo de Soja Refinado*, Aromatizante, Palatabilizante, Corante Amarelo Tartrazina, Corante Vermelho Ponceau, Corante Azul Indigotina N2, Fosfato Bicálcico, Calcário Calcítico, Cloretode Sódio (Sal Comum), Sulfato Ferroso, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês, Óxidode Zinco, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Menadiona Bisulfito de Sódio (Vitamina K3), Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Piridoxina (Vitamina B6), Vitamina B12, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Biotina, DL-Metionina, Aditivo Enzimático e Bacitracina de Zinco.

Modo de Uso: Pode ser fornecido à vontade, como fonte alimentar única, ou misturado aos outros alimentos utilizados costumeiramente.Recomenda-se que este alimento seja introduzido de maneira gradativa na alimentação das aves, fazendo uma adaptação no início do uso. Para se obter um bom equilíbrio nutricional, recomenda-seque pelo menos 50% da dieta das aves seja constituída pelo alimento Papagaio Mix.

Apresentação: Embalagem 500g e 5kg

Sementes

CÓDIGO	PRODUTO	CÓDIGO	PRODUTO
1597826	ALPISTE	1597836	NABÃO PARA PÁSSARO
1597827	ALPISTE CANADENSE (SOB CONSULTA)	1597837	NIGER PARA PÁSSARO
1597828	ARROZ AGULHA	1597838	PAINÇO BRANCO
1597829	ARROZ CATETO	1597839	PAINÇO COMUM
15976602	ARROZ PACHOLINHA	1597840	PAINÇO MILHETO IMPORTADO
1597830	AVEIA COM CASCA	15974399	PAINÇO PORT AGROLUZ 100GR
1597831	AVEIA SEM CASCA	1597841	PAINÇO PORT AGROLUZ KG
1597832	COLZA PARA PÁSSARO	1597842	PAINÇO PRETO
15975623	GIRASSOL CARTAMO	1597843	PAINÇO VERDE ESPECIAL
1597834	GIRASSOL GRAÚDO	1597845	PAINÇO VERMELHO
1597833	GIRASSOL MIÚDO 30	1597846	SENHA GRAÚDA
15972058	LINHAÇA		

NUTRICON
Nutrindo com carinho.

Alimentos para Peixes

Goldfish Color

O Goldfish Color é um alimento completo e extrusado, formulado especialmente para Kinguios (Goldfishes). Sua formulação possui cantaxantina e spirulina que promovem o realce das cores vivas e brilhantes destes peixes. Diâmetro do alimento de 3,5mm. Alimente 2 a 3 vezes ao dia em quantidade suficiente para ser consumida em até 5 minutos.

PESO	EMBALAGEM
20g	Bandeja c/ 12 unid.
20g	Fardo c/ 20 unid.
30g	Bandeja c/ 12 unid.
30g	Fardo c/ 20 unid.

Nutribetta

Alimento microextrusado flutuante, desenvolvido especialmente para a nutrição de **Betta**, podendo ser utilizado também para outras espécies de **peixes de pequeno porte** e que precisam de um alimento pequeno devido menor tamanho da boca. Formulado à base de ingredientes de alta qualidade e digestibilidade, possui suplementação de aditivos nutricionais que estimulam o consumo e o realce das cores.

PESO	EMBALAGEM
5g	Fardo c/ 30 unid.
12g	Bandeja c/ 24 unid.

Nutriflakes

Alimento completo em flocos, indicado para todas as espécies de **peixes ornamentais de água doce,** em **fase** de **manutenção.** Ideal para aquários comunitários, com diversas espécies de peixes em um mesmo ambiente. Enriquecido com prebiótico, que estimula o crescimento e as atividades das bactérias benéficas no trato digestivo melhorando a absorção dos nutrientes e vitamina C.

PESO	EMBALAGEM
	Fardo c/ 30 unid.
	Saco plástico

Premiun Flakes

Alimento completo em flocos, indicado para todas as espécies de **peixes ornamentais tropicais,** em **fase** de **crescimento** ou **manutenção.** Ideal para aquários comunitários. Formulado à base de ingredientes de alta qualidade e digestibilidade. Possui suplementação de aditivo nutricional e cantaxantina, que estimula o realce das cores.

PESO	EMBALAGEM
12g	Bandeja c/ 12 unid.
50g	Bandeja c/ 6 unid.

Alimentos para Tartarugas

Repto

Alimento natural constituído por mini camarões desidratados. Rico em proteína e cálcio, essenciais na formação e fortalecimento da carapaça das tartarugas. Indicado como complemento protéico para **tartarugas**, **cágados** e **jabutis**.

PESO	EMBALAGEM
80g	Fardo c/ 20 unid.
315g	Bandeja c/ 6 unid.

Turtle

Alimento completo , extrusado em formato de atrativos sticks flutuantes para **tartarugas aquáticas**. Formulação isenta de corantes artificiais, à base de ingredientes de alta qualidade e digestibilidade. Enriquecido com prebiótico, levedura, spirulina, vitaminas e minerais, especialmente vitamina C, vitamina do complexo B e o cálcio, essenciais para o desenvolvimento da carapaça. Pode ser alternada com o alimento Turtle Mix.

PESO	EMBALAGEM
25g	Bandeja c/ 12 unid.
75g	Bandeja c/ 6 unid.
270g	Bandeja c/ 4 unid.

Bifinho de Frutas

Apresentação: Embalagem contendo 60g e 250g.

Mastigaveis de Couro

Mini Donuts

Mini Osso Nó

Mini Roll

Osso Defumado Femur

OSSO NATURAL DEFUMADO FEMUR

OSSO NATURAL DEFUMADO MINI FEMUR

Petisquinhos Frutas e Carne

PETISQUINHO OSSINHO FRUTAS 60G

OSSINHO CARNE 60G

Osso Nó

Osso de Couro Bovino
Osso 100% natural com alto valor protéico, de fácil digestão, produzido com raspa de couro bovino que limpa e fortalece os dentes, combate o mau-hálito, controla o tártaro. Promove também momentos de distração e entretenimento para os cães.

Osso Nó

Osso Nó

Tamanhos



Palito de Couro

Caixa Expositora

Palito Colorido Misto

Palito de Couro



Apresentação: Embalagem contendo 1kg.

Palitinho Natural

Palitinho Natural Dog 6mm

Apresentação: Embalagem contendo 500g.

Palitinho de Carne

Palito de Carne

Apresentação: Embalagem contendo 500g.

Snack Bone Carne

Apresentação: Embalagem contendo 500g.

Nó 3/4 c/ 2 unidades

Nó 5/6 c/ 1 unidade

Pequeno Porte

Mit Canário Mel

Mit Canário 500g	10 x 500g
Mit Canário	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de Pequeno Porte como Canários.

Composição:
Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, quirera de arroz, farinha de carne, farinha de visceras de aves, farinha de peixe, ovo desidratado, cloreto de sódio(sal comum), grão de nabão, semente de linhaça, grão de niger, grão de colza, aveia descascada, semente de alpiste, óleo de soja, aroma mel.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Super Vita Premium Amarela

Super Vita 200g	25 x 200g
Super Vita 500g	10 x 500g
Super Vita10kg	

Indicação do Produto:
Pássaros de Pequeno Porte como Canários.

Composição:
Grão de Nabão, semente de linhaça, grão de niger, grão de colza colorífico, sêmola de milho, óleo de soja, farelo de pão e aroma de caramelo.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.



Vita Águia Morango - Vermelha

Vita Águia 500g	10 x 500g
Vita Águia	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de Pequeno Porte como Canários.

Composição:
Grão de Nabão, semente de linhaça, grão de niger, grão de colza, açúcar, aveia, sêmola de milho, óleo de soja, farelo de pão, aroma de leite.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Indicação do Produto:
Pássaros de Pequeno Porte como Canários.

Composição:
Grão de nabão, semente de linhaça, grão de niger, grão de colza, açúcar, aveia, sêmola de milho, óleo de soja, farelo de pão e aroma leite.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Vita Branca - Leite

Vita Branca 500g	10 x 500g
Vita Branca	10kg

Vita Verde - Jiló

Vita Jiló 500g	10 x 500g
Vita Jiló	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de Pequeno Porte como Canários.

Composição:
Grão de nabão, semente de linhaça, grão de niger, grão de colza, açúcar, corante, sêmola de milho, óleo de soja, farelo de pão, aroma jiló.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Médio Porte

Sabiá Especial Oleosa com Frutas

Sabia Especial c/ Frutas 500g	10 x 500g
Sabia Especial c/ Frutas	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de médio porte como: Sabiá e Pássaro Preto.

Composição:
Amendoim moído, farelo de pão, gritz bolinha, óleo de soja, granulada, colorífico, frutas cristalizadas e aroma banana.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Granulada Banana

Granulada Banana 500g	10 x 500g
Granulada Banana	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia eTrinca Ferro (pixarro).

Composição:
Milho integral moído, farelo de amendoim, farelo de mandioca, casca de aveia moída, levedura seca de cana de açúcar, farelo de trigo, farelo de glútem de milho-60, farelo de arroz desengordurado, farelo de gérmen de milho, farelo de algodão, farinha de carne e ossos, calcário calcitico, farinha de ossos calcinados, caulim, cloreto de sódio (sal comum), ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, cloreto de colina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de potássio, sulfato de manganês, niacina, selenito de sódio, sulfato de zinco, antioxidante (BHT), óleo de soja, aroma de banana.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Granulada Ouro Plus

Granulada Ouro 500g	10 x 500g
Granulada Ouro	10kg

Indicação: Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia e Trinca Ferro (pixarro).

Composição: Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, óleo vegetal, gérmen de milho, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio, premix vitamina e aroma banana.

Apresentação: Frascos 20LServir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia eTrinca Ferro (pixarro).

Composição:
Milho integral moído, farelo de amendoim, farelo de mandioca, casca de aveia moída, levedura seca de cana de açúcar, farelo de trigo, farelo de glúten de milho-60, farelo de arroz desengordurado, farelo de gérmen de milho, farelo de algodão, farinha de carne e ossos, calcário calcítico, farinha de ossos calcinados, caulim, cloreto de sódio (sal comum), óleo de soja, grão de amendoim, sulfato de ferro, farelo de pão, gritz de milho, farelo de soja, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, cloreto de colina, sulfato de cobre, sulfato de zinco, iodato de potássio, sulfato de manganês, niacina, selenito de sódio, aroma de banana, antioxidante (BHT).

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Triturada Banana s/ Arroz

Triturada 500g	10 x 500g
Triturada	10kg

Triturada Banana c/ Arroz

Triturada 500g	10 x 500g
Triturada	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia eTrinca Ferro (pixarro).

Composição:
Milho integral moído, farelo de amendoim, farelo de mandioca, casca de aveia moída, levedura seca de cana de açúcar, farelo de trigo, farelo de glúten de milho-60, farelo de arroz desengordurado, farelo de gérmen de milho, farelo de algodão, farinha de carne e ossos, calcário calcítico, farinha de ossos calcinados, caulim, cloreto de sódio(sal comum), óleo de soja, grão de amendoim, arroz com casca, farelo de pão, gritz de milho, farelo de soja, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, cloreto de colina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de potássio, sulfato de manganês, niacina, selenito de sódio, sulfato de zinco, aroma de banana, antioxidante (BHT).

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Médio Porte

Triturada com Frutas

Triturada c/ Frutas 500g	10 x 500g
Triturada c/ Frutas	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia eTrinca Ferro (pixarro).

Composição:
Amendoim, farinha de carne, óleo, arroz, quirela, frutas, premix, vitam., calcário calcítico, farelo de pão, cloreto do sódio e aroma de banana.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Trinca Ferro (pixarro).

Composição:
Girassol, amendoim, cascalho de pão, arroz cateto, granulada, ervilha, óleo de soja, quirela de milho, pão extrusado, aroma banana.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Triturada Colors

Triturada Colors 500g	10 x 500g
Triturada Colors	10kg

Silvestre

Mit Curió Mel

Mit Curió 500g	10 x 500g
Mit Curió	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros Silvestres como Curió, Azulão e Bicudo.

Composição:
Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, quirera de arroz, farinha de carne, farinha de vísceras de aves, farinha de peixe, ovo desidratado, cloreto de sódio (sal comum), semente de alpiste, semente de painço, semente de painço verde, semente de painço preto, semente de painço português, grão de senha, Arroz com casca, óleo de soja, aroma mel.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Indicação do Produto:
Pássaros Silvestres como Coleiro, Azulão e Bicudo.

Composição:
Semente de painço verde, semente de painço preto, semente de painço português, grão de senha, óleo de soja, aroma mel.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Mit Coleiro Mel

Mit Coleiro 500g	10 x 500g
Mit Coleiro	10kg

Papagaio

Mit Papagaio c/ Frutas

Mit Papagaio 390g	10 x 390g
Mit Papagaio	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros Psitacídeos (Aves de Bico Torto) de Grande Porte como o Papagaio.

Composição:
Milho integral moído, farelo de amendoim, farelo de mandioca, casca de aveia moída, levedura seca de cana de açúcar, farelo de trigo, farelo de glúten de milho-60, farelo de arroz desengordurado, farelo de gérmen de milho, farelo de algodão, farinha de carne e ossos, calcário calcítico, farinha de ossos calcinados, caulim, cloreto de sódio (sal comum), farelo de pão, semente de girassol, aveia com casca, grão de sorgo, grão de ervilha, grão de soja, grão de amendoim, amendoim com casca, grão de milho, semente de girassol cártamo, frutas cristalizadas, grão de trigo mourisco, semente de abóbora, óleo de soja, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, cloreto de colina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de potássio, sulfato de manganês, niacina, selenito de sódio, sulfato de zinco, aroma de mamão, antioxidante (BHT).

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Exótico

Indicação do Produto:
Passaros Exóticos de Médio Porte como o Periquito.

Composição:
Semente de alpiste, semente de painço, semente de painço verde, semente de girassol, aveia descascada milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, quirera de arroz, farinha de carne, farinha de vísceras de aves, farinha de peixe, ovo desidratado, cloreto de sódio (sal comum), óleo de soja, aroma mel.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Mit Periquito Mel

Mit Periquito 500g	10 x 500g
Mit Periquito	10kg
Mit Periquito	25kg

Trinca Ferro

Trinca Ouro Max c/ Frutas Girassol Branco

Trinca Max Frutas 500g	10 x 500g
Trinca Max Frutas	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia e Trinca Ferro (pixarro).

Composição:
Milho integral, moído, farelo de soja, farelo de trigo, óleo vegetal, girassol, amendoim, gérmen de milho, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto do sódio, premix vitamínico, trigo, morisco, arroz cateto, cártamo, sorgo vermelho, sorgo branco, pão extrusado, frutas cristalizadas e aroma mamão.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia e Trinca Ferro (pixarro).

Composição:
Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, óleo vegetal, gérmen de milho, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio, premix vitamínico, aroma laranja, trigo morisco, cártamo, sorgo branco, pão extrusado e arroz cateto.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Trinca Ouro Plus Torneio

Trinca Ouro Plus 500g	10 x 500g
Trinca Ouro Plus	10kg

Pixarro

Pixarro com Frutas Girassol Branco

Pixarro c/ Frutas 500g	10 x 500g
Pixarro c/ Frutas	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia e Trinca Ferro (pixarro).

Composição:
Girassol branco, amendoim, sorgo branco, óleo de soja, granulada, ervilha partida, gritz de milho, farelo de pão, frutas, arroz cateto, semente de cártamo, farinha de milho e aroma de leite.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia e Trinca Ferro (pixarro).

Composição:
Girassol miudo, amendoim descascado, sorgo branco, granulada, ervilha, gritz de milho, farelo de pão, óleo de soja, pão extrusado, arroz cateto, semente de cártamo, farinha de milho e aroma banana.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Pixarro Cártamo

Pixarro Cartamo 500g	10 x 500g
Pixarro Cartamo	10kg

Pixarro Pimenta

Pixarro Pimenta 500g	10 x 500g
Pixarro Pimenta	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia e Trinca Ferro (pixarro).

Composição:
Girassol branco, amendoim, sorgo vermelho, óleo de soja, granulada, ervilha, óleo de soja, cascalho de pão, arroz cateto, quirela, pimenta, aroma pimenta.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Pássaro Preto, Sábia e Trinca Ferro (pixarro).

Composição:
Girassol Miudo, amendoim, sorgo vermelho, granulada, ervilha, farelo de pão, cascalho de pão, óleo de soja, arroz cateto, aroma milho verde.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Pixarro Convencional Milho Verde/Banana

Pixarro Milho Verde 500g	10 x 500g
Pixarro Milho Verde	10kg
Pixarro Banana 500g	10 x 500g
Pixarro Banana	10kg

Calopsita

Indicação do Produto:
Pássaros Exóticos de Médio Porte como Calopsitas, Agapornis e Pisitacideos.

Composição:
Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, quirera de arroz, farinha de carne, farinha de vísceras de aves, farinha de peixe, ovo desidratado, cloreto de sódio (sal comum), semente de alpiste, semente de painço, semente de painço vermelho, semente de painço preto, semente de girassol, aveia descascada, grão de trigo mourisco, grão de sorgo branco, semente de girassol cártamo, óleo de soja, aroma mel.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Mit Calopsita Mel

Mit Calopsita 500g	10 x 500g
Mit Calopsita	10kg
Mit Calopsita	25kg

Tico-Tico

Tico-Tico	
Tico Tico 500g	10 x 500g
Tico Tico	10kg

Indicação do Produto:
Pássaros de Médio Porte como Tico-Tico.

Composição:
Milho integral moído, farelo de amendoim, farelo de mandioca, casca de aveia moída, levedura seca de cana de açúcar, farelo de trigo, farelo de glúten de milho-60, farelo de arroz desengordurado, farelo de gérmen de milho, farelo de algodão, farinha de carne e ossos, calcário calcítico, farinha de ossos calcinados, grão de amendoim, gritz de milho, farelo de pão, grão de niger, caulim, cloreto de sódio (sal comum), óleo de soja, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, cloreto de colina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de potássio, sulfato de manganês, niacina, selenito de sódio, sulfato de zinco, aroma de mamão, antioxidante (BHT), aroma de frutas.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Hamster

Indicação do Produto:
Grandes Roedores Como Hamster e Camundongos.

Composição:
Milho integral moído, farelo de amendoim, farelo de mandioca, casca de aveia moída, levedura seca de cana de açúcar, farelo de trigo, farelo de glúten de milho-60, farelo de arroz desengordurado, farelo de gérmen de milho, farelo de algodão, farinha de carne e ossos, calcário calcítico, farinha de ossos calcinados, caulim, farelo de soja, quirera de arroz, farinha de visceras de aves, farinha de peixe, osso desidratado, cloreto de sódio (sal comum), grão de milho, semente de girassol cártamo, grão de amendoim, amendoim com casca, aveia com casca, arroz com casca, grão de sorgo vermelho, grão de soja, grão de ervilha, farelo de pão, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, cloreto de colina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de potássio, sulfato de manganês, niacina, selenito de sódio, sulfato de zinco, aroma de banana, antioxidante (BHT).

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Mit Hamster	
Mit Hamster 390g	10 x 390g
Mit Hamster	10kg

Galo

Mit Galo	
Mit Galo 500g	10 x 500g
Mit Galo	10kg

Indicação do Produto:
Indicado para Galos de Porte.

Composição:
Girassol, amendoim, arroz com casca, aveia com casca, sorgo, canjica de milho, soja, granulada, com premix e ervilha.

Modo de uso:
Servir de livre acesso em comedouros secos e limpos.

Sementes Selecionadas

Deo Colônias

Deo Colônia Baby 100mL

Deo Colônia Fêmea 100mL

Deo Colônia Filhotes 100mL

Deo Colônia Frutas 100mL

Deo Colônia Machos 100mL

Deo Colônia Milão 100mL

Deo Colônia Paris 100mL

Deo Colônia Roma 100mL

Deo Colônia Talco 100mL

Deo Colônia Veneza 100mL

Desinfetantes

Desinfetante Super Concentrado 70mL

Desinfetante Genial Bouquet Marine 2 Lts

Desinfetante Genial Bouquet Fresh 2 Lts

Desinfetante Genial Bouquet Flores 2 Lts

Desinfetante Genial Bouquet Citrus 2 Lts

Desinfetante Genial Bouquet Citronela 2 L

Gel Dental + Dedeira

Gel Dental Tuti-Fruti

Gel Dental + 1 Dedeira

Gel Dental + 2 Dedeira

Gel Higienizador

Gel Higienizador 500mL

Genial Bucal

Genial Bucal 110mL

Hidratante

Máscara Hidratante Chocolate Floresta Negra 480mL

Tapete Higiênico

Tapete Higiênico Pipi Stop 60x50cm

Tapete Higiênico Pipi Stop 60x50cm

Tapete Higiênico Pipi Stop 60x50cm

Pipi Não Pode, Pipi Pode

Pipi Pode 20mL e
Pipi Não Pode 500mL

Pipi Não Pode
500mL

Pipi Pode
20mL

Sabonetes

Sabonete Erva de
Santa Maria
80g

Sabonete
Aloe Vera
80g

Sabonete
Super Premium
80g

Shampoos

Shampoo
2 em 1
500mL

Shampoo
Anti-Pulgas
500mL

Shampoo Chocolate
Floresta Negra
500mL

Shampoo
Citronela
500mL

Shampoo Filhotes
Baby Aloe Vera
500mL

Shampoo Maracujá
Castanha do Pará
500mL

Shampoo Melância
Babaçú 500mL

Shampoo Melão
Guaraná 500mL

Shampoo Morango
Buriti 500mL

Shampoo Pêlo
Claro Frutas
500mL

Shampoos

Shampoo Pêlo Claro Côco 500mL

Shampoo Pêlo Escuro 500mL

Shampoo Pera Cupuaçu 500mL

Shampoo Todos Pêlos Paris 500mL

Shampoo Todos Pêlos Frutas 500mL

Shampoo Uva Açai 500mL

Shampoo Anti-Pulgas 5Lts

Shampoo Chocolate Floresta Negra 5Lts

Shampoo Pelos Claros Côco 5Lts

Shampoo Pelos Claros Frutas 5Lts

Shampoo Pelos Escuros 5Lts

Shampoo Todos Pelos Frutas 5Lts

Shampoo Todos Pelos Paris 5Lts

Condicionadores

Condicionador 5Lts

Condicionador Baby 500mL

Condicionador 500mL

Condicionador Chocolate Floresta Negra 500mL

Condicionador Sem Enxague 500mL

Banho Seco Plus

Banho Seco Plus 500mL

Bandeja p/ Gato

Bandeja Baixa p/ Gatos
8 x 43 x 31 cm

Bandeja Alta p/ Gatos
13,5 x 30 x 40 cm

Banheira Redonda p/ Pássaro

Banheira Redonda Grande Branca

Banheira Redonda Pequena Branca

Banheira Redonda Grande

Banheira Redonda Pequena

Banheira Oval p/ Pássaro

Banheira Oval Gigante Branca

Banheira Oval Grande Branca

Banheira Oval Média Branca

Banheira Oval Pequena Branca

BanheiraOval Gigante

Banheira Oval Grande

Banheira Oval Média

Banheira Oval Pequena

Bebedouro p/ Pássaro

Bebedouro Ambar Graduação Caçula 55ml

Bebedouro Ambar Graduação Médio 100ml

Bebedouro Clone Bico Largo S/ Presilha

Bebedouro Clone Médio S/ Presilha

Bebedouro Clone Grande S/ Presilha

Bebedouro Beija-Flor 6 flores

Bebedouro Meia lua 50ml

Bebedouro Mini 6ml

Bebedouro Beija-Flor 4 flores

Bebedouro Beija-Flor 4 flores

Bebedouro Peq. Caçula Misto 50ml

Bebedouro Médio 100ml

Bebedouro Grande Sabiá Misto

Bebedouro Grande Sabiá Branco

Bebedouro Beija-Flor 4 flores

Christino

Comedouro Para Pássaros

Comedouro 01 Furo com Gancho

Comedouro 02 Furos com Gancho

Comedouro 02 Furos

Comedouro 03 Furos

Comedouro Ambar Grad Meia Lua 50ml

Comedouro C/ Gancho e Poleiro

Comedouro Caneca c/ Aba e Gancho

Comedouro Caneca c/ Aba

Comedouro Caneca c/ Gancho

Comedouro Meia Lua 40mL Amarelo

Comedouro Meia Lua 40mL Azul

Comedouro Meia Lua 40mL Cristal

Comedouro Meia Lua 40mL Verde

Comedouro Meia Lua 40mL Vermelho

Comedouro Meia Lua 50mL Amarelo

Comedouro Meia Lua 50mL Azul

Comedouro Meia Lua 50mL Cristal

Comedouro Meia Lua 50mL Verde

Comedouro Meia Lua 50mL Vermelho

Acessórios Para Pássaros

Ninho c/ Suporte Plástico

Ovinho Endez

Porta Fruta (Malha Fina)

Porta Fruta (Malha Larga)

Porta Ovo

Porta Tiririca Médio

Porta Tiririca Grande

Porta Vitamina Cristal c/ Presilha Trinca Ferro

Porta Vitamina Cristal c/ Presilha Coleiro Pequeno

Porta Vitamina Cristal c/ Presilha Coleiro Médio

Comedouro Para Cães e Gatos

COMEDOURO P/ GATOS
150 ML VERMELHO

COMEDOURO P/ GATOS
150 ML ROSA

COMEDOURO P/ GATOS
150 ML AZUL

COMEDOURO P/ GATOS
150 ML VERDE

COMEDOURO P/ GATOS
150 ML AMARELO

COMEDOURO P/ CÃES
FILHOTE 350 ML VERMELHO

COMEDOURO P/ CÃES
FILHOTE 350 ML ROSA

COMEDOURO P/ CÃES
FILHOTE 350 ML AZUL

COMEDOURO P/ CÃES
FILHOTE 350 ML VERDE

COMEDOURO P/ CÃES
FILHOTE 350 ML AMARELO

COMEDOURO P/ CÃES
PEQUENO 550 ML VERMELHO

COMEDOURO P/ CÃES
PEQUENO 550 ML ROSA

COMEDOURO P/ CÃES
PEQUENO 550 ML AZUL

COMEDOURO P/ CÃES
PEQUENO 550 ML VERDE

COMEDOURO P/ CÃES
PEQUENO 550 ML AMARELO

COMEDOURO P/ CÃES
MÉDIO 1100 ML VERMELHO

COMEDOURO P/ CÃES
MÉDIO 1100 ML ROSA

COMEDOURO P/ CÃES
MÉDIO 1100 ML AZUL

COMEDOURO P/ CÃES
MÉDIO 1100 ML VERDE

COMEDOURO P/ CÃES
MÉDIO 1100 ML AMARELO

COMEDOURO P/ CÃES
GRANDE 2000 ML VERMELHO

COMEDOURO P/ CÃES
GRANDE 2000 ML ROSA

COMEDOURO P/ CÃES
GRANDE 2000 ML AZUL

COMEDOURO P/ CÃES
GRANDE 2000 ML VERDE

COMEDOURO P/ CÃES
GRANDE 2000 ML AMARELO

COMEDOURO P/ CÃES EXTRA
GRANDE 2700 ML VERMELHO

CCOMEDOURO P/ CÃES EXTRA
GRANDE 2700 ML ROSA

COMEDOURO P/ CÃES EXTRA
GRANDE 2700 ML AZUL

COMEDOURO P/ CÃES EXTRA
GRANDE 2700 ML VERDE

COMEDOURO P/ CÃES EXTRA
GRANDE 2700 ML AMARELO

Christino

Comedouro Com Sistema Anti-formigas

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 320ML AMARELO

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 320ML AZUL

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 320ML ROSA

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 320ML VERDE

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 320ML VERMELHO

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 550ML VERMELHO

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 550ML VERDE

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 550ML ROSA

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 550ML AZUL

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 550ML AMARELO

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 1040ML AMARELO

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 1040ML AZUL

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 1040ML VERDE

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 1040ML VERMELHO

COMED. C/ SISTEMA ANTI-FORMIGA 1040ML ROSA

Diversos

Concha para Ração

Escova com Alça

Escova Rastelo

Pá Higiênica Para Gatos

Kit Para Gatos Com 4 Peças

Sanitário Canino Azul
63,5 x 43,5 cm

Sanitário Canino Rosa
63,5 x 43,5 cm

Sanitário Canino Vermelho
63,5 x 43,5 cm

Caixa para Transportes Nº2

Abertura superior para contato com seu pet, sem a necessidade de abrir a grade

Agilidade e facilidade nas travas de montagem

Guia para fácil empilhamento

Única com 2 travas. Travas na porta superior e inferior

Produzida totalmente em Plástico injetado com alta qualidade e durabilidade.

CAIXA PARA TRANSPORTE
Dimensões Externas
Comprimento x Largura x Altura:
Nº2 - 50,5 x 33 x 29 cm

Christino

Casa Chrispet Chaminé

Produzida totalmente em Plástico injetado com alta qualidade e durabilidade.

Casa Chrispet Chaminé nº2
48X39X39cm
Comp. x Larg. x Alt.

Casa Chrispet Chaminé nº3
58X487X48cm
Comp. x Larg. x Alt.

Casa Chrispet Chaminé nº4
70X57X57cm
Comp. x Larg. x Alt.

Bebedouros Beija-Flor

Bebedouro K1 Beija-Flor
Luxo Bola

Bebedouro K3 Beija-Flor
Simples

Bebedouro K5
Beija-Flor G Luxo

Bebedouro K7
Beija-Flor Super Luxo

Bebedouros Pássaros

Bebedouro K44
Pássaro Baby Cristal
Malha fina

Bebedouro K45
Pássaro Médio Cristal
Malha fina

Bebedouro K42
Pássaro Baby Fumê
Malha fina

Bebedouro K43
Pássaro Médio Fumê
Malha fina

Bebedouro K48 - 55mL
Pássaro Baby Colorido
Malha fina

Bebedouro K47 - 120mL
Pássaro Médio Colorido
Malha fina

Bebedouro K60
Pássaro Baby Azul
Malha Larga

Bebedouro K59
Pássaro Médio Azul
Malha Larga (110ml)

Bebedouro K58
Pássaro Baby Color
Malha Larga

Bebedouro K57
Pássaro Médio Color
Malha Larga

Bebedouro K55 - 110mL
Pássaro Médio Cristal
Malha Larga

Bebedouro K54
Pássaro Baby Cristal
Malha Larga

Bebedouro K53
Pássaro Médio Âmbar
Malha Larga (110ml)

Bebedouro K52
Pássaro Baby Âmbar
Malha Larga (55ml)

Comedouros Pássaros

Comedouro Pássaro
em liberdade K11

Comedouro
Pássaro K12

Comedouro
Pássaro K13

Comedouro K15
Lua Cheia Longo

Fralda p/ Gaiola Pássaro

k-31-1 - Fralda p/ Gaiola - Nº 1 - 18x36 cm
k-31-2 - Fralda p/ Gaiola - Nº 2 - 20x41 cm
k-31-3 - Fralda p/ Gaiola - Nº 3 - 21x44 cm
k-31-4 - Fralda p/ Gaiola - Nº 4 - 24x46 cm
k-31-5 - Fralda p/ Gaiola - Nº 5 - 28x54 cm
k-31-6 - Fralda p/ Gaiola - Nº 6 - 32x56 cm
k-31-7 - Fralda p/ Gaiola - Nº 7 - 36x64 cm
k-31-8 - Fralda p/ Gaiola - Nº 8 - 40x64 cm
k-31-9 - Fralda p/ Gaiola - Nº 9 - 27x65 cm
k-31-10 - Fralda p/ Gaiola - Nº 10 - 40x40 cm

Bebedouros, Comedouro e Carrocel Hamster

Bebedouro
Hamster G K39

Bebedouro
Hamster M K38

Kit para roedores K40

Cores

Comedouro p/ Hamster K32

Carrossel p/ Hamster K35

Areias para Pássaros

Areia best sand
Garrafa 500g

Areia Grits Garrafa 500g
Cx. com 24 unids.

Areia grits garrafa 1kg
Cx. com 12 unids

Bebedouros para Pássaros

- Bebedouro plást. mini fino 9 cm N°01
  Embalagem com 120 unid.
- Bebedouro plást. pequeno fino 11cm N°02
  Embalagem com 120 unid.
- Bebedouro plást. médio fino 13cm N°03
  Embalagem com 120 unid.
- Bebedouro plást. médio bojudo 14cm N°07
  Embalagem com 120 unid.

Maravalhas

Maravalha prensada
fina de pinus 500g

Maravalha prensada
fina de pinus 800g

Areia Higiênica Bob Esconde

Areia Higiênica 2kg

Granulado Higiênico Para Gatos e Roedores

Absorve 4X + Que Areia Comum!

100% NATURAL

ELIMINA ODORES

PODE SER JOGADO NO VASO SANITÁRIO

Ninhos de Madeira

Ninho de Madeira
CX Agapornis
26x13x12cm

Ninho de
Madeira Periquito
21x10x11cm c/12

Ninho de Madeira
Calopsita Comum
35x13x12cm c/6

Ninho de Madeira
Calopsita Alto
22x30x17cm c/6

Ninho de Madeira
c/ Gaveta Calopsita
22x30x17cm c/6

Osso de Siba

Malha
Pequena

Malha
Grande

Seringa Plástica

Seringa Plástica para
Alimentar Pássaros
Tamanhos P, M e G

Transporte de Papelão

Transporte de Papelão
para Pássaros
15x6x6cm

Comedouro Tubular

Comedouro Tubular
Galv. Fundo Plástico
15kg / 20kg

Comedouro Tubular
Galv. Fundo Plástico
3kg / 5kg

Comedouro Tubular
Galv. Fundo Plástico
10kg

Comedouro para Aves
(Frango 5kg) Plástico

Comedouro Calha

Comedouro Aves
30cm Calha Galvanizada

Comedouro Aves
50cm Calha Galvanizada



Comedouro Aves
1mt Calha Galvanizada

Bebedouro

Bebedouro
Suino
Chupeta

Bebedouro
Suino Anin
Infantil

Bebedouro
Suino
Mordida Adulta

Bebedouro Ave
Pendular Completo
Automático

Bebedouro Ave
p/ Garrafa Pet

Bebedouro
Plástico 5L
Prato Rosca

Bebedouro
Frango 5L
Ecológico

Bebedouro
Plástico 2L
Prato Rosca

Bebedouro
Frango 2L
Ecológico

Formas de queijo

Forma Para
Queijo 500g

Forma Para
Queijo 1kg

Forma Para
Queijo Minas

Coador Para
Leite com
Tela Nylon

Tela Para
Coador de Leite

Diversos

Esticador de
Arame Liso
(Catraca)

Tampa Plástica
Para Latão

Esticador Cordoalha
1/2 - 7/16

Válvula Para
Bebedouro Pendular
Completa

Focinheira Para
Desmamar
Bezerros

Jardinagem

Adaptador Para Mangueiras 1/2 P/ 1/2

Esguicho Para Mangueira Metal 1/2

Adaptador Para Mangueiras 1/2 P/ 3/4

Aspersor Zamac 25cm
Aspersor Zamac 50cm
Aspersor Zamac 1mt

Ferramentas

Desempenadeira 16 x 28 Lisa

Desempenadeira Hachurada 14 x 26 (Azul)

Desempenadeira Hachurada 18 x 30 (Azul)

Cama e Cobertor

Cama Luxo Courino
Fibra de Silicone 40x40

Cama Luxo Courino
Fibra de Silicone 50x50 / 70x70

Cama Luxo Tricoline
Fibra de Silicone
40x40 / 50x50 / 70x70

Caminha Europe Nylon
EG / G / GG / M / P

Caminha Iglu
P / M / G

Caminha Super
Conforto
M / GG

Cobertor
P / M / G

2 Manta de Cada Cor

Colchonete

Colchonete Pet CLN 4
69x94

Colchonete Pet CLN 5
87x116

Colchonete para Pet
20x30

Colchonete para Pet
50x60

Colchonete Lona para
Cães Grande Porte
70x1,25

Colchonete Lona para
Cães Grande Porte
70x100

Colchonete Para Pet
30x40

Colchonete Nylon para
Cães Grande Porte
70x100

Bebedouro e Comedouro

Bebedouro Automático para Cães

Comedouro Automático para Cães

Comedouro para Cão Pesado G 2,8L

Comedouro para Cão Pesado G 2,8L

Comedouro para Cão Pesado P 350mL

Comedouro para Cão Pesado G 2,8L

Comedouro para Cão Pesado M 1,6L

Comedouro para Cão Pesado M 1,6L

Comedouro para Cão Pesado M 1,6L

Comedouro para Cão Pesado P 350mL

Comedouro para Cão Pesado P 350mL

Focinheira

Focinheira para Cães Nº1

Focinheira para Cães Nº2

Focinheira para Cães Nº3

Focinheira para Cães Nº4

Focinheira para Cães Nº5

Focinheira e Colar Elizabetano

Focinheira para Cães Nº10

Focinheira para Cães Nº11

Focinheira para Cães Nº12

Jogo Focinheira para Cães Nº1 ao 5

Colar Elizabetano Gato

Colar Elizabetano Gato Jg de 1 a 3

Colar Elizabetano Jogo 1 ao 10

Colar Elizabetano - Nº 1
Colar Elizabetano - Nº 2
Colar Elizabetano - Nº 3
Colar Elizabetano - Nº 4
Colar Elizabetano - Nº 5
Colar Elizabetano - Nº 6
Colar Elizabetano - Nº 7
Colar Elizabetano - Nº 8
Colar Elizabetano - Nº 9
Colar Elizabetano - Nº 10

Coleiras Para Cão e Gato

Coleira Enforcador
Luxo

Coleira Nylon Cost.
Dupla Nº12

Coleira Camuflada
Dupla Nº12

Coleira Nylon Nº2

Coleira Nylon Nº4

Coleira Nylon Nº6

Coleira Nylon Nº8

Coleira Nylon Nº10

Coleira Nylon Reg. Nº25

Coleira Em Couro
Forrada
Nº 0 / Nº 1 / Nº 2 / Nº 3
Nº 4 / Nº 5 / Nº 6 / Nº 7 / Nº 8
Nº 9 / Nº 10 / Nº 11 / Nº 12

Coleira de Seda
Luxo N0 35 cm

Coleira de Seda
Luxo N1 40 cm

Coleira de Seda
Luxo N2 45 cm

Coleira Gato Elástico
Seda Luxo Com Guizo

Coleira Gato Elástico
Seda Luxo Com Pingente

Coleira Nylon
Bichinho Nº0

Coleira Nylon
Bichinho Nº1

Coleira Nylon
Bichinho Nº2

Coleira Com
Guia Seda

Coleira Com
Guia Nylon 16

Coleira Com
Guia 16 Veneza

Guia Para Cães

Guia Cães 14x60
Mosquetão

Guia Cães 14x90
Mosquetão e Mola

Guia Com Colar
Elos 14x35

Guia Com Garra
14x35

Guia Com Colar
Elos e Amort 14x35
Mosquetão

Guia Com Colar
Elos e Mola

Guia Com Garra
e Amort 14x35

Guia Com
Mosquetão 14x35

Guia Com Garra
Fila e Mola

Guia Com Mosquetão
16x90

Guia Com Mosquetão
e Amort 14x35

Guia Enforcador
Corda 14

Guia Fina Para Cães
Corda Fina 1,5m

Guia Enforcador
Corda Fina

Guia Enforcador
Luxo

Guia Fina para Cães
Com Mosquetão 1m

Guia e Peitoral

Guia Garra
Fila

Guia Luxo Xadrez
25x90

Guia Para
2 Cães

Guia Para Cães
12x90

Guia Para Cães
Nylon 25x90

Guia e Peitoral

Guia Para Cães
Nylon 30x90

Peitoral 4 Patas Nº0
Com Guia Nylon

Peitoral 4 Patas Nº1
Com Guia Nylon

Peitoral 4 Patas Nº2
Com Guia Nylon

Guia Para Cães
Nylon 30x35

Peitoral 4 Patas Nº3
Com Guia Nylon

Peitoral 4 Patas Nº4
Com Guia Nylon

Peitoral 4 Patas
Nº5 Com Guia

Peitoral 4 Patas
Nº6 Com Guia

Peitoral 4 Patas
Veneza Com Guia
Nº0, Nº1, Nº2, Nº3 e Nº4

Peitoral 4 Patas
Seda Nº5 e Nº6

Peitoral 4 Patas
Seda
Nº0, Nº1, Nº2, Nº3 e Nº4

Peitoral Com
Guia Convencional
Nº0, Nº1, Nº2, Nº3 e Nº4

Peitoral Com
Guia P/M/G

Peitoral Nylon Cão
Grande Porte
Com Amort

Peitoral Nylon
Cão Grande Porte

Peitoral Nylon
Cão Grande
Porte Veneza

Peitoral Nylon Refor.
Grande Porte
Com Amort

Cinto de Segurança
Para Cães P/M

Peitoral Seda Com Guia
Nº0, Nº1, Nº2, Nº3 e Nº4

Peitoral Seda Luxo
Com Amortecedor

Peitoral Seda Cão
Grande Porte
Luxo Xadrez

Casa Stone House

É só encaixar.....click!!!

Design

- Acolhe todos os portes de cães
- Produto atóxico
- Ótima circulação de ar
- Teto fixado com encaixe
- Cantos arredondados
- Fácil higienação

TAMANHO 01
48X38X38cm
Comp. x Larg. x Alt.

TAMANHO 02
50X41X41cm
Comp. x Larg. x Alt.

TAMANHO 03
59X48X48cm
Comp. x Larg. x Alt.

TAMANHO 04
70X57X57cm
Comp. x Larg. x Alt.

TAMANHO 05
85X69X69cm
Comp. x Larg. x Alt.

Plast Pet®
Produzindo Qualidade

Caixa de Transporte Panther

Como deixar seu pet mais seguro em viagens utilizando a Caixa de Transportes Panther.

VENDIDO SEPARADAMENTE

Bebedouro
200 mL

Bebedouro prático, seguro e com abastecimento externo.

Dimensões Externas
Tamanho
Comprimento x Largura x Altura:
Nº1 - 44 x 31 x 27 cm
Indicado para pets até 5 kg
Nº2 - 47 x 34 x 30 cm
Indicado para pets até 10 kg
Nº3 - 53 x 38 x 34 cm
Indicado para pets até 15 kg
Nº4 - 59 x 43 x 38 cm
Indicado para pets até 18kg

Comedouro Bebedouro Flex Gourmet

FLEX GOURMET

Você escolhe se quer bebedouro ou comedouro!

FÁCIL E PRÁTICO

PASSO 1: Gire
PASSO 2: Levante
PASSO 3: Inverta a posição
PASSO 4: Encaixe

Caracteristicas:

Fácil higienização, Grande reservatório e Produto 2 em 1

Dimensões Externas
Comprimento x Largura x Altura:
650 ml - 19 x 12 x 19 cm

Dimensões Externas
Comprimento x Largura x Altura:
1500 ml - 24 x 16 x 25 cm

Dimensões Externas
Comprimento x Largura x Altura:
3000 ml - 31 x 20 x 32 cm

Cores

- *Azul Tiffany*
- *Roxo Carol*
- *Vermelho Novo*
- *Rosa*
- *Nude*

Corrente para Cadeado

N°	Arame	CM
0	3,50	40
1	3,00	40
2	2,60	40

Corrente para Cão

Acabamento zincado

N°	Arame	Metros
7	1,20	1,50
6	1,50	1,50
5	1,80	1,50
4	2,10	1,50
3	2,30	1,50
2	2,50	1,50
1	3,00	1,50
0	3,40	1,50
2/0	3,80	1,50
3/0	4,30	1,50

Corrente para Papagaio

Arame	Peso/kg
1,20	0,220

Corrente para Gato

Acabamento zincado e bicromatizado

Arame	Peso/kg
1,20	0,600

Corrente Xaxim

CM	Arame	Peso/Kg
44	1,50	0,640
54	1,50	0,800
64	1,50	0,920
74	1,50	1,150
84	1,50	1,200

Correntão N70

N°	Arame	Peso/kg
70	2,60	2,687




RUA 11
RUA 10
AGRISTAR
AGRISTAR
Vitacanis
Cevamix
NITRO

www.dicase.com.br
Av. Alice Coutinho Santos, 2149 - Maracanã
Cariacica/ES - CEP: 29.142-887
Televendas: (27) 3216-2460 / (27) 99254-4133
vendas@dicase.com.br